




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-845-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 16:54:57
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:19:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-846-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 16:58:19
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	196204	100.000	39749	4466	1.148	--
总计		196204	100.000	39749			

图2 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-847-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:01:42
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	197767	100.000	40142	4475	1.145	--
总计		197767	100.000	40142			

图3 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-848-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:05:05
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	197494	100.000	40119	4480	1.146	--
总计		197494	100.000	40119			

图4 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-849-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:08:28
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:19:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	197180	100.000	40067	4486	1.146	--
总计		197180	100.000	40067			

图5 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-850-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:11:51
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	197253	100.000	40118	4493	1.146	--
总计		197253	100.000	40118			

图6 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-851-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:15:14
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:19:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	157750	100.000	33401	4982	1.155	--
总计		157750	100.000	33401			

图7 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-852-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:18:35
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	161691	100.000	34156	4984	1.154	--
总计		161691	100.000	34156			

图8 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-853-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:21:57
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	156769	100.000	33367	4986	1.154	--
总计		156769	100.000	33367			

图9 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-854-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:25:18
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	153302	100.000	32338	4979	1.154	--
总计		153302	100.000	32338			

图10 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-855-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:28:41
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	161409	100.000	34163	4989	1.154	--
总计		161409	100.000	34163			

图11 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-856-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:32:03
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	151737	100.000	32105	5000	1.153	--
总计		151737	100.000	32105			

图12 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-857-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:35:26
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	172591	100.000	36623	5004	1.152	--
总计		172591	100.000	36623			

图13 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-858-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:38:49
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:19:45
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	172349	100.000	36434	4995	1.153	--
总计		172349	100.000	36434			

图14 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-859-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:42:11
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:19:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	172658	100.000	36735	5017	1.150	--
总计		172658	100.000	36735			

图15 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-860-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:45:33
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	171769	100.000	36345	5014	1.153	--
总计		171769	100.000	36345			

图16 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-861-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:48:56
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:19:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	175198	100.000	37296	5032	1.151	--
总计		175198	100.000	37296			

图17 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-862-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:52:18
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	171679	100.000	36465	5022	1.150	--
总计		171679	100.000	36465			

图18 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-863-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:55:40
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:19:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	172790	100.000	36792	5038	1.151	--
总计		172790	100.000	36792			

图19 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-864-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 17:59:02
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:20:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	177400	100.000	37744	5037	1.150	--
总计		177400	100.000	37744			

图20 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-865-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:02:23
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	176003	100.000	37505	5054	1.149	--
总计		176003	100.000	37505			

图21 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-866-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:05:45
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	178483	100.000	38060	5056	1.149	--
总计		178483	100.000	38060			

图22 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-867-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:09:07
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:20:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	176805	100.000	37884	5074	1.148	--
总计		176805	100.000	37884			

图23 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-868-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:12:28
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	175731	100.000	37636	5115	1.148	--
总计		175731	100.000	37636			

图24 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-869-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:15:50
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	175144	100.000	37505	5070	1.146	--
总计		175144	100.000	37505			

图25 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-870-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:19:13
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	177761	100.000	38016	5082	1.147	--
总计		177761	100.000	38016			

图26 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-871-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:22:35
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:20:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	178551	100.000	38319	5096	1.146	--
总计		178551	100.000	38319			

图27 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-872-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:25:57
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	178593	100.000	38352	5097	1.146	--
总计		178593	100.000	38352			

图28 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-873-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:29:19
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	177330	100.000	38082	5097	1.145	--
总计		177330	100.000	38082			

图29 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-874-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:32:41
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:20:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	178205	100.000	38292	5110	1.144	--
总计		178205	100.000	38292			

图30 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-875-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:36:04
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	176001	100.000	37797	5104	1.145	--
总计		176001	100.000	37797			

图31 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-876-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:39:26
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:20:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	181333	100.000	39029	5125	1.144	--
总计		181333	100.000	39029			

图32 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-877-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:42:47
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:20:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	181911	100.000	39143	5126	1.144	--
总计		181911	100.000	39143			

图33 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-878-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:46:11
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	180886	100.000	38973	5133	1.144	--
总计		180886	100.000	38973			

图34 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-879-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:49:33
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	180903	100.000	38970	5134	1.143	--
总计		180903	100.000	38970			

图35 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-880-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:52:54
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:45
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	183146	100.000	39475	5139	1.144	--
总计		183146	100.000	39475			

图36 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-881-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:56:17
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	179223	100.000	38641	5152	1.142	--
总计		179223	100.000	38641			

图37 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-882-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 18:59:39
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	182996	100.000	39444	5135	1.142	--
总计		182996	100.000	39444			

图38 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-883-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:03:00
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	189261	100.000	40767	5141	1.142	--
总计		189261	100.000	40767			

图39 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-884-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:06:23
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	183848	100.000	39693	5151	1.142	--
总计		183848	100.000	39693			

图40 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-885-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:09:44
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:20:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	182201	100.000	39292	5140	1.141	--
总计		182201	100.000	39292			

图41 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-886-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:13:07
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	183942	100.000	39616	5144	1.142	--
总计		183942	100.000	39616			

图42 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-887-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:16:29
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	180016	100.000	38809	5143	1.141	--
总计		180016	100.000	38809			

图43 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-888-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:19:51
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	184906	100.000	39802	5141	1.142	--
总计		184906	100.000	39802			

图44 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-889-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:23:14
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	190089	100.000	40927	5144	1.142	--
总计		190089	100.000	40927			

图45 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-890-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:26:36
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	183995	100.000	39695	5153	1.141	--
总计		183995	100.000	39695			

图46 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-891-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:29:59
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	185533	100.000	39900	5137	1.142	--
总计		185533	100.000	39900			

图47 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-892-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:33:21
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	184045	100.000	39678	5147	1.142	--
总计		184045	100.000	39678			

图48 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-893-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:36:44
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	201345	100.000	43395	5149	1.141	--
总计		201345	100.000	43395			

图49 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-894-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:40:07
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	203798	100.000	43854	5169	1.142	--
总计		203798	100.000	43854			

图50 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-895-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:43:30
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	201130	100.000	43223	5156	1.142	--
总计		201130	100.000	43223			

图51 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-896-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:46:53
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	205487	100.000	44067	5153	1.142	--
总计		205487	100.000	44067			

图52 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-897-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:50:16
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	201223	100.000	43373	5162	1.142	--
总计		201223	100.000	43373			

图53 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-898-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:53:38
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	208233	100.000	44695	5165	1.142	--
总计		208233	100.000	44695			

图54 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-899-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 19:57:00
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.187	198133	100.000	40717	4627	1.143	--
总计		198133	100.000	40717			

图55 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 27-19/27-900-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250107-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/07 20:00:22
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:21:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	197280	100.000	40566	4630	1.144	--
总计		197280	100.000	40566			

图56 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2