




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-232-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:22:55
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:32:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-233-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:26:22
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:32:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	16793	100.000	3738	1581	1.180	--
总计		16793	100.000	3738			

图2 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-234-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:29:48
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:32:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	16825	100.000	3729	1554	1.186	--
总计		16825	100.000	3729			

图3 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-235-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:33:14
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:32:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	16845	100.000	3693	1536	1.194	--
总计		16845	100.000	3693			

图4 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-236-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:36:39
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:32:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	16804	100.000	3709	1536	1.190	--
总计		16804	100.000	3709			

图5 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-237-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:40:03
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	16800	100.000	3710	1540	1.184	--
总计		16800	100.000	3710			

图6 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-238-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:43:28
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	15908	100.000	3862	1911	1.187	--
总计		15908	100.000	3862			

图7 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-239-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:46:52
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	15343	100.000	3656	1888	1.240	--
总计		15343	100.000	3656			

图8 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-240-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:50:15
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	16812	100.000	3888	1838	1.228	--
总计		16812	100.000	3888			

图9 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-241-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:53:39
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	16888	100.000	4083	1890	1.175	--
总计		16888	100.000	4083			

图10 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-242-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 11:57:04
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	16018	100.000	3872	1902	1.180	--
总计		16018	100.000	3872			

图11 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1



JSS-3362


<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-243-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:00:29
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	15708	100.000	3771	1886	1.203	--
总计		15708	100.000	3771			

图12 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-244-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:03:53
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	19293	100.000	4591	1869	1.150	--
总计		19293	100.000	4591			

图13 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-245-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:07:17
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	18180	100.000	4401	1917	1.199	--
总计		18180	100.000	4401			

图14 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-246-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:10:42
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	17731	100.000	4353	1963	1.181	--
总计		17731	100.000	4353			

图15 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-247-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:14:07
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	18436	100.000	4420	1919	1.187	--
总计		18436	100.000	4420			

图16 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-248-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:17:32
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18379	100.000	4501	1946	1.181	--
总计		18379	100.000	4501			

图17 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-249-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:20:56
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	18374	100.000	4443	1908	1.198	--
总计		18374	100.000	4443			

图18 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-250-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:24:21
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18372	100.000	4509	1938	1.178	--
总计		18372	100.000	4509			

图19 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-251-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:27:47
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17939	100.000	4388	1928	1.176	--
总计		17939	100.000	4388			

图20 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-252-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:31:11
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17807	100.000	4347	1927	1.186	--
总计		17807	100.000	4347			

图21 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-253-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:34:36
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	18274	100.000	4441	1934	1.180	--
总计		18274	100.000	4441			

图22 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-254-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:38:01
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18449	100.000	4487	1916	1.184	--
总计		18449	100.000	4487			

图23 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-255-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:41:25
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	18164	100.000	4445	1938	1.179	--
总计		18164	100.000	4445			

图24 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-256-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:44:49
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	18557	100.000	4508	1920	1.185	--
总计		18557	100.000	4508			

图25 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-257-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:48:14
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	18219	100.000	4425	1933	1.189	--
总计		18219	100.000	4425			

图26 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-258-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:51:38
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	17787	100.000	4325	1950	1.180	--
总计		17787	100.000	4325			

图27 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-259-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:55:03
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:33:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	18427	100.000	4467	1900	1.178	--
总计		18427	100.000	4467			

图28 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-260-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 12:58:28
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	18278	100.000	4457	1944	1.179	--
总计		18278	100.000	4457			

图29 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-261-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:01:53
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	19344	100.000	4757	1943	1.175	--
总计		19344	100.000	4757			

图30 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-262-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:05:17
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	18515	100.000	4461	1921	1.179	--
总计		18515	100.000	4461			

图31 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-263-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:08:42
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	18023	100.000	4369	1944	1.183	--
总计		18023	100.000	4369			

图32 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-264-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:12:07
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	17869	100.000	4350	1948	1.183	--
总计		17869	100.000	4350			

图33 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-265-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:15:32
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	18291	100.000	4444	1925	1.171	--
总计		18291	100.000	4444			

图34 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-266-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:18:58
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18414	100.000	4518	1942	1.175	--
总计		18414	100.000	4518			

图35 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-267-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:22:22
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	18248	100.000	4446	1919	1.173	--
总计		18248	100.000	4446			

图36 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-268-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:25:48
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	16900	100.000	3717	1543	1.183	--
总计		16900	100.000	3717			

图37 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-269-2 - zzp-2024121521p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:29:14
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	16727	100.000	3705	1538	1.187	--
总计		16727	100.000	3705			

图38 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-270-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:32:41
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-271-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:36:06
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	16624	100.000	3707	1575	1.181	--
总计		16624	100.000	3707			

图40 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-272-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:39:33
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	16515	100.000	3625	1518	1.188	--
总计		16515	100.000	3625			

图41 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-273-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:42:59
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	16594	100.000	3634	1505	1.194	--
总计		16594	100.000	3634			

图42 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-274-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:46:25
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	16470	100.000	3600	1512	1.194	--
总计		16470	100.000	3600			

图43 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-275-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:49:51
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	16441	100.000	3610	1525	1.195	--
总计		16441	100.000	3610			

图44 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-276-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:53:18
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	16591	100.000	4027	1933	1.212	--
总计		16591	100.000	4027			

图45 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-277-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 13:56:43
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	12626	100.000	3075	1925	1.192	--
总计		12626	100.000	3075			

图46 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-278-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:00:09
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	15810	100.000	3805	1890	1.177	--
总计		15810	100.000	3805			

图47 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-279-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:03:35
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	16110	100.000	3905	1904	1.171	--
总计		16110	100.000	3905			

图48 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-280-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:07:01
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	15780	100.000	3836	1912	1.188	--
总计		15780	100.000	3836			

图49 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-281-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:10:27
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	16364	100.000	4024	1944	1.163	--
总计		16364	100.000	4024			

图50 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-282-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:13:53
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:34:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	18451	100.000	4421	1908	1.192	--
总计		18451	100.000	4421			

图51 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-283-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:17:20
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17986	100.000	4356	1924	1.221	--
总计		17986	100.000	4356			

图52 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-284-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:20:45
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18120	100.000	4386	1924	1.207	--
总计		18120	100.000	4386			

图53 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-285-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:24:10
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17618	100.000	4294	1915	1.183	--
总计		17618	100.000	4294			

图54 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-286-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:27:36
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17901	100.000	4343	1914	1.191	--
总计		17901	100.000	4343			

图55 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-287-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:31:02
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17312	100.000	4214	1915	1.189	--
总计		17312	100.000	4214			

图56 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-288-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:34:29
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	18236	100.000	4448	1933	1.189	--
总计		18236	100.000	4448			

图57 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-289-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:37:54
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	18131	100.000	4395	1916	1.202	--
总计		18131	100.000	4395			

图58 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-290-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:41:20
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	17995	100.000	4365	1942	1.191	--
总计		17995	100.000	4365			

图59 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-291-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:44:46
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17785	100.000	4312	1903	1.190	--
总计		17785	100.000	4312			

图60 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-292-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:48:13
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17858	100.000	4416	1959	1.174	--
总计		17858	100.000	4416			

图61 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-293-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:51:40
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17328	100.000	4219	1904	1.179	--
总计		17328	100.000	4219			

图62 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-294-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:55:05
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18209	100.000	4426	1918	1.176	--
总计		18209	100.000	4426			

图63 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-295-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 14:58:31
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18002	100.000	4372	1915	1.195	--
总计		18002	100.000	4372			

图64 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-296-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:01:59
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18311	100.000	4411	1883	1.189	--
总计		18311	100.000	4411			

图65 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-297-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:05:24
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17660	100.000	4300	1912	1.174	--
总计		17660	100.000	4300			

图66 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-298-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:08:50
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	17938	100.000	4372	1931	1.183	--
总计		17938	100.000	4372			

图67 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-299-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:12:16
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17514	100.000	4252	1907	1.169	--
总计		17514	100.000	4252			

图68 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-300-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:15:43
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18023	100.000	4423	1931	1.180	--
总计		18023	100.000	4423			

图69 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-301-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:19:09
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17888	100.000	4396	1937	1.181	--
总计		17888	100.000	4396			

图70 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-302-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:23:32
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17858	100.000	4367	1930	1.208	--
总计		17858	100.000	4367			

图71 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-303-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:27:21
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	17648	100.000	4287	1919	1.183	--
总计		17648	100.000	4287			

图72 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-304-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:30:46
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:35:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17885	100.000	4358	1915	1.182	--
总计		17885	100.000	4358			

图73 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-305-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:34:12
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17318	100.000	4212	1908	1.189	--
总计		17318	100.000	4212			

图74 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-306-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:37:39
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	16643	100.000	3726	1577	1.177	--
总计		16643	100.000	3726			

图75 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-307-2 - zzp-2024121521p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:41:05
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	16587	100.000	3651	1533	1.194	--
总计		16587	100.000	3651			

图76 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121521批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-308-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:44:30
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-309-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:47:55
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16811	100.000	3742	1555	1.188	--
总计		16811	100.000	3742			

图78 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-310-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:51:20
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16729	100.000	3702	1537	1.187	--
总计		16729	100.000	3702			

图79 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-311-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:54:46
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	16817	100.000	3707	1545	1.189	--
总计		16817	100.000	3707			

图80 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-312-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 15:58:10
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16804	100.000	3720	1547	1.183	--
总计		16804	100.000	3720			

图81 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-313-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:01:35
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	16696	100.000	3687	1545	1.189	--
总计		16696	100.000	3687			

图82 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-314-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:05:01
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	15872	100.000	3843	1922	1.211	--
总计		15872	100.000	3843			

图83 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-11/31-315-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:08:25
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:36:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	13033	100.000	3146	1916	1.259	--
总计		13033	100.000	3146			

图84 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-14/31-316-3 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:11:49
处理时间 (V3) : 2025/01/08 08:44:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17202	100.000	4153	1858	1.144	--
总计		17202	100.000	4153			

图85 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-317-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:15:13
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:41:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	16596	100.000	4024	1906	1.171	--
总计		16596	100.000	4024			

图86 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-318-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:18:37
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:41:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	16843	100.000	4038	1892	1.206	--
总计		16843	100.000	4038			

图87 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-319-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:22:01
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:41:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	16767	100.000	4065	1907	1.193	--
总计		16767	100.000	4065			

图88 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-320-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:25:25
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:41:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	18063	100.000	4345	1902	1.190	--
总计		18063	100.000	4345			

图89 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-321-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:28:50
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:41:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17463	100.000	4232	1928	1.224	--
总计		17463	100.000	4232			

图90 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-322-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:32:15
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17869	100.000	4315	1908	1.195	--
总计		17869	100.000	4315			

图91 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-323-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:35:39
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	18319	100.000	4425	1882	1.175	--
总计		18319	100.000	4425			

图92 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-324-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:39:03
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	17789	100.000	4296	1907	1.195	--
总计		17789	100.000	4296			

图93 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-325-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:42:28
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	18004	100.000	4352	1902	1.197	--
总计		18004	100.000	4352			

图94 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-326-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:45:51
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17797	100.000	4314	1909	1.190	--
总计		17797	100.000	4314			

图95 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-327-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:51:10
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17521	100.000	4226	1921	1.211	--
总计		17521	100.000	4226			

图96 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-328-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:54:34
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17886	100.000	4327	1908	1.191	--
总计		17886	100.000	4327			

图97 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-329-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 16:57:58
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18105	100.000	4406	1921	1.181	--
总计		18105	100.000	4406			

图98 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-330-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:01:22
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17772	100.000	4290	1896	1.195	--
总计		17772	100.000	4290			

图99 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-331-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:04:46
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17923	100.000	4338	1912	1.191	--
总计		17923	100.000	4338			

图100 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-332-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:08:10
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17761	100.000	4298	1909	1.182	--
总计		17761	100.000	4298			

图101 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-333-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:11:34
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17474	100.000	4265	1919	1.195	--
总计		17474	100.000	4265			

图102 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-334-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:14:58
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17840	100.000	4344	1917	1.196	--
总计		17840	100.000	4344			

图103 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-335-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:18:22
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18242	100.000	4441	1905	1.178	--
总计		18242	100.000	4441			

图104 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-336-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:21:45
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17738	100.000	4304	1913	1.190	--
总计		17738	100.000	4304			

图105 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-337-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:25:09
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18025	100.000	4389	1905	1.192	--
总计		18025	100.000	4389			

图106 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-338-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:28:33
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	17503	100.000	4342	1977	1.164	--
总计		17503	100.000	4342			

图107 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-339-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:31:56
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17476	100.000	4283	1951	1.172	--
总计		17476	100.000	4283			

图108 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-340-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:35:20
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	17749	100.000	4343	1934	1.188	--
总计		17749	100.000	4343			

图109 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-341-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:38:44
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	18080	100.000	4437	1929	1.170	--
总计		18080	100.000	4437			

图110 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-342-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:42:09
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17615	100.000	4296	1926	1.177	--
总计		17615	100.000	4296			

图111 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-343-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:45:33
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17962	100.000	4364	1906	1.185	--
总计		17962	100.000	4364			

图112 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-344-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:48:57
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:42:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16862	100.000	3709	1540	1.198	--
总计		16862	100.000	3709			

图113 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-345-2 - zzp-2024121621p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:52:23
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:43:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16815	100.000	3689	1529	1.191	--
总计		16815	100.000	3689			

图114 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-13/31-346-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:55:48
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:43:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-15/31-347-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 17:59:16
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:47:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16548	100.000	3731	1578	1.160	--
总计		16548	100.000	3731			

图116 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-16/31-348-3 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:02:42
处理时间 (V3) : 2025/01/08 08:48:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	16546	100.000	3634	1536	1.188	--
总计		16546	100.000	3634			

图117 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-15/31-349-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:06:08
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:47:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	16484	100.000	3631	1517	1.186	--
总计		16484	100.000	3631			

图118 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-17/31-350-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:09:35
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:49:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	16411	100.000	3612	1530	1.197	--
总计		16411	100.000	3612			

图119 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-17/31-351-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:13:01
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:49:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	16336	100.000	3582	1524	1.200	--
总计		16336	100.000	3582			

图120 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-352-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:16:26
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:50:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	16374	100.000	3949	1879	1.192	--
总计		16374	100.000	3949			

图121 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-353-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:19:50
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:50:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	16458	100.000	3977	1907	1.216	--
总计		16458	100.000	3977			

图122 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-354-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:23:16
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:50:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	15258	100.000	3689	1895	1.181	--
总计		15258	100.000	3689			

图123 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-355-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:26:40
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:50:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	16865	100.000	4015	1891	1.244	--
总计		16865	100.000	4015			

图124 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-356-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:30:06
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	15318	100.000	3738	1943	1.182	--
总计		15318	100.000	3738			

图125 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-357-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:33:30
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	16533	100.000	4012	1915	1.180	--
总计		16533	100.000	4012			

图126 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-358-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:36:55
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17705	100.000	4266	1882	1.182	--
总计		17705	100.000	4266			

图127 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-359-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:40:19
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18103	100.000	4420	1939	1.203	--
总计		18103	100.000	4420			

图128 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-360-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:43:45
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17651	100.000	4258	1902	1.190	--
总计		17651	100.000	4258			

图129 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-361-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:47:10
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17886	100.000	4300	1919	1.238	--
总计		17886	100.000	4300			

图130 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-362-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:50:35
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17650	100.000	4310	1924	1.190	--
总计		17650	100.000	4310			

图131 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-363-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:53:59
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17913	100.000	4330	1908	1.195	--
总计		17913	100.000	4330			

图132 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-364-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 18:57:24
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17437	100.000	4273	1924	1.177	--
总计		17437	100.000	4273			

图133 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-365-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:00:48
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	18283	100.000	4499	1950	1.184	--
总计		18283	100.000	4499			

图134 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-366-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:04:14
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17668	100.000	4302	1920	1.183	--
总计		17668	100.000	4302			

图135 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-367-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:07:40
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17868	100.000	4358	1927	1.164	--
总计		17868	100.000	4358			

图136 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-368-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:11:04
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17757	100.000	4307	1902	1.179	--
总计		17757	100.000	4307			

图137 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-369-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:14:30
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17993	100.000	4344	1898	1.183	--
总计		17993	100.000	4344			

图138 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-370-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:17:55
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17696	100.000	4284	1905	1.178	--
总计		17696	100.000	4284			

图139 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-371-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:21:21
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18159	100.000	4407	1909	1.183	--
总计		18159	100.000	4407			

图140 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-372-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:24:46
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17633	100.000	4296	1920	1.183	--
总计		17633	100.000	4296			

图141 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-373-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:28:12
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17814	100.000	4312	1907	1.186	--
总计		17814	100.000	4312			

图142 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-374-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:31:37
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17607	100.000	4276	1911	1.192	--
总计		17607	100.000	4276			

图143 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-375-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:35:02
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17955	100.000	4338	1889	1.187	--
总计		17955	100.000	4338			

图144 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-376-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:38:29
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17685	100.000	4264	1879	1.183	--
总计		17685	100.000	4264			

图145 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-377-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:41:55
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:51:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18196	100.000	4412	1907	1.189	--
总计		18196	100.000	4412			

图146 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-378-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:45:20
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17684	100.000	4292	1902	1.185	--
总计		17684	100.000	4292			

图147 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-379-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:48:45
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17754	100.000	4297	1902	1.179	--
总计		17754	100.000	4297			

图148 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-380-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:52:11
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17744	100.000	4326	1919	1.183	--
总计		17744	100.000	4326			

图149 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-381-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:55:36
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	18072	100.000	4383	1898	1.190	--
总计		18072	100.000	4383			

图150 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-382-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 19:59:02
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	16750	100.000	3753	1565	1.171	--
总计		16750	100.000	3753			

图151 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-383-2 - zzp-2024121621p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:02:28
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16603	100.000	3664	1527	1.185	--
总计		16603	100.000	3664			

图152 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121621批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-384-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:05:54
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-385-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:09:19
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16669	100.000	3728	1569	1.181	--
总计		16669	100.000	3728			

图154 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-386-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:12:44
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	16671	100.000	3651	1523	1.192	--
总计		16671	100.000	3651			

图155 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-387-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:16:10
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	16673	100.000	3649	1521	1.189	--
总计		16673	100.000	3649			

图156 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-388-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:19:36
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	16629	100.000	3645	1531	1.206	--
总计		16629	100.000	3645			

图157 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-389-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:23:02
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	16697	100.000	3650	1529	1.194	--
总计		16697	100.000	3650			

图158 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-390-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:26:27
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	15040	100.000	3639	1912	1.203	--
总计		15040	100.000	3639			

图159 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-391-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:29:52
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	15873	100.000	3848	1901	1.197	--
总计		15873	100.000	3848			

图160 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-392-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:33:16
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	14863	100.000	3592	1901	1.192	--
总计		14863	100.000	3592			

图161 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-393-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:36:42
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	15468	100.000	3756	1906	1.185	--
总计		15468	100.000	3756			

图162 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-394-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:40:06
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	15260	100.000	3671	1895	1.205	--
总计		15260	100.000	3671			

图163 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-395-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:43:30
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	15570	100.000	3728	1870	1.195	--
总计		15570	100.000	3728			

图164 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-396-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:46:55
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18259	100.000	4424	1906	1.183	--
总计		18259	100.000	4424			

图165 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-397-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:50:20
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17980	100.000	4373	1921	1.195	--
总计		17980	100.000	4373			

图166 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-398-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:53:43
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17367	100.000	4212	1908	1.190	--
总计		17367	100.000	4212			

图167 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-399-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 20:57:09
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17925	100.000	4355	1911	1.196	--
总计		17925	100.000	4355			

图168 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-400-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:00:33
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:52:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18340	100.000	4396	1898	1.227	--
总计		18340	100.000	4396			

图169 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-401-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:03:57
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18069	100.000	4364	1905	1.203	--
总计		18069	100.000	4364			

图170 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-402-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:07:21
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18519	100.000	4483	1903	1.192	--
总计		18519	100.000	4483			

图171 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-403-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:10:47
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18281	100.000	4426	1895	1.182	--
总计		18281	100.000	4426			

图172 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-404-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:14:12
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17569	100.000	4240	1897	1.185	--
总计		17569	100.000	4240			

图173 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-405-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:17:37
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	18051	100.000	4382	1910	1.181	--
总计		18051	100.000	4382			

图174 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-406-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:21:01
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	18037	100.000	4406	1956	1.205	--
总计		18037	100.000	4406			

图175 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-407-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:24:26
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	18293	100.000	4389	1918	1.189	--
总计		18293	100.000	4389			

图176 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-408-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:27:51
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	18384	100.000	4481	1915	1.187	--
总计		18384	100.000	4481			

图177 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-409-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:31:15
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18345	100.000	4452	1896	1.182	--
总计		18345	100.000	4452			

图178 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-410-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:34:39
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17685	100.000	4302	1902	1.182	--
总计		17685	100.000	4302			

图179 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-411-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:38:05
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18093	100.000	4383	1901	1.192	--
总计		18093	100.000	4383			

图180 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-412-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:41:29
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18485	100.000	4462	1896	1.190	--
总计		18485	100.000	4462			

图181 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-413-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:44:53
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18301	100.000	4416	1889	1.178	--
总计		18301	100.000	4416			

图182 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-414-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:48:17
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18432	100.000	4479	1923	1.182	--
总计		18432	100.000	4479			

图183 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-415-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:51:42
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18178	100.000	4428	1909	1.184	--
总计		18178	100.000	4428			

图184 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-416-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:55:07
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	17671	100.000	4297	1895	1.190	--
总计		17671	100.000	4297			

图185 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-417-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 21:58:32
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	17950	100.000	4384	1909	1.182	--
总计		17950	100.000	4384			

图186 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-418-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:01:56
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18365	100.000	4447	1894	1.193	--
总计		18365	100.000	4447			

图187 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-419-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:05:20
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18083	100.000	4390	1914	1.189	--
总计		18083	100.000	4390			

图188 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-420-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:08:45
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16541	100.000	3713	1582	1.181	--
总计		16541	100.000	3713			

图189 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-421-2 - zzp-2024121721p-rcqx-1-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:12:10
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16617	100.000	3650	1521	1.190	--
总计		16617	100.000	3650			

图190 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-422-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:15:37
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图191 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-423-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:19:03
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:53:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	16644	100.000	3721	1574	1.180	--
总计		16644	100.000	3721			

图192 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-424-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:22:30
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16776	100.000	3714	1540	1.185	--
总计		16776	100.000	3714			

图193 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-425-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:25:57
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16690	100.000	3689	1538	1.195	--
总计		16690	100.000	3689			

图194 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-426-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:29:24
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16764	100.000	3692	1521	1.196	--
总计		16764	100.000	3692			

图195 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-427-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:32:51
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16563	100.000	3690	1554	1.184	--
总计		16563	100.000	3690			

图196 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-428-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:36:17
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	16914	100.000	4109	1900	1.179	--
总计		16914	100.000	4109			

图197 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-429-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:39:43
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	16358	100.000	3972	1918	1.184	--
总计		16358	100.000	3972			

图198 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-430-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:43:09
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	15622	100.000	3754	1905	1.213	--
总计		15622	100.000	3754			

图199 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-431-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:46:34
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	15618	100.000	3784	1926	1.214	--
总计		15618	100.000	3784			

图200 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-432-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:49:59
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	15379	100.000	3682	1923	1.271	--
总计		15379	100.000	3682			

图201 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-433-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:53:23
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	15329	100.000	3680	1909	1.236	--
总计		15329	100.000	3680			

图202 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-434-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 22:56:50
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18518	100.000	4502	1923	1.164	--
总计		18518	100.000	4502			

图203 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-435-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:00:16
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17820	100.000	4325	1919	1.199	--
总计		17820	100.000	4325			

图204 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-436-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:03:42
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	18178	100.000	4334	1899	1.239	--
总计		18178	100.000	4334			

图205 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-437-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:07:08
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18171	100.000	4382	1890	1.202	--
总计		18171	100.000	4382			

图206 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-438-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:10:34
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	18218	100.000	4417	1944	1.198	--
总计		18218	100.000	4417			

图207 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-439-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:13:59
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	18555	100.000	4432	1878	1.213	--
总计		18555	100.000	4432			

图208 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-440-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:17:24
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18614	100.000	4508	1899	1.184	--
总计		18614	100.000	4508			

图209 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-441-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:20:50
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17958	100.000	4367	1928	1.179	--
总计		17958	100.000	4367			

图210 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-442-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:24:16
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18207	100.000	4380	1906	1.219	--
总计		18207	100.000	4380			

图211 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-443-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:27:43
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18262	100.000	4431	1917	1.192	--
总计		18262	100.000	4431			

图212 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-444-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:31:09
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18207	100.000	4405	1895	1.190	--
总计		18207	100.000	4405			

图213 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-445-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:34:34
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:54:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18421	100.000	4443	1902	1.190	--
总计		18421	100.000	4443			

图214 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-446-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:38:00
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18508	100.000	4545	1943	1.170	--
总计		18508	100.000	4545			

图215 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-447-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:41:26
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17878	100.000	4348	1915	1.199	--
总计		17878	100.000	4348			

图216 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-448-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:44:51
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18054	100.000	4362	1907	1.190	--
总计		18054	100.000	4362			

图217 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-449-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:48:17
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18380	100.000	4461	1920	1.182	--
总计		18380	100.000	4461			

图218 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-450-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:51:43
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	18178	100.000	4425	1912	1.190	--
总计		18178	100.000	4425			

图219 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-451-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:55:09
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18168	100.000	4419	1914	1.181	--
总计		18168	100.000	4419			

图220 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-452-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 23:58:35
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18588	100.000	4490	1905	1.195	--
总计		18588	100.000	4490			

图221 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-453-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/08 00:02:02
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	17768	100.000	4305	1908	1.178	--
总计		17768	100.000	4305			

图222 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-454-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/08 00:05:28
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18059	100.000	4373	1909	1.188	--
总计		18059	100.000	4373			

图223 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-455-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/08 00:08:54
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18277	100.000	4426	1912	1.187	--
总计		18277	100.000	4426			

图224 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-456-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/08 00:12:19
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	18216	100.000	4408	1911	1.185	--
总计		18216	100.000	4408			

图225 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-457-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/08 00:15:45
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	17810	100.000	4379	1936	1.204	--
总计		17810	100.000	4379			

图226 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-458-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/08 00:19:11
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	16787	100.000	3713	1538	1.192	--
总计		16787	100.000	3713			

图227 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-18/31-459-2 - zzp-2024121721p-rcqx-2-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250107-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/08 00:22:37
处理时间 (V2) : 2025/01/08 08:55:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	16615	100.000	3732	1574	1.196	--
总计		16615	100.000	3732			

图228 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121721批(25mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2