奥美沙坦酯片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100864-202205	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	235232	235481	235125	235352	235160	235270	0.07
2	11.11	235013	234825				234919	0.06

单位质量响应值		RSD%	判断
21138.36	21144.82	0.03	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-08

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-SD901YA批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	121714	-	121714	51.710	50.84	11.60	51.71	50.84	11.60
	2	121025	-	121025	51.417			51.42		
	3	138701	-	138701	58.927			58.93		
	4	95318	-	95318	40.496			40.50		
	5	120724	-	120724	51.290			51.29		
	6	120455	-	120455	51.175			51.18		
10min	1	186033	-	186033	79.036	78.76	2.53	79.12	78.84	2.54
	2	186594	-	186594	79.274			79.36		
	3	192701	-	192701	81.869			81.97		
	4	178324	-	178324	75.761			75.83		
	5	183294	-	183294	77.872			77.96		
	6	185290	-	185290	78.720			78.81		
15min	1	209292	-	209292	88.918	88.66	1.03	89.14	88.88	1.04
	2	209586	-	209586	89.043			89.26		
	3	209944	-	209944	89.195			89.43		
	4	204722	-	204722	86.976			87.17		
	5	207892	-	207892	88.323			88.54		
	6	210636	-	210636	89.489			89.71		
20min	1	218880	-	218880	92.991	92.83	0.64	93.36	93.20	0.65
	2	219195	-	219195	93.125			93.49		
	3	217897	-	217897	92.573			92.96		
	4	216078	-	216078	91.801			92.14		
	5	218830	-	218830	92.970			93.33		
	6	220164	-	220164	93.537			93.90		
30min	1	224538	-	224538	95.395	95.90	0.65	95.92	96.42	0.65
	2	225470	-	225470	95.791			96.31		
	3	224234	-	224234	95.266			95.80		
	4	225005	-	225005	95.593			96.09		
	5	227469	-	227469	96.640			97.16		
	6	227586	-	227586	96.690			97.21		
45min	1	226336	-	226336	96.159	96.18	0.51	96.84	96.86	0.51
	2	226490	-	226490	96.224			96.91		
	3	224940	-	224940	95.566			96.26		
	4	225296	-	225296	95.717			96.37		
	5	227538	-	227538	96.669			97.35		
	6	227781	-	227781	96.773			97.46		
60min	1	223750	-	223750	95.060	95.37	0.53	95.90	96.20	0.53
	2	224132	-	224132	95.222			96.06		
	3	223062	-	223062	94.768			95.62		
	4	224051	-	224051	95.188			96.00		
	5	226037	-	226037	96.032			96.87		
	6	225812	-	225812	95.936			96.78		
极限	1	222545	-	222545	94.548	94.76	0.46	95.55	95.76	0.46
	2	222397	-	222397	94.485			95.49		
	3	222584	-	222584	94.565			95.58		
	4	222054	-	222054	94.340			95.31		
	5	224184	-	224184	95.245			96.24		
	6	224452	-	224452	95.358			96.36		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-08

复核者:

日　期:

未审阅版本

奥美沙坦酯片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100864-202205	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	236571	236376	236605	235844	235905	236260	0.16
2	11.11	235490	234533				235012	0.29

单位质量响应值		RSD%	判断
21227.31	21153.20	0.25	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-08

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-SD901YA批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	113892	-	113892	48.276	44.82	18.98	48.28	44.82	18.99
	2	123237	-	123237	52.237			52.24		
	3	110368	-	110368	46.782			46.78		
	4	112031	-	112031	47.487			47.49		
	5	108791	-	108791	46.114			46.11		
	6	66115	-	66115	28.025			28.02		
10min	1	182593	-	182593	77.397	75.82	7.69	77.48	75.90	7.70
	2	186666	-	186666	79.123			79.21		
	3	182696	-	182696	77.440			77.52		
	4	187558	-	187558	79.501			79.58		
	5	182606	-	182606	77.402			77.48		
	6	151193	-	151193	64.087			64.13		
15min	1	206784	-	206784	87.651	87.65	3.01	87.86	87.85	3.02
	2	211208	-	211208	89.526			89.74		
	3	206689	-	206689	87.610			87.82		
	4	211863	-	211863	89.804			90.02		
	5	209225	-	209225	88.685			88.89		
	6	194898	-	194898	82.612			82.77		
20min	1	217686	-	217686	92.272	92.77	1.20	92.63	93.12	1.22
	2	221002	-	221002	93.677			94.05		
	3	216954	-	216954	91.961			92.31		
	4	221711	-	221711	93.978			94.34		
	5	220601	-	220601	93.507			93.86		
	6	215169	-	215169	91.205			91.50		
30min	1	224426	-	224426	95.129	96.24	0.93	95.64	96.74	0.92
	2	227436	-	227436	96.405			96.93		
	3	224823	-	224823	95.297			95.80		
	4	229548	-	229548	97.300			97.82		
	5	227089	-	227089	96.257			96.77		
	6	229004	-	229004	97.069			97.51		
45min	1	225770	-	225770	95.698	96.81	0.93	96.37	97.47	0.91
	2	228790	-	228790	96.978			97.66		
	3	226552	-	226552	96.030			96.69		
	4	229907	-	229907	97.452			98.13		
	5	227872	-	227872	96.589			97.26		
	6	231442	-	231442	98.103			98.71		
60min	1	222652	-	222652	94.377	95.44	1.02	95.20	96.27	1.00
	2	225020	-	225020	95.380			96.23		
	3	223420	-	223420	94.702			95.53		
	4	226885	-	226885	96.171			97.01		
	5	224266	-	224266	95.061			95.89		
	6	228789	-	228789	96.978			97.75		
极限	1	220288	-	220288	93.375	94.52	1.02	94.36	95.50	0.99
	2	222564	-	222564	94.339			95.34		
	3	221779	-	221779	94.007			94.99		
	4	224279	-	224279	95.066			96.07		
	5	222234	-	222234	94.200			95.19		
	6	226768	-	226768	96.121			97.05		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-08

复核者:

日　期:

未审阅版本

奥美沙坦酯片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100864-202205	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	234662	235231	234683	235018	235426	235004	0.15
2	11.11	234394	234266				234330	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
21114.47	21091.81	0.08	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-08

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-SD901YA批-pH2.0

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	100630	-	100630	42.831	39.48	25.97	42.83	39.48	25.97
	2	43955	-	43955	18.708			18.71		
	3	98393	-	98393	41.878			41.88		
	4	102319	-	102319	43.549			43.55		
	5	106281	-	106281	45.236			45.24		
	6	105027	-	105027	44.702			44.70		
10min	1	161617	-	161617	68.788	67.39	10.09	68.86	67.46	10.10
	2	126248	-	126248	53.734			53.77		
	3	169551	-	169551	72.165			72.23		
	4	162480	-	162480	69.155			69.23		
	5	164513	-	164513	70.021			70.10		
	6	165547	-	165547	70.461			70.54		
15min	1	185952	-	185952	79.146	78.92	5.35	79.33	79.10	5.37
	2	166652	-	166652	70.931			71.05		
	3	195985	-	195985	83.416			83.61		
	4	185941	-	185941	79.141			79.33		
	5	188603	-	188603	80.274			80.47		
	6	189423	-	189423	80.623			80.81		
20min	1	198124	-	198124	84.326	85.17	3.40	84.64	85.48	3.42
	2	190042	-	190042	80.886			81.13		
	3	211056	-	211056	89.831			90.16		
	4	198745	-	198745	84.591			84.91		
	5	200903	-	200903	85.509			85.84		
	6	201811	-	201811	85.896			86.22		
30min	1	212407	-	212407	90.406	91.69	2.12	90.86	92.14	2.13
	2	212025	-	212025	90.243			90.62		
	3	223778	-	223778	95.245			95.72		
	4	212212	-	212212	90.323			90.78		
	5	214920	-	214920	91.475			91.94		
	6	217146	-	217146	92.423			92.89		
45min	1	220998	-	220998	94.062	95.33	1.97	94.67	95.93	1.97
	2	222707	-	222707	94.789			95.31		
	3	232247	-	232247	98.850			99.49		
	4	219891	-	219891	93.591			94.20		
	5	223305	-	223305	95.044			95.66		
	6	224648	-	224648	95.616			96.24		
60min	1	224309	-	224309	95.471	96.60	1.86	96.24	97.36	1.86
	2	227166	-	227166	96.687			97.37		
	3	234304	-	234304	99.725			100.53		
	4	221785	-	221785	94.397			95.16		
	5	226637	-	226637	96.462			97.24		
	6	227547	-	227547	96.849			97.63		
极限	1	225905	-	225905	96.151	97.20	1.45	97.08	98.12	1.45
	2	228200	-	228200	97.127			97.97		
	3	234395	-	234395	99.764			100.73		
	4	224956	-	224956	95.747			96.67		
	5	228191	-	228191	97.124			98.06		
	6	228516	-	228516	97.262			98.21		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-08

复核者:

日　期:

未审阅版本

奥美沙坦酯片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100864-202205	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	233648	233842	233859	233387	234370	233821	0.16
2	11.11	235901	236406				236154	0.16

单位质量响应值		RSD%	判断
21008.18	21255.99	0.83	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-08

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-SD901YA批-pH2.0

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	103079	-	103079	43.814	38.33	33.30	43.81	38.33	33.31
	2	105135	-	105135	44.688			44.69		
	3	108189	-	108189	45.986			45.99		
	4	30167	-	30167	12.823			12.82		
	5	90432	-	90432	38.439			38.44		
	6	104014	-	104014	44.212			44.21		
10min	1	166707	-	166707	70.860	66.15	13.63	70.93	66.22	13.65
	2	167244	-	167244	71.088			71.16		
	3	166471	-	166471	70.759			70.84		
	4	112946	-	112946	48.008			48.03		
	5	157936	-	157936	67.132			67.20		
	6	162463	-	162463	69.056			69.13		
15min	1	190927	-	190927	81.155	78.41	7.10	81.35	78.58	7.13
	2	190853	-	190853	81.123			81.32		
	3	192368	-	192368	81.767			81.96		
	4	158197	-	158197	67.243			67.34		
	5	185454	-	185454	78.828			79.00		
	6	189015	-	189015	80.342			80.53		
20min	1	203420	-	203420	86.465	85.01	4.03	86.79	85.32	4.07
	2	204901	-	204901	87.094			87.42		
	3	205452	-	205452	87.329			87.66		
	4	184081	-	184081	78.245			78.46		
	5	199928	-	199928	84.981			85.29		
	6	202193	-	202193	85.943			86.27		
30min	1	216145	-	216145	91.874	91.62	1.78	92.34	92.07	1.83
	2	218591	-	218591	92.913			93.39		
	3	219380	-	219380	93.249			93.73		
	4	208926	-	208926	88.805			89.15		
	5	213562	-	213562	90.776			91.22		
	6	216680	-	216680	92.101			92.57		
45min	1	222844	-	222844	94.721	95.65	0.95	95.34	96.24	0.97
	2	227396	-	227396	96.656			97.28		
	3	227805	-	227805	96.830			97.46		
	4	223856	-	223856	95.151			95.64		
	5	223294	-	223294	94.912			95.51		
	6	224940	-	224940	95.612			96.23		
60min	1	224679	-	224679	95.501	96.67	0.97	96.28	97.42	0.97
	2	229932	-	229932	97.734			98.52		
	3	229481	-	229481	97.542			98.34		
	4	227648	-	227648	96.763			97.41		
	5	225002	-	225002	95.638			96.40		
	6	227795	-	227795	96.826			97.60		
极限	1	226815	-	226815	96.409	97.36	0.84	97.35	98.28	0.82
	2	230587	-	230587	98.012			98.96		
	3	229095	-	229095	97.378			98.33		
	4	230451	-	230451	97.954			98.77		
	5	226617	-	226617	96.325			97.24		
	6	230819	-	230819	98.111			99.05		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-08

复核者:

日　期:

未审阅版本

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 26-13/26-1638-1 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:01:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V1） : 2025/01/07 12:06:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1639-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:07:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V3） : 2025/01/08 11:25:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	235232	100.000	53217	4762	1.114	--
总计		235232	100.000	53217			

图2 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1640-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:11:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/08 11:25:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	235481	100.000	53162	4769	1.113	--
总计		235481	100.000	53162			

图3 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1641-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:16:46 实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/08 11:25:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	235125	100.000	52963	4768	1.115	--
总计		235125	100.000	52963			

图4 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1642-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:21:39 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:25:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	235352	100.000	53008	4759	1.114	--
总计		235352	100.000	53008			

图5 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1643-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:26:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:25:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	235160	100.000	52923	4764	1.113	--
总计		235160	100.000	52923			

图6 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1644-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:31:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:25:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	121714	100.000	28598	5177	1.103	--
总计		121714	100.000	28598			

图7 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1645-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:36:17 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:25:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	121025	100.000	28417	5163	1.102	--
总计		121025	100.000	28417			

图8 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1646-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:41:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:25:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	138701	100.000	32616	5175	1.103	--
总计		138701	100.000	32616			

图9 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1647-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:46:01 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:25:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	95318	100.000	22338	5175	1.106	--
总计		95318	100.000	22338			

图10 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1648-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:50:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:25:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	120724	100.000	28346	5177	1.104	--
总计		120724	100.000	28346			

图11 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1649-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:55:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:25:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	120455	100.000	28303	5172	1.104	--
总计		120455	100.000	28303			

图12 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1650-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:00:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:25:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	186033	100.000	43557	5173	1.103	--
总计		186033	100.000	43557			

图13 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1651-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:05:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:25:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	186594	100.000	43431	5163	1.104	--
总计		186594	100.000	43431			

图14 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1652-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:10:22 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:25:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	192701	100.000	44930	5160	1.103	--
总计		192701	100.000	44930			

图15 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1653-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:15:14 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:25:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	178324	100.000	41571	5174	1.104	--
总计		178324	100.000	41571			

图16 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1654-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:20:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	183294	100.000	42903	5174	1.105	--
总计		183294	100.000	42903			

图17 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1655-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:24:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	185290	100.000	43433	5166	1.103	--
总计		185290	100.000	43433			

图18 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1656-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:29:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	209292	100.000	48737	5157	1.104	--
总计		209292	100.000	48737			

图19 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1657-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:34:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	209586	100.000	49329	5178	1.103	--
总计		209586	100.000	49329			

图20 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1658-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:39:35 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	209944	100.000	49080	5165	1.106	--
总计		209944	100.000	49080			

图21 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1659-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:44:28 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	204722	100.000	47878	5174	1.104	--
总计		204722	100.000	47878			

图22 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1660-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:49:21 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	207892	100.000	48545	5180	1.104	--
总计		207892	100.000	48545			

图23 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1661-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:54:13 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	210636	100.000	49531	5186	1.103	--
总计		210636	100.000	49531			

图24 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1662-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:59:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	218880	100.000	51004	5166	1.101	--
总计		218880	100.000	51004			

图25 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1663-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:03:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	219195	100.000	51365	5177	1.103	--
总计		219195	100.000	51365			

图26 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1664-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:08:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	217897	100.000	51090	5192	1.103	--
总计		217897	100.000	51090			

图27 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1665-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:13:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	216078	100.000	50527	5172	1.103	--
总计		216078	100.000	50527			

图28 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1666-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:18:35 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	218830	100.000	51550	5188	1.102	--
总计		218830	100.000	51550			

图29 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1667-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:23:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	220164	100.000	51730	5184	1.103	--
总计		220164	100.000	51730			

图30 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1668-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:28:20 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	224538	100.000	52944	5207	1.104	--
总计		224538	100.000	52944			

图31 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1669-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:33:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	225470	100.000	52599	5186	1.104	--
总计		225470	100.000	52599			

图32 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1670-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:38:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:26:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	224234	100.000	52431	5192	1.105	--
总计		224234	100.000	52431			

图33 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1671-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:42:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	225005	100.000	52908	5181	1.103	--
总计		225005	100.000	52908			

图34 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1672-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:47:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	227469	100.000	53399	5176	1.103	--
总计		227469	100.000	53399			

图35 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1673-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:52:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:26:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	227586	100.000	53028	5175	1.104	--
总计		227586	100.000	53028			

图36 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1674-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:57:35 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	226336	100.000	53135	5180	1.103	--
总计		226336	100.000	53135			

图37 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1675-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:02:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	226490	100.000	52959	5171	1.105	--
总计		226490	100.000	52959			

图38 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1676-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:07:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	224940	100.000	52571	5181	1.104	--
总计		224940	100.000	52571			

图39 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1677-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:12:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	225296	100.000	52764	5185	1.104	--
总计		225296	100.000	52764			

图40 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1678-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:17:03 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	227538	100.000	53166	5184	1.104	--
总计		227538	100.000	53166			

图41 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1679-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:21:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	227781	100.000	53131	5184	1.105	--
总计		227781	100.000	53131			

图42 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1680-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:26:47 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:27:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	223750	100.000	52208	5166	1.104	--
总计		223750	100.000	52208			

图43 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1681-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:31:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	224132	100.000	52715	5188	1.103	--
总计		224132	100.000	52715			

图44 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1682-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:36:33 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:27:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	223062	100.000	52119	5166	1.105	--
总计		223062	100.000	52119			

图45 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1683-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:41:26 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:27:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	224051	100.000	52275	5173	1.105	--
总计		224051	100.000	52275			

图46 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1684-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:46:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	226037	100.000	53096	5182	1.102	--
总计		226037	100.000	53096			

图47 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1685-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:51:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	225812	100.000	52751	5183	1.105	--
总计		225812	100.000	52751			

图48 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1686-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:56:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	222545	100.000	52005	5180	1.104	--
总计		222545	100.000	52005			

图49 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1687-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:00:57 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	222397	100.000	51816	5174	1.105	--
总计		222397	100.000	51816			

图50 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1688-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:05:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:27:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	222584	100.000	52061	5169	1.104	--
总计		222584	100.000	52061			

图51 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1689-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:10:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	222054	100.000	51887	5171	1.105	--
总计		222054	100.000	51887			

图52 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1690-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:15:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	224184	100.000	52486	5172	1.104	--
总计		224184	100.000	52486			

图53 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1691-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:20:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:27:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	224452	100.000	52650	5164	1.104	--
总计		224452	100.000	52650			

图54 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1692-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:25:22 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	235013	100.000	53363	4749	1.112	--
总计		235013	100.000	53363			

图55 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1693-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:30:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	234825	100.000	53112	4757	1.113	--
总计		234825	100.000	53112			

图56 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1694-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:35:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:27:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1695-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:40:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.990	236571	100.000	53707	4769	1.114	--
总计		236571	100.000	53707			

图58 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1696-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:44:59 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	236376	100.000	53862	4773	1.113	--
总计		236376	100.000	53862			

图59 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1697-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:49:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	236605	100.000	53864	4766	1.113	--
总计		236605	100.000	53864			

图60 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1698-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:54:47 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.990	235844	100.000	53671	4776	1.113	--
总计		235844	100.000	53671			

图61 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1699-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:59:41 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.990	235905	100.000	53661	4772	1.114	--
总计		235905	100.000	53661			

图62 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1700-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:04:35 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	113892	100.000	26642	5186	1.105	--
总计		113892	100.000	26642			

图63 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1701-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:09:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	123237	100.000	28763	5163	1.106	--
总计		123237	100.000	28763			

图64 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1702-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:14:22 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	110368	100.000	25935	5193	1.104	--
总计		110368	100.000	25935			

图65 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1703-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:19:16 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	112031	100.000	26337	5199	1.107	--
总计		112031	100.000	26337			

图66 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1704-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:24:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	108791	100.000	25358	5180	1.103	--
总计		108791	100.000	25358			

图67 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1705-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:29:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	66115	100.000	15479	5210	1.109	--
总计		66115	100.000	15479			

图68 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1706-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:33:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	182593	100.000	42752	5170	1.104	--
总计		182593	100.000	42752			

图69 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1707-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:38:51 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	186666	100.000	43889	5182	1.104	--
总计		186666	100.000	43889			

图70 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1708-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:43:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	182696	100.000	42834	5174	1.105	--
总计		182696	100.000	42834			

图71 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1709-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:48:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	187558	100.000	44150	5180	1.106	--
总计		187558	100.000	44150			

图72 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1710-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:53:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	182606	100.000	42742	5187	1.106	--
总计		182606	100.000	42742			

图73 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1711-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:58:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	151193	100.000	35500	5181	1.107	--
总计		151193	100.000	35500			

图74 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1712-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:03:18 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	206784	100.000	48696	5196	1.105	--
总计		206784	100.000	48696			

图75 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1713-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:08:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	211208	100.000	49658	5185	1.107	--
总计		211208	100.000	49658			

图76 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1714-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:13:05 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:28:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	206689	100.000	48620	5174	1.105	--
总计		206689	100.000	48620			

图77 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1715-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:17:59 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:28:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	211863	100.000	49814	5187	1.107	--
总计		211863	100.000	49814			

图78 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1716-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:22:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	209225	100.000	49176	5202	1.107	--
总计		209225	100.000	49176			

图79 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1717-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:27:46 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	194898	100.000	45782	5194	1.106	--
总计		194898	100.000	45782			

图80 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1718-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:32:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:29:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	217686	100.000	51268	5186	1.105	--
总计		217686	100.000	51268			

图81 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1719-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:37:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	221002	100.000	51883	5182	1.106	--
总计		221002	100.000	51883			

图82 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1720-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:42:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	216954	100.000	51081	5188	1.106	--
总计		216954	100.000	51081			

图83 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1721-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:47:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	221711	100.000	52161	5189	1.107	--
总计		221711	100.000	52161			

图84 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1722-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:52:17 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	220601	100.000	51861	5169	1.105	--
总计		220601	100.000	51861			

图85 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1723-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:57:10 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	215169	100.000	50607	5185	1.105	--
总计		215169	100.000	50607			

图86 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1724-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:02:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	224426	100.000	52795	5176	1.106	--
总计		224426	100.000	52795			

图87 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1725-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:06:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	227436	100.000	53559	5184	1.106	--
总计		227436	100.000	53559			

图88 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1726-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:11:52 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:29:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	224823	100.000	52834	5182	1.107	--
总计		224823	100.000	52834			

图89 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1727-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:16:46 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:29:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	229548	100.000	53895	5172	1.106	--
总计		229548	100.000	53895			

图90 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1728-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:21:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:29:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	227089	100.000	53318	5189	1.106	--
总计		227089	100.000	53318			

图91 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1729-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:26:34 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	229004	100.000	53847	5170	1.105	--
总计		229004	100.000	53847			

图92 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1730-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:31:28 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	225770	100.000	52780	5191	1.107	--
总计		225770	100.000	52780			

图93 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1731-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:36:22 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:29:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	228790	100.000	53575	5172	1.108	--
总计		228790	100.000	53575			

图94 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1732-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:41:16 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:29:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	226552	100.000	53261	5175	1.107	--
总计		226552	100.000	53261			

图95 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1733-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:46:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:29:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	229907	100.000	53701	5192	1.107	--
总计		229907	100.000	53701			

图96 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1734-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:51:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	227872	100.000	53416	5177	1.108	--
总计		227872	100.000	53416			

图97 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1735-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:55:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:29:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	231442	100.000	54073	5196	1.108	--
总计		231442	100.000	54073			

图98 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1736-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:00:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:29:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	222652	100.000	52003	5195	1.109	--
总计		222652	100.000	52003			

图99 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1737-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:05:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	225020	100.000	52910	5187	1.106	--
总计		225020	100.000	52910			

图100 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1738-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:10:39 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	223420	100.000	52480	5178	1.107	--
总计		223420	100.000	52480			

图101 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1739-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:15:33 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:30:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	226885	100.000	53276	5174	1.107	--
总计		226885	100.000	53276			

图102 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1740-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:20:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	224266	100.000	52706	5184	1.107	--
总计		224266	100.000	52706			

图103 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1741-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:25:21 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	228789	100.000	53630	5165	1.106	--
总计		228789	100.000	53630			

图104 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1742-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:30:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	220288	100.000	51404	5191	1.107	--
总计		220288	100.000	51404			

图105 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1743-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:35:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	222564	100.000	52327	5186	1.107	--
总计		222564	100.000	52327			

图106 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1744-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:40:03 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	221779	100.000	51736	5188	1.109	--
总计		221779	100.000	51736			

图107 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1745-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:44:57 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	224279	100.000	52611	5174	1.108	--
总计		224279	100.000	52611			

图108 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1746-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:49:51 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:30:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	222234	100.000	52164	5155	1.106	--
总计		222234	100.000	52164			

图109 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1747-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:54:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	226768	100.000	53194	5186	1.107	--
总计		226768	100.000	53194			

图110 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1748-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:59:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	235490	100.000	53419	4757	1.115	--
总计		235490	100.000	53419			

图111 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1749-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH6.8jz-2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:04:34 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	234533	100.000	53332	4790	1.116	--
总计		234533	100.000	53332			

图112 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1750-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:09:26 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1751-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:14:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	234662	100.000	53405	4789	1.116	--
总计		234662	100.000	53405			

图114 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1752-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:19:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:30:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	235231	100.000	53373	4773	1.117	--
总计		235231	100.000	53373			

图115 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1753-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:24:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:30:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	234683	100.000	53381	4788	1.116	--
总计		234683	100.000	53381			

图116 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1754-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:28:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	235018	100.000	53281	4789	1.117	--
总计		235018	100.000	53281			

图117 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1755-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:33:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	235426	100.000	53393	4778	1.116	--
总计		235426	100.000	53393			

图118 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1756-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:38:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:30:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	100630	100.000	23113	4997	1.113	--
总计		100630	100.000	23113			

图119 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1757-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:43:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:30:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	43955	100.000	10148	4997	1.112	--
总计		43955	100.000	10148			

图120 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1758-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:48:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	98393	100.000	22774	5016	1.111	--
总计		98393	100.000	22774			

图121 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1759-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:53:16 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:31:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	102319	100.000	23569	4996	1.111	--
总计		102319	100.000	23569			

图122 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1760-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:58:08 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:31:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	106281	100.000	24554	5010	1.111	--
总计		106281	100.000	24554			

图123 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1761-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:03:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:31:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	105027	100.000	24086	5009	1.114	--
总计		105027	100.000	24086			

图124 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1762-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:07:52 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:31:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	161617	100.000	37153	4981	1.112	--
总计		161617	100.000	37153			

图125 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1763-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:12:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	126248	100.000	29152	4987	1.114	--
总计		126248	100.000	29152			

图126 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1764-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:17:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	169551	100.000	38920	5000	1.115	--
总计		169551	100.000	38920			

图127 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1765-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:22:28 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	162480	100.000	37331	4999	1.113	--
总计		162480	100.000	37331			

图128 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1766-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:27:20 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:31:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	164513	100.000	37796	4999	1.114	--
总计		164513	100.000	37796			

图129 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1767-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:32:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	165547	100.000	38227	5001	1.113	--
总计		165547	100.000	38227			

图130 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1768-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:37:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	185952	100.000	42796	5013	1.112	--
总计		185952	100.000	42796			

图131 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1769-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:41:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	166652	100.000	38341	4996	1.113	--
总计		166652	100.000	38341			

图132 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1770-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:46:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	195985	100.000	45352	4992	1.113	--
总计		195985	100.000	45352			

图133 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1771-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:51:39 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	185941	100.000	42940	4983	1.113	--
总计		185941	100.000	42940			

图134 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1772-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:56:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	188603	100.000	43691	4994	1.112	--
总计		188603	100.000	43691			

图135 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1773-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:01:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	189423	100.000	43827	4980	1.111	--
总计		189423	100.000	43827			

图136 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1774-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:06:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	198124	100.000	45746	5011	1.114	--
总计		198124	100.000	45746			

图137 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1775-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:11:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	190042	100.000	43958	5000	1.114	--
总计		190042	100.000	43958			

图138 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1776-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:15:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	211056	100.000	48606	4984	1.114	--
总计		211056	100.000	48606			

图139 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1777-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:20:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:31:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	198745	100.000	46068	4991	1.112	--
总计		198745	100.000	46068			

图140 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1778-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:25:41 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:31:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	200903	100.000	46402	4997	1.113	--
总计		200903	100.000	46402			

图141 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1779-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:30:33 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	201811	100.000	46311	5011	1.113	--
总计		201811	100.000	46311			

图142 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1780-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:35:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	212407	100.000	49204	4991	1.113	--
总计		212407	100.000	49204			

图143 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1781-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:40:17 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	212025	100.000	49175	4989	1.113	--
总计		212025	100.000	49175			

图144 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1782-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:45:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	223778	100.000	51850	4986	1.112	--
总计		223778	100.000	51850			

图145 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1783-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:50:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	212212	100.000	49109	4979	1.112	--
总计		212212	100.000	49109			

图146 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1784-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:54:52 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	214920	100.000	49616	5004	1.113	--
总计		214920	100.000	49616			

图147 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1785-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:59:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	217146	100.000	49992	4988	1.114	--
总计		217146	100.000	49992			

图148 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1786-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:04:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	220998	100.000	51144	4973	1.111	--
总计		220998	100.000	51144			

图149 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1787-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:09:28 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	222707	100.000	51529	4975	1.110	--
总计		222707	100.000	51529			

图150 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1788-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:14:20 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	232247	100.000	53798	4986	1.111	--
总计		232247	100.000	53798			

图151 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1789-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:19:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	219891	100.000	50955	4982	1.111	--
总计		219891	100.000	50955			

图152 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1790-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:24:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	223305	100.000	51463	4998	1.112	--
总计		223305	100.000	51463			

图153 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1791-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:28:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	224648	100.000	51709	5001	1.114	--
总计		224648	100.000	51709			

图154 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1792-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:33:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	224309	100.000	52023	4994	1.112	--
总计		224309	100.000	52023			

图155 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1793-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:38:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	227166	100.000	52542	5008	1.113	--
总计		227166	100.000	52542			

图156 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1794-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:43:28 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	234304	100.000	53997	4992	1.114	--
总计		234304	100.000	53997			

图157 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1795-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:48:20 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	221785	100.000	51426	4986	1.111	--
总计		221785	100.000	51426			

图158 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1796-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:53:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	226637	100.000	52444	4988	1.112	--
总计		226637	100.000	52444			

图159 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1797-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:58:03 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	227547	100.000	52505	5000	1.111	--
总计		227547	100.000	52505			

图160 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1798-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:02:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:32:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	225905	100.000	52384	4987	1.111	--
总计		225905	100.000	52384			

图161 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1799-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:07:47 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:32:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	228200	100.000	52743	4969	1.111	--
总计		228200	100.000	52743			

图162 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1800-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:12:39 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	234395	100.000	54373	4997	1.112	--
总计		234395	100.000	54373			

图163 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1801-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:17:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	224956	100.000	52179	4997	1.111	--
总计		224956	100.000	52179			

图164 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1802-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:22:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	228191	100.000	52824	4975	1.110	--
总计		228191	100.000	52824			

图165 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1803-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:27:16 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	228516	100.000	52973	4991	1.112	--
总计		228516	100.000	52973			

图166 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1804-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:32:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	234394	100.000	53007	4780	1.116	--
总计		234394	100.000	53007			

图167 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1805-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:37:01 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	234266	100.000	53302	4754	1.117	--
总计		234266	100.000	53302			

图168 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1806-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:41:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1807-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:46:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	233648	100.000	52912	4769	1.117	--
总计		233648	100.000	52912			

图170 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1808-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:51:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.990	233842	100.000	53082	4761	1.116	--
总计		233842	100.000	53082			

图171 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1809-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:56:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	233859	100.000	52876	4747	1.117	--
总计		233859	100.000	52876			

图172 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1810-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:01:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.990	233387	100.000	52973	4764	1.116	--
总计		233387	100.000	52973			

图173 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1811-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:06:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	234370	100.000	52848	4742	1.117	--
总计		234370	100.000	52848			

图174 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1812-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:11:17 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	103079	100.000	23928	4998	1.111	--
总计		103079	100.000	23928			

图175 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1813-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:16:10 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	105135	100.000	24360	4995	1.112	--
总计		105135	100.000	24360			

图176 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1814-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:21:03 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	108189	100.000	25117	4991	1.110	--
总计		108189	100.000	25117			

图177 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1815-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:25:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	30167	100.000	6987	4993	1.117	--
总计		30167	100.000	6987			

图178 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1816-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:30:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	90432	100.000	20940	5000	1.112	--
总计		90432	100.000	20940			

图179 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1817-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:35:41 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:33:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	104014	100.000	24056	4985	1.111	--
总计		104014	100.000	24056			

图180 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1818-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:40:33 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	166707	100.000	38522	4989	1.112	--
总计		166707	100.000	38522			

图181 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1819-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:45:26 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	167244	100.000	38623	5000	1.111	--
总计		167244	100.000	38623			

图182 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1820-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:50:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:33:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	166471	100.000	38582	4980	1.112	--
总计		166471	100.000	38582			

图183 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1821-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:55:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:34:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	112946	100.000	26101	4975	1.112	--
总计		112946	100.000	26101			

图184 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1822-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:00:03 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	157936	100.000	36645	4993	1.110	--
总计		157936	100.000	36645			

图185 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1823-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:04:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:34:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	162463	100.000	37691	4995	1.111	--
总计		162463	100.000	37691			

图186 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1824-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:09:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	190927	100.000	44253	4995	1.112	--
总计		190927	100.000	44253			

图187 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1825-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:14:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	190853	100.000	44237	4976	1.111	--
总计		190853	100.000	44237			

图188 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1826-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:19:35 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:34:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	192368	100.000	44712	5011	1.111	--
总计		192368	100.000	44712			

图189 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1827-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:24:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:34:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	158197	100.000	36702	4993	1.112	--
总计		158197	100.000	36702			

图190 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1828-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:29:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:34:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	185454	100.000	42981	4998	1.111	--
总计		185454	100.000	42981			

图191 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1829-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:34:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:34:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	189015	100.000	43843	4998	1.112	--
总计		189015	100.000	43843			

图192 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1830-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:39:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	203420	100.000	46976	4984	1.111	--
总计		203420	100.000	46976			

图193 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1831-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:43:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	204901	100.000	47473	5003	1.112	--
总计		204901	100.000	47473			

图194 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1832-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:48:52 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	205452	100.000	47624	4989	1.111	--
总计		205452	100.000	47624			

图195 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1833-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:53:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	184081	100.000	42639	5002	1.112	--
总计		184081	100.000	42639			

图196 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1834-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:58:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	199928	100.000	46306	4995	1.111	--
总计		199928	100.000	46306			

图197 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1835-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:03:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:34:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	202193	100.000	46917	5008	1.113	--
总计		202193	100.000	46917			

图198 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1836-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:08:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	216145	100.000	50086	5001	1.111	--
总计		216145	100.000	50086			

图199 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1837-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:13:18 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:34:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	218591	100.000	50671	5002	1.112	--
总计		218591	100.000	50671			

图200 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1838-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:18:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	219380	100.000	50909	5002	1.112	--
总计		219380	100.000	50909			

图201 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1839-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:23:05 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	208926	100.000	48252	4995	1.112	--
总计		208926	100.000	48252			

图202 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1840-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:27:57 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:34:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	213562	100.000	49357	4985	1.112	--
总计		213562	100.000	49357			

图203 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1841-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:32:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	216680	100.000	50216	4985	1.110	--
总计		216680	100.000	50216			

图204 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1842-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:37:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	222844	100.000	51643	5000	1.112	--
总计		222844	100.000	51643			

图205 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1843-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:42:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	227396	100.000	52735	4995	1.112	--
总计		227396	100.000	52735			

图206 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1844-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:47:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	227805	100.000	52884	5014	1.111	--
总计		227805	100.000	52884			

图207 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1845-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:52:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	223856	100.000	51915	4999	1.112	--
总计		223856	100.000	51915			

图208 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1846-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:57:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:35:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	223294	100.000	51787	4998	1.112	--
总计		223294	100.000	51787			

图209 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1847-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:02:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	224940	100.000	52234	5002	1.111	--
总计		224940	100.000	52234			

图210 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1848-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:07:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	224679	100.000	52046	5002	1.112	--
总计		224679	100.000	52046			

图211 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1849-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:11:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:35:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	229932	100.000	53305	4983	1.111	--
总计		229932	100.000	53305			

图212 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1850-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:16:47 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	229481	100.000	53310	4995	1.111	--
总计		229481	100.000	53310			

图213 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1851-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:21:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:35:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	227648	100.000	52714	5002	1.111	--
总计		227648	100.000	52714			

图214 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1852-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:26:33 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	225002	100.000	51666	4981	1.112	--
总计		225002	100.000	51666			

图215 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1853-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:31:26 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	227795	100.000	52617	4988	1.111	--
总计		227795	100.000	52617			

图216 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1854-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:36:21 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	226815	100.000	52637	4997	1.111	--
总计		226815	100.000	52637			

图217 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1855-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:41:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:35:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	230587	100.000	53434	4998	1.111	--
总计		230587	100.000	53434			

图218 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1856-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:46:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/08 11:35:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	229095	100.000	53229	5010	1.111	--
总计		229095	100.000	53229			

图219 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1857-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:51:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	230451	100.000	53397	4982	1.111	--
总计		230451	100.000	53397			

图220 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1858-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:55:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	226617	100.000	52574	5005	1.112	--
总计		226617	100.000	52574			

图221 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1859-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 06:00:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	230819	100.000	53503	4995	1.112	--
总计		230819	100.000	53503			

图222 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1860-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 06:05:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	235901	100.000	53170	4782	1.116	--
总计		235901	100.000	53170			

图223 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm） 流速: 2.0ml/min
柱 温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC$SMF-210 - 0-137/26-1861-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH2.0jz-2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX275-amst.lcm
批处理文件名: RC$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 06:10:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2） : 2025/01/08 11:35:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	236406	100.000	53229	4757	1.116	--
总计		236406	100.000	53229			

图224 奥美沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-SD901YA批(20mg规格)-pH2.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2