



苯磺酸氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100546-202105	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7210


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.34	16833	17134	16966	16859	16977	16954	0.71
2	15.23	16900	16903				16902	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
1105.22	1109.78	0.30	数据可信

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-8167603批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	17859	-	17859	50.907	58.18	9.16	50.91	58.18	9.16
	2	19601	-	19601	55.872			55.87		
	3	19221	-	19221	54.789			54.79		
	4	21038	-	21038	59.969			59.97		
	5	23001	-	23001	65.564			65.56		
	6	21748	-	21748	61.992			61.99		
10min	1	25190	-	25190	71.804	81.34	7.85	71.89	81.44	7.85
	2	26640	-	26640	75.937			76.03		
	3	28338	-	28338	80.777			80.87		
	4	29881	-	29881	85.175			85.28		
	5	30508	-	30508	86.963			87.07		
	6	30662	-	30662	87.402			87.50		
15min	1	27954	-	27954	79.683	88.85	6.41	79.89	89.08	6.41
	2	29483	-	29483	84.041			84.26		
	3	32213	-	32213	91.823			92.05		
	4	31784	-	31784	90.600			90.84		
	5	32709	-	32709	93.237			93.49		
	6	32870	-	32870	93.696			93.94		
20min	1	29990	-	29990	85.486	93.69	5.43	85.82	94.06	5.43
	2	31264	-	31264	89.118			89.48		
	3	34091	-	34091	97.176			97.55		
	4	34044	-	34044	97.042			97.43		
	5	33903	-	33903	96.640			97.05		
	6	33906	-	33906	96.649			97.05		
30min	1	32664	-	32664	93.108	98.52	3.95	93.59	99.06	3.96
	2	33173	-	33173	94.559			95.07		
	3	36213	-	36213	103.225			103.77		
	4	35133	-	35133	100.146			100.70		
	5	35366	-	35366	100.810			101.38		
	6	34823	-	34823	99.263			99.83		
45min	1	34274	-	34274	97.698	101.04	2.85	98.33	101.74	2.86
	2	34339	-	34339	97.883			98.55		
	3	36704	-	36704	104.624			105.34		
	4	36021	-	36021	102.677			103.40		
	5	36152	-	36152	103.051			103.79		
	6	35188	-	35188	100.303			101.03		
60min	1	35079	-	35079	99.992	101.22	2.63	100.79	102.09	2.64
	2	33974	-	33974	96.842			97.67		
	3	36681	-	36681	104.559			105.45		
	4	35931	-	35931	102.421			103.31		
	5	36009	-	36009	102.643			103.55		
	6	35393	-	35393	100.887			101.79		
极限	1	35155	-	35155	100.209	101.75	2.70	101.17	102.79	2.71
	2	34027	-	34027	96.994			97.98		
	3	36517	-	36517	104.091			105.15		
	4	35779	-	35779	101.988			103.05		
	5	36258	-	36258	103.353			104.43		
	6	36443	-	36443	103.880			104.95		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-09

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100546-202105	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7210

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.34	17391	17322	17346	17372	17347	17356	0.16
2	15.23	16916	16934				16925	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
1131.42				1.27	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-8167603批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	19663	-	19663	55.361	57.67	5.83	55.36	57.68	5.83
	2	19422	-	19422	54.682			54.68		
	3	19189	-	19189	54.026			54.03		
	4	21120	-	21120	59.463			59.46		
	5	21737	-	21737	61.200			61.20		
	6	21778	-	21778	61.315			61.32		
10min	1	30204	-	30204	85.039	82.10	5.69	85.13	82.20	5.69
	2	26026	-	26026	73.276			73.37		
	3	28956	-	28956	81.525			81.61		
	4	29476	-	29476	82.989			83.09		
	5	29539	-	29539	83.166			83.27		
	6	30762	-	30762	86.610			86.71		
15min	1	33136	-	33136	93.294	89.30	5.21	93.53	89.53	5.21
	2	28827	-	28827	81.162			81.37		
	3	31086	-	31086	87.522			87.75		
	4	32992	-	32992	92.888			93.13		
	5	31457	-	31457	88.566			88.81		
	6	32805	-	32805	92.362			92.61		
20min	1	34163	-	34163	96.185	93.22	4.09	96.57	93.60	4.09
	2	30824	-	30824	86.784			87.13		
	3	32652	-	32652	91.931			92.30		
	4	34683	-	34683	97.649			98.04		
	5	32929	-	32929	92.711			93.10		
	6	33405	-	33405	94.051			94.45		
30min	1	35626	-	35626	100.304	97.83	3.76	100.85	98.36	3.76
	2	32762	-	32762	92.241			92.73		
	3	33719	-	33719	94.935			95.46		
	4	36349	-	36349	102.340			102.89		
	5	34870	-	34870	98.176			98.72		
	6	35153	-	35153	98.972			99.53		
45min	1	35827	-	35827	100.870	99.69	3.52	101.59	100.39	3.52
	2	33514	-	33514	94.358			95.00		
	3	35909	-	35909	101.101			101.78		
	4	37200	-	37200	104.736			105.46		
	5	34692	-	34692	97.674			98.38		
	6	35313	-	35313	99.423			100.15		
60min	1	35969	-	35969	101.270	100.53	3.57	102.15	101.39	3.57
	2	33810	-	33810	95.191			96.00		
	3	35736	-	35736	100.614			101.47		
	4	37722	-	37722	106.205			107.11		
	5	35128	-	35128	98.902			99.77		
	6	35865	-	35865	100.977			101.86		
极限	1	36212	-	36212	101.954	99.70	3.06	103.01	100.74	3.06
	2	33673	-	33673	94.805			95.77		
	3	35610	-	35610	100.259			101.28		
	4	36801	-	36801	103.612			104.69		
	5	35082	-	35082	98.772			99.81		
	6	35089	-	35089	98.792			99.85		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-09

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100546-202105	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7210

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.34	16952	16840	16877	17017	16875	16912	0.43
2	15.23	16834	16859				16846	0.11
单位质量响应值				RSD%	判断			
1102.48				0.24	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-8167603批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	10640	-	10640	30.417	30.29	5.39	30.42	30.29	5.39
	2	10365	-	10365	29.631			29.63		
	3	9655	-	9655	27.601			27.60		
	4	10879	-	10879	31.100			31.10		
	5	11371	-	11371	32.507			32.51		
	6	10664	-	10664	30.486			30.49		
10min	1	17686	-	17686	50.560	52.33	6.64	50.61	52.38	6.64
	2	17474	-	17474	49.954			50.00		
	3	17117	-	17117	48.933			48.98		
	4	18019	-	18019	51.512			51.56		
	5	20285	-	20285	57.990			58.04		
	6	19249	-	19249	55.028			55.08		
15min	1	20374	-	20374	58.244	61.28	5.44	58.38	61.42	5.44
	2	20588	-	20588	58.856			58.99		
	3	20186	-	20186	57.707			57.83		
	4	22304	-	22304	63.762			63.90		
	5	22504	-	22504	64.334			64.48		
	6	22657	-	22657	64.771			64.91		
20min	1	22257	-	22257	63.627	66.34	5.52	63.86	66.58	5.52
	2	22164	-	22164	63.362			63.59		
	3	22051	-	22051	63.039			63.26		
	4	23343	-	23343	66.732			66.98		
	5	24324	-	24324	69.537			69.79		
	6	25106	-	25106	71.772			72.02		
30min	1	24594	-	24594	70.308	73.71	5.43	70.65	74.06	5.43
	2	23842	-	23842	68.159			68.49		
	3	25594	-	25594	73.167			73.50		
	4	26171	-	26171	74.817			75.17		
	5	27511	-	27511	78.647			79.02		
	6	26983	-	26983	77.138			77.51		
45min	1	26820	-	26820	76.672	80.05	3.59	77.13	80.52	3.60
	2	27196	-	27196	77.747			78.20		
	3	27386	-	27386	78.290			78.74		
	4	28365	-	28365	81.089			81.57		
	5	29116	-	29116	83.236			83.74		
	6	29118	-	29118	83.241			83.74		
60min	1	28448	-	28448	81.326	83.84	2.52	81.91	84.45	2.53
	2	28544	-	28544	81.600			82.18		
	3	29439	-	29439	84.159			84.74		
	4	29263	-	29263	83.656			84.27		
	5	30104	-	30104	86.060			86.70		
	6	30175	-	30175	86.263			86.90		
极限	1	33369	-	33369	95.394	98.54	2.97	96.11	99.29	2.96
	2	33464	-	33464	95.666			96.38		
	3	35855	-	35855	102.501			103.22		
	4	33946	-	33946	97.044			97.80		
	5	35009	-	35009	100.082			100.87		
	6	35181	-	35181	100.574			101.36		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-09

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100546-202105	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7210

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.34	16973	16928	16916	16962	16879	16932	0.23
2	15.23	17027	17093				17060	0.28
单位质量响应值				RSD%	判断			
1103.78				1.05	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-8167603批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	10656	-	10656	30.254	29.67	5.68	30.25	29.66	5.69
	2	10533	-	10533	29.905			29.90		
	3	10677	-	10677	30.314			30.31		
	4	10078	-	10078	28.613			28.61		
	5	11245	-	11245	31.926			31.93		
	6	9508	-	9508	26.995			26.99		
10min	1	18498	-	18498	52.519	51.63	1.12	52.57	51.68	1.13
	2	18185	-	18185	51.630			51.68		
	3	18180	-	18180	51.616			51.67		
	4	17869	-	17869	50.733			50.78		
	5	18256	-	18256	51.832			51.89		
	6	18119	-	18119	51.443			51.49		
15min	1	22350	-	22350	63.455	60.63	2.95	63.59	60.77	2.95
	2	21016	-	21016	59.668			59.80		
	3	21692	-	21692	61.587			61.72		
	4	21066	-	21066	59.810			59.94		
	5	20539	-	20539	58.314			58.45		
	6	21473	-	21473	60.965			61.10		
20min	1	24560	-	24560	69.730	67.38	2.46	69.97	67.61	2.46
	2	23249	-	23249	66.008			66.24		
	3	24022	-	24022	68.203			68.44		
	4	22936	-	22936	65.119			65.35		
	5	23966	-	23966	68.044			68.28		
	6	23653	-	23653	67.155			67.39		
30min	1	27292	-	27292	77.487	75.19	2.07	77.85	75.54	2.07
	2	25720	-	25720	73.023			73.37		
	3	26380	-	26380	74.897			75.25		
	4	26090	-	26090	74.074			74.41		
	5	26710	-	26710	75.834			76.18		
	6	26703	-	26703	75.814			76.16		
45min	1	30257	-	30257	85.905	81.92	3.52	86.39	82.39	3.50
	2	27775	-	27775	78.858			79.33		
	3	28711	-	28711	81.515			81.99		
	4	29020	-	29020	82.393			82.86		
	5	27698	-	27698	78.639			79.12		
	6	29651	-	29651	84.184			84.65		
60min	1	30965	-	30965	87.915	85.38	2.59	88.55	85.99	2.59
	2	29317	-	29317	83.236			83.83		
	3	30130	-	30130	85.544			86.16		
	4	30170	-	30170	85.658			86.26		
	5	29028	-	29028	82.415			83.02		
	6	30821	-	30821	87.506			88.12		
极限	1	35079	-	35079	99.595	97.62	3.44	100.37	98.37	3.42
	2	33578	-	33578	95.334			96.07		
	3	35442	-	35442	100.626			101.38		
	4	34521	-	34521	98.011			98.75		
	5	32407	-	32407	92.009			92.75		
	6	35272	-	35272	100.143			100.90		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-09

复核者:

未审阅版本



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1538-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 14:10:13
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:28:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1539-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 14:15:06
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	16833	100.000	3619	5734	1.066	--
总计		16833	100.000	3619			

图2 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1540-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 14:19:59
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	17134	100.000	3651	5737	1.068	--
总计		17134	100.000	3651			

图3 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1541-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 14:24:52
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	16966	100.000	3658	5725	1.063	--
总计		16966	100.000	3658			

图4 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1542-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 14:29:45
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	16859	100.000	3645	5758	1.070	--
总计		16859	100.000	3645			

图5 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1543-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:34:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	16977	100.000	3659	5736	1.065	--
总计		16977	100.000	3659			

图6 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1544-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 14:39:33

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	17859	100.000	3918	6137	1.062	--
总计		17859	100.000	3918			

图7 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1545-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:44:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	19601	100.000	4313	6154	1.058	--
总计		19601	100.000	4313			

图8 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1546-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:49:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	19221	100.000	4233	6151	1.053	--
总计		19221	100.000	4233			

图9 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1547-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:54:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	21038	100.000	4633	6115	1.057	--
总计		21038	100.000	4633			

图10 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1548-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 14:59:05

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	23001	100.000	5086	6132	1.056	--
总计		23001	100.000	5086			

图11 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1549-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 15:04:03

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	21748	100.000	4821	6138	1.052	--
总计		21748	100.000	4821			

图12 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1550-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:08:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	25190	100.000	5555	6127	1.058	--
总计		25190	100.000	5555			

图13 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1551-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:13:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	26640	100.000	5906	6143	1.055	--
总计		26640	100.000	5906			

图14 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1552-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 15:18:41

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	28338	100.000	6239	6138	1.060	--
总计		28338	100.000	6239			

图15 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1553-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:23:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	29881	100.000	6610	6149	1.057	--
总计		29881	100.000	6610			

图16 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1554-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:28:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	30508	100.000	6746	6152	1.057	--
总计		30508	100.000	6746			

图17 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1555-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:33:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	30662	100.000	6758	6132	1.055	--
总计		30662	100.000	6758			

图18 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1556-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:38:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	27954	100.000	6153	6125	1.058	--
总计		27954	100.000	6153			

图19 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1557-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:43:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	29483	100.000	6482	6125	1.059	--
总计		29483	100.000	6482			

图20 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1558-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:47:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	32213	100.000	7101	6140	1.064	--
总计		32213	100.000	7101			

图21 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1559-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:52:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	31784	100.000	6987	6112	1.063	--
总计		31784	100.000	6987			

图22 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1560-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:57:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	32709	100.000	7222	6156	1.056	--
总计		32709	100.000	7222			

图23 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1561-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:02:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	32870	100.000	7237	6138	1.056	--
总计		32870	100.000	7237			

图24 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1562-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:07:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	29990	100.000	6606	6148	1.054	--
总计		29990	100.000	6606			

图25 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1563-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:12:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	31264	100.000	6881	6140	1.058	--
总计		31264	100.000	6881			

图26 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1564-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:17:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34091	100.000	7513	6126	1.059	--
总计		34091	100.000	7513			

图27 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1565-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:22:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34044	100.000	7491	6144	1.060	--
总计		34044	100.000	7491			

图28 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1566-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:26:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	33903	100.000	7476	6152	1.055	--
总计		33903	100.000	7476			

图29 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1567-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:31:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	33906	100.000	7461	6150	1.061	--
总计		33906	100.000	7461			

图30 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1568-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:36:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	32664	100.000	7192	6144	1.061	--
总计		32664	100.000	7192			

图31 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1569-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:41:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	33173	100.000	7296	6122	1.059	--
总计		33173	100.000	7296			

图32 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1570-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:46:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	36213	100.000	8011	6160	1.061	--
总计		36213	100.000	8011			

图33 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1571-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:51:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	35133	100.000	7732	6129	1.056	--
总计		35133	100.000	7732			

图34 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1572-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:56:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	35366	100.000	7793	6150	1.057	--
总计		35366	100.000	7793			

图35 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1573-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:01:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34823	100.000	7671	6163	1.058	--
总计		34823	100.000	7671			

图36 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1574-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:05:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34274	100.000	7549	6133	1.057	--
总计		34274	100.000	7549			

图37 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1575-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:10:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34339	100.000	7552	6146	1.058	--
总计		34339	100.000	7552			

图38 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1576-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:15:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	36704	100.000	8083	6123	1.055	--
总计		36704	100.000	8083			

图39 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1577-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:20:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	36021	100.000	7927	6135	1.057	--
总计		36021	100.000	7927			

图40 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1578-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:25:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	36152	100.000	7934	6125	1.059	--
总计		36152	100.000	7934			

图41 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1579-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:30:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	35188	100.000	7776	6149	1.059	--
总计		35188	100.000	7776			

图42 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1580-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:35:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	35079	100.000	7740	6140	1.058	--
总计		35079	100.000	7740			

图43 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1581-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:40:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	33974	100.000	7500	6116	1.063	--
总计		33974	100.000	7500			

图44 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1582-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:44:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	36681	100.000	8119	6137	1.061	--
总计		36681	100.000	8119			

图45 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1583-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:49:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35931	100.000	7945	6141	1.058	--
总计		35931	100.000	7945			

图46 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1584-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:54:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	36009	100.000	7954	6133	1.058	--
总计		36009	100.000	7954			

图47 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1585-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:59:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35393	100.000	7801	6135	1.058	--
总计		35393	100.000	7801			

图48 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1586-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:04:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35155	100.000	7762	6132	1.055	--
总计		35155	100.000	7762			

图49 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1587-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:09:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	34027	100.000	7519	6156	1.055	--
总计		34027	100.000	7519			

图50 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1588-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 18:14:10

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	36517	100.000	8074	6142	1.055	--
总计		36517	100.000	8074			

图51 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1589-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 18:19:03

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	35779	100.000	7871	6139	1.060	--
总计		35779	100.000	7871			

图52 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1590-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 18:23:56

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	36258	100.000	7999	6118	1.056	--
总计		36258	100.000	7999			

图53 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1591-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:28:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	36443	100.000	8054	6152	1.054	--
总计		36443	100.000	8054			

图54 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1592-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:33:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	16900	100.000	3641	5778	1.054	--
总计		16900	100.000	3641			

图55 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1593-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:38:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	16903	100.000	3652	5771	1.064	--
总计		16903	100.000	3652			

图56 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1594-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 18:43:29

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1595-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:48:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17391	100.000	3730	5733	1.061	--
总计		17391	100.000	3730			

图58 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1596-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:53:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17322	100.000	3732	5766	1.063	--
总计		17322	100.000	3732			

图59 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1597-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:58:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17346	100.000	3741	5761	1.069	--
总计		17346	100.000	3741			

图60 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1598-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 19:03:07

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17372	100.000	3740	5740	1.054	--
总计		17372	100.000	3740			

图61 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1599-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 19:08:02
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17347	100.000	3733	5782	1.055	--
总计		17347	100.000	3733			

图62 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1600-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:12:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	19663	100.000	4344	6134	1.056	--
总计		19663	100.000	4344			

图63 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1601-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 19:17:49
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	19422	100.000	4295	6152	1.058	--
总计		19422	100.000	4295			

图64 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1602-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:22:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	19189	100.000	4214	6113	1.050	--
总计		19189	100.000	4214			

图65 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1603-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:27:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	21120	100.000	4672	6117	1.057	--
总计		21120	100.000	4672			

图66 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1604-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:32:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	21737	100.000	4808	6129	1.060	--
总计		21737	100.000	4808			

图67 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1605-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:37:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	21778	100.000	4821	6137	1.055	--
总计		21778	100.000	4821			

图68 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1606-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:42:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30204	100.000	6683	6148	1.062	--
总计		30204	100.000	6683			

图69 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1607-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:47:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	26026	100.000	5734	6137	1.058	--
总计		26026	100.000	5734			

图70 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1608-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:52:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	28956	100.000	6384	6132	1.052	--
总计		28956	100.000	6384			

图71 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1609-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:56:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29476	100.000	6500	6129	1.061	--
总计		29476	100.000	6500			

图72 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1610-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:01:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29539	100.000	6516	6138	1.055	--
总计		29539	100.000	6516			

图73 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1611-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 20:06:45

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	30762	100.000	6787	6142	1.062	--
总计		30762	100.000	6787			

图74 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1612-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:11:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	33136	100.000	7299	6113	1.061	--
总计		33136	100.000	7299			

图75 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1613-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:16:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	28827	100.000	6376	6131	1.061	--
总计		28827	100.000	6376			

图76 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1614-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:21:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	31086	100.000	6879	6159	1.058	--
总计		31086	100.000	6879			

图77 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1615-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:26:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	32992	100.000	7281	6135	1.054	--
总计		32992	100.000	7281			

图78 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1616-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:31:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	31457	100.000	6960	6152	1.057	--
总计		31457	100.000	6960			

图79 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1617-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 20:36:07

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	32805	100.000	7234	6134	1.057	--
总计		32805	100.000	7234			

图80 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1618-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:41:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	34163	100.000	7537	6131	1.056	--
总计		34163	100.000	7537			

图81 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1619-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:45:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	30824	100.000	6784	6133	1.058	--
总计		30824	100.000	6784			

图82 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1620-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:50:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	32652	100.000	7184	6118	1.055	--
总计		32652	100.000	7184			

图83 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1621-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:55:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	34683	100.000	7655	6137	1.057	--
总计		34683	100.000	7655			

图84 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1622-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:00:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	32929	100.000	7245	6122	1.059	--
总计		32929	100.000	7245			

图85 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1623-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:05:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	33405	100.000	7373	6128	1.057	--
总计		33405	100.000	7373			

图86 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1624-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 21:10:25

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35626	100.000	7860	6129	1.057	--
总计		35626	100.000	7860			

图87 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1625-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:15:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	32762	100.000	7231	6140	1.057	--
总计		32762	100.000	7231			

图88 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1626-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:20:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	33719	100.000	7427	6121	1.057	--
总计		33719	100.000	7427			

图89 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1627-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:25:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	36349	100.000	8034	6146	1.060	--
总计		36349	100.000	8034			

图90 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1628-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:30:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	34870	100.000	7703	6137	1.058	--
总计		34870	100.000	7703			

图91 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1629-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:34:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35153	100.000	7757	6147	1.062	--
总计		35153	100.000	7757			

图92 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1630-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:39:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35827	100.000	7917	6140	1.060	--
总计		35827	100.000	7917			

图93 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1631-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:44:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	33514	100.000	7423	6146	1.057	--
总计		33514	100.000	7423			

图94 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1632-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:49:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35909	100.000	7944	6151	1.059	--
总计		35909	100.000	7944			

图95 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1633-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:54:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	37200	100.000	8196	6126	1.058	--
总计		37200	100.000	8196			

图96 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1634-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:59:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	34692	100.000	7674	6156	1.058	--
总计		34692	100.000	7674			

图97 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1635-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:04:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35313	100.000	7812	6140	1.059	--
总计		35313	100.000	7812			

图98 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1636-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:09:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35969	100.000	7954	6156	1.059	--
总计		35969	100.000	7954			

图99 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1637-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:14:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	33810	100.000	7483	6167	1.061	--
总计		33810	100.000	7483			

图100 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1638-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:19:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35736	100.000	7918	6167	1.058	--
总计		35736	100.000	7918			

图101 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1639-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:23:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	37722	100.000	8338	6138	1.060	--
总计		37722	100.000	8338			

图102 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1640-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:28:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35128	100.000	7767	6158	1.059	--
总计		35128	100.000	7767			

图103 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1641-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:33:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35865	100.000	7919	6139	1.060	--
总计		35865	100.000	7919			

图104 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1642-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:38:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	36212	100.000	7996	6129	1.060	--
总计		36212	100.000	7996			

图105 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1643-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:43:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	33673	100.000	7438	6136	1.058	--
总计		33673	100.000	7438			

图106 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1644-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:48:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35610	100.000	7866	6139	1.057	--
总计		35610	100.000	7866			

图107 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1645-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:53:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	36801	100.000	8109	6137	1.061	--
总计		36801	100.000	8109			

图108 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1646-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 22:58:20

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35082	100.000	7744	6135	1.060	--
总计		35082	100.000	7744			

图109 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1647-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:03:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35089	100.000	7728	6136	1.057	--
总计		35089	100.000	7728			

图110 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1648-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:08:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	16916	100.000	3628	5736	1.074	--
总计		16916	100.000	3628			

图111 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1649-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 23:13:03
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	16934	100.000	3646	5789	1.068	--
总计		16934	100.000	3646			

图112 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1650-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:17:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1651-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:22:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16952	100.000	3646	5765	1.060	--
总计		16952	100.000	3646			

图114 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1652-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:27:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16840	100.000	3631	5800	1.072	--
总计		16840	100.000	3631			

图115 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1653-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 23:32:35
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16877	100.000	3638	5825	1.062	--
总计		16877	100.000	3638			

图116 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1654-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:37:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	17017	100.000	3644	5725	1.072	--
总计		17017	100.000	3644			

图117 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1655-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:42:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16875	100.000	3632	5757	1.059	--
总计		16875	100.000	3632			

图118 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1656-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:47:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	10640	100.000	2350	6095	1.068	--
总计		10640	100.000	2350			

图119 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1657-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:52:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	10365	100.000	2298	6185	1.044	--
总计		10365	100.000	2298			

图120 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1658-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:56:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	9655	100.000	2120	6124	1.047	--
总计		9655	100.000	2120			

图121 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1659-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:01:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	10879	100.000	2407	6143	1.066	--
总计		10879	100.000	2407			

图122 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1660-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:06:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	11371	100.000	2522	6153	1.062	--
总计		11371	100.000	2522			

图123 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1661-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:11:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	10664	100.000	2361	6115	1.047	--
总计		10664	100.000	2361			

图124 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1662-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:16:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	17686	100.000	3918	6159	1.061	--
总计		17686	100.000	3918			

图125 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1663-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:21:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	17474	100.000	3855	6139	1.060	--
总计		17474	100.000	3855			

图126 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1664-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:26:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	17117	100.000	3768	6108	1.055	--
总计		17117	100.000	3768			

图127 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1665-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:31:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	18019	100.000	3993	6129	1.055	--
总计		18019	100.000	3993			

图128 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1666-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:35:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	20285	100.000	4496	6153	1.061	--
总计		20285	100.000	4496			

图129 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1667-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:40:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	19249	100.000	4216	6083	1.057	--
总计		19249	100.000	4216			

图130 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1668-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:45:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	20374	100.000	4505	6140	1.065	--
总计		20374	100.000	4505			

图131 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1669-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:50:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	20588	100.000	4544	6105	1.058	--
总计		20588	100.000	4544			

图132 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1670-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:55:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	20186	100.000	4438	6096	1.063	--
总计		20186	100.000	4438			

图133 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1671-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:00:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22304	100.000	4925	6151	1.054	--
总计		22304	100.000	4925			

图134 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1672-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:05:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22504	100.000	4960	6136	1.063	--
总计		22504	100.000	4960			

图135 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1673-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:09:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22657	100.000	4995	6102	1.054	--
总计		22657	100.000	4995			

图136 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1674-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:14:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22257	100.000	4910	6106	1.061	--
总计		22257	100.000	4910			

图137 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1675-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 01:19:42

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22164	100.000	4882	6129	1.058	--
总计		22164	100.000	4882			

图138 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1676-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:24:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22051	100.000	4850	6110	1.049	--
总计		22051	100.000	4850			

图139 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1677-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:29:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	23343	100.000	5125	6131	1.060	--
总计		23343	100.000	5125			

图140 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1678-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:34:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	24324	100.000	5380	6146	1.058	--
总计		24324	100.000	5380			

图141 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1679-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:39:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	25106	100.000	5539	6111	1.062	--
总计		25106	100.000	5539			

图142 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1680-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:44:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	24594	100.000	5422	6111	1.052	--
总计		24594	100.000	5422			

图143 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1681-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:48:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	23842	100.000	5253	6132	1.061	--
总计		23842	100.000	5253			

图144 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1682-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:53:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	25594	100.000	5640	6095	1.059	--
总计		25594	100.000	5640			

图145 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1683-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:58:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	26171	100.000	5767	6104	1.060	--
总计		26171	100.000	5767			

图146 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1684-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:03:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	27511	100.000	6062	6112	1.054	--
总计		27511	100.000	6062			

图147 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1685-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:08:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26983	100.000	5935	6105	1.061	--
总计		26983	100.000	5935			

图148 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1686-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:13:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26820	100.000	5909	6108	1.052	--
总计		26820	100.000	5909			

图149 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1687-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:18:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	27196	100.000	5991	6132	1.057	--
总计		27196	100.000	5991			

图150 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1688-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:22:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	27386	100.000	6046	6131	1.061	--
总计		27386	100.000	6046			

图151 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1689-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:27:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	28365	100.000	6233	6115	1.057	--
总计		28365	100.000	6233			

图152 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1690-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:32:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	29116	100.000	6424	6119	1.059	--
总计		29116	100.000	6424			

图153 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1691-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:37:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	29118	100.000	6424	6138	1.060	--
总计		29118	100.000	6424			

图154 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1692-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:42:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	28448	100.000	6283	6130	1.058	--
总计		28448	100.000	6283			

图155 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1693-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:47:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	28544	100.000	6292	6130	1.060	--
总计		28544	100.000	6292			

图156 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1694-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:52:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29439	100.000	6470	6118	1.061	--
总计		29439	100.000	6470			

图157 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1695-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:56:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	29263	100.000	6446	6114	1.063	--
总计		29263	100.000	6446			

图158 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1696-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:01:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	30104	100.000	6644	6124	1.063	--
总计		30104	100.000	6644			

图159 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1697-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:06:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	30175	100.000	6665	6135	1.052	--
总计		30175	100.000	6665			

图160 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1698-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 03:11:32

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	33369	100.000	7353	6110	1.060	--
总计		33369	100.000	7353			

图161 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1699-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:16:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	33464	100.000	7357	6122	1.061	--
总计		33464	100.000	7357			

图162 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1700-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:21:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35855	100.000	7904	6116	1.056	--
总计		35855	100.000	7904			

图163 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1701-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 03:26:11

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	33946	100.000	7486	6132	1.061	--
总计		33946	100.000	7486			

图164 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1702-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:31:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	35009	100.000	7682	6123	1.060	--
总计		35009	100.000	7682			

图165 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1703-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 03:35:57

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35181	100.000	7757	6116	1.056	--
总计		35181	100.000	7757			

图166 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1704-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:40:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16834	100.000	3634	5804	1.058	--
总计		16834	100.000	3634			

图167 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1705-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:45:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16859	100.000	3631	5767	1.070	--
总计		16859	100.000	3631			

图168 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1706-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:50:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1707-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:55:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16973	100.000	3632	5770	1.062	--
总计		16973	100.000	3632			

图170 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1708-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:00:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16928	100.000	3629	5750	1.061	--
总计		16928	100.000	3629			

图171 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1709-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:05:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16916	100.000	3631	5757	1.062	--
总计		16916	100.000	3631			

图172 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1710-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:10:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16962	100.000	3644	5795	1.065	--
总计		16962	100.000	3644			

图173 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1711-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:15:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16879	100.000	3629	5775	1.056	--
总计		16879	100.000	3629			

图174 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1712-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:19:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	10656	100.000	2363	6180	1.073	--
总计		10656	100.000	2363			

图175 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1713-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 04:24:52
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	10533	100.000	2327	6091	1.074	--
总计		10533	100.000	2327			

图176 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1714-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:29:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	10677	100.000	2373	6129	1.064	--
总计		10677	100.000	2373			

图177 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1715-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:34:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	10078	100.000	2223	6094	1.061	--
总计		10078	100.000	2223			

图178 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1716-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:39:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	11245	100.000	2489	6125	1.049	--
总计		11245	100.000	2489			

图179 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1717-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 04:44:22
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	9508	100.000	2110	6152	1.045	--
总计		9508	100.000	2110			

图180 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1718-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:49:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	18498	100.000	4091	6139	1.058	--
总计		18498	100.000	4091			

图181 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1719-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:54:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	18185	100.000	4019	6140	1.056	--
总计		18185	100.000	4019			

图182 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1720-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:59:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	18180	100.000	4029	6167	1.062	--
总计		18180	100.000	4029			

图183 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1721-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:03:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	17869	100.000	3941	6110	1.064	--
总计		17869	100.000	3941			

图184 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1722-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:08:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	18256	100.000	4026	6119	1.061	--
总计		18256	100.000	4026			

图185 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1723-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:13:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	18119	100.000	3997	6113	1.060	--
总计		18119	100.000	3997			

图186 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1724-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:18:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	22350	100.000	4912	6102	1.057	--
总计		22350	100.000	4912			

图187 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1725-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:23:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	21016	100.000	4637	6123	1.061	--
总计		21016	100.000	4637			

图188 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1726-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:28:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	21692	100.000	4760	6110	1.059	--
总计		21692	100.000	4760			

图189 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1727-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:33:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	21066	100.000	4626	6076	1.052	--
总计		21066	100.000	4626			

图190 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1728-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:38:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	20539	100.000	4538	6116	1.056	--
总计		20539	100.000	4538			

图191 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1729-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:42:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	21473	100.000	4735	6126	1.064	--
总计		21473	100.000	4735			

图192 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1730-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:47:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	24560	100.000	5399	6107	1.060	--
总计		24560	100.000	5399			

图193 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1731-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:52:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	23249	100.000	5124	6102	1.052	--
总计		23249	100.000	5124			

图194 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1732-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:57:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	24022	100.000	5298	6123	1.061	--
总计		24022	100.000	5298			

图195 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1733-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:02:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	22936	100.000	5049	6113	1.068	--
总计		22936	100.000	5049			

图196 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1734-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:07:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	23966	100.000	5274	6112	1.062	--
总计		23966	100.000	5274			

图197 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1735-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:12:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	23653	100.000	5219	6105	1.062	--
总计		23653	100.000	5219			

图198 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1736-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:17:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	27292	100.000	6008	6104	1.057	--
总计		27292	100.000	6008			

图199 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1737-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:22:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	25720	100.000	5684	6140	1.060	--
总计		25720	100.000	5684			

图200 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1738-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:26:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26380	100.000	5814	6099	1.062	--
总计		26380	100.000	5814			

图201 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1739-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:31:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26090	100.000	5755	6130	1.057	--
总计		26090	100.000	5755			

图202 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1740-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:36:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26710	100.000	5873	6108	1.059	--
总计		26710	100.000	5873			

图203 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1741-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:41:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26703	100.000	5889	6129	1.068	--
总计		26703	100.000	5889			

图204 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1742-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 06:46:34

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	30257	100.000	6634	6088	1.054	--
总计		30257	100.000	6634			

图205 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1743-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:51:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	27775	100.000	6108	6090	1.061	--
总计		27775	100.000	6108			

图206 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1744-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:56:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	28711	100.000	6325	6116	1.059	--
总计		28711	100.000	6325			

图207 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1745-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:01:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29020	100.000	6393	6110	1.065	--
总计		29020	100.000	6393			

图208 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1746-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:06:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	27698	100.000	6098	6110	1.057	--
总计		27698	100.000	6098			

图209 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1747-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:11:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29651	100.000	6527	6101	1.053	--
总计		29651	100.000	6527			

图210 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1748-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:15:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30965	100.000	6821	6124	1.059	--
总计		30965	100.000	6821			

图211 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1749-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:20:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	29317	100.000	6443	6107	1.061	--
总计		29317	100.000	6443			

图212 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1750-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:25:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30130	100.000	6625	6095	1.057	--
总计		30130	100.000	6625			

图213 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1751-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:30:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30170	100.000	6650	6127	1.060	--
总计		30170	100.000	6650			

图214 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1752-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:35:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29028	100.000	6424	6135	1.058	--
总计		29028	100.000	6424			

图215 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1753-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:40:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30821	100.000	6808	6138	1.063	--
总计		30821	100.000	6808			

图216 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1754-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 07:45:20
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35079	100.000	7728	6128	1.057	--
总计		35079	100.000	7728			

图217 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1755-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:50:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	33578	100.000	7373	6100	1.061	--
总计		33578	100.000	7373			

图218 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1756-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-26

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 07:55:08

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35442	100.000	7831	6134	1.059	--
总计		35442	100.000	7831			

图219 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1757-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 08:00:02
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	34521	100.000	7604	6116	1.060	--
总计		34521	100.000	7604			

图220 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1758-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 08:04:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	32407	100.000	7163	6126	1.055	--
总计		32407	100.000	7163			

图221 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1759-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 08:09:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35272	100.000	7774	6097	1.060	--
总计		35272	100.000	7774			

图222 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1760-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 08:14:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	17027	100.000	3652	5743	1.060	--
总计		17027	100.000	3652			

图223 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1761-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 08:19:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	17093	100.000	3662	5713	1.061	--
总计		17093	100.000	3662			

图224 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8167603批(5mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2