



塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.07	3034628	3034295	3033062	3034379	3033925	3034058	0.03
2	10.08	3027815	3034069				3030942	0.15

单位质量响应值		RSD%	判断
301296.72	300688.69	0.15	数据可信

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	329602	-	329602	10.907	10.71	6.37	10.91	10.72	6.38
	2	299481	-	299481	9.910			9.91		
	3	337747	-	337747	11.176			11.18		
	4	334571	-	334571	11.071			11.07		
	5	296430	-	296430	9.809			9.81		
	6	344755	-	344755	11.408			11.41		
10min	1	830359	-	830359	27.477	27.40	5.66	27.49	27.41	5.66
	2	781767	-	781767	25.869			25.88		
	3	844148	-	844148	27.933			27.95		
	4	812616	-	812616	26.890			26.91		
	5	788690	-	788690	26.098			26.11		
	6	910309	-	910309	30.123			30.14		
15min	1	1272386	-	1272386	42.104	42.48	5.08	42.16	42.54	5.08
	2	1222448	-	1222448	40.451			40.51		
	3	1303077	-	1303077	43.120			43.18		
	4	1263945	-	1263945	41.825			41.88		
	5	1237089	-	1237089	40.936			40.99		
	6	1403583	-	1403583	46.445			46.51		
20min	1	1657869	-	1657869	54.860	55.63	4.17	54.98	55.75	4.17
	2	1617641	-	1617641	53.529			53.64		
	3	1712405	-	1712405	56.664			56.79		
	4	1659413	-	1659413	54.911			55.03		
	5	1631414	-	1631414	53.984			54.10		
	6	1807591	-	1807591	59.814			59.95		
30min	1	2252876	-	2252876	74.549	74.71	2.70	74.75	74.91	2.71
	2	2210554	-	2210554	73.148			73.34		
	3	2271130	-	2271130	75.153			75.36		
	4	2251113	-	2251113	74.491			74.69		
	5	2193771	-	2193771	72.593			72.79		
	6	2367046	-	2367046	78.327			78.55		
45min	1	2685818	-	2685818	88.875	89.19	1.16	89.19	89.51	1.17
	2	2676131	-	2676131	88.555			88.86		
	3	2711275	-	2711275	89.718			90.04		
	4	2697514	-	2697514	89.262			89.58		
	5	2655566	-	2655566	87.874			88.18		
	6	2746058	-	2746058	90.869			91.21		
60min	1	2829922	-	2829922	93.644	93.81	0.62	94.09	94.26	0.63
	2	2828869	-	2828869	93.609			94.05		
	3	2845598	-	2845598	94.162			94.62		
	4	2834166	-	2834166	93.784			94.23		
	5	2809602	-	2809602	92.971			93.41		
	6	2861054	-	2861054	94.674			95.15		
极限	1	2896622	-	2896622	95.851	95.72	0.37	96.44	96.31	0.37
	2	2898054	-	2898054	95.898			96.48		
	3	2895474	-	2895474	95.813			96.41		
	4	2890175	-	2890175	95.637			96.23		
	5	2872951	-	2872951	95.067			95.64		
	6	2902560	-	2902560	96.047			96.66		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.07	3033160	3029906	3029179	3028262	3029658	3030033	0.07
2	10.08	3037037	3034305				3035671	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
300897.02				0.07	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	228398	-	228398	7.557	7.91	11.36	7.56	7.91	11.34
	2	219699	-	219699	7.269			7.27		
	3	213563	-	213563	7.066			7.07		
	4	272715	-	272715	9.023			9.02		
	5	226085	-	226085	7.480			7.48		
	6	274337	-	274337	9.077			9.08		
10min	1	613813	-	613813	20.309	20.90	8.03	20.32	20.92	8.03
	2	603723	-	603723	19.975			19.99		
	3	584439	-	584439	19.337			19.35		
	4	690414	-	690414	22.844			22.86		
	5	596763	-	596763	19.745			19.76		
	6	701366	-	701366	23.206			23.22		
15min	1	965625	-	965625	31.949	33.60	6.84	31.99	33.64	6.84
	2	983866	-	983866	32.553			32.59		
	3	955358	-	955358	31.610			31.65		
	4	1090688	-	1090688	36.087			36.14		
	5	981381	-	981381	32.471			32.51		
	6	1116179	-	1116179	36.931			36.98		
20min	1	1280341	-	1280341	42.362	44.89	6.01	42.45	44.99	6.02
	2	1331005	-	1331005	44.039			44.13		
	3	1300143	-	1300143	43.017			43.10		
	4	1441182	-	1441182	47.684			47.79		
	5	1312037	-	1312037	43.411			43.50		
	6	1476550	-	1476550	48.854			48.96		
30min	1	1842837	-	1842837	60.973	62.37	3.62	61.13	62.54	3.63
	2	1851524	-	1851524	61.261			61.42		
	3	1853379	-	1853379	61.322			61.47		
	4	1972109	-	1972109	65.251			65.42		
	5	1819613	-	1819613	60.205			60.36		
	6	1971590	-	1971590	65.233			65.41		
45min	1	2349086	-	2349086	77.723	78.13	1.79	77.97	78.38	1.80
	2	2317130	-	2317130	76.666			76.91		
	3	2352606	-	2352606	77.840			78.08		
	4	2423667	-	2423667	80.191			80.46		
	5	2325694	-	2325694	76.950			77.19		
	6	2400109	-	2400109	79.412			79.69		
60min	1	2573880	-	2573880	85.161	85.14	0.79	85.52	85.51	0.80
	2	2564185	-	2564185	84.840			85.20		
	3	2561909	-	2561909	84.765			85.13		
	4	2610673	-	2610673	86.379			86.77		
	5	2552599	-	2552599	84.457			84.82		
	6	2575986	-	2575986	85.231			85.62		
极限	1	2723859	-	2723859	90.123	89.83	0.44	90.61	90.33	0.44
	2	2722456	-	2722456	90.077			90.57		
	3	2699526	-	2699526	89.318			89.81		
	4	2725253	-	2725253	90.170			90.69		
	5	2700923	-	2700923	89.365			89.85		
	6	2717959	-	2717959	89.928			90.45		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.07	3029203	3031849	3029280	3030094	3028840	3029853	0.04
2	10.08	3046092	3045357				3045724	0.02
单位质量响应值				RSD%	判断			
300879.15				0.30	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	248239	-	248239	8.200	8.89	7.43	8.20	8.89	7.43
	2	261195	-	261195	8.628			8.63		
	3	293054	-	293054	9.680			9.68		
	4	252298	-	252298	8.334			8.33		
	5	294295	-	294295	9.721			9.72		
	6	266026	-	266026	8.788			8.79		
10min	1	679545	-	679545	22.447	23.59	5.66	22.46	23.60	5.66
	2	714693	-	714693	23.609			23.62		
	3	718737	-	718737	23.742			23.76		
	4	675920	-	675920	22.328			22.34		
	5	787947	-	787947	26.028			26.04		
	6	707909	-	707909	23.384			23.40		
15min	1	1098823	-	1098823	36.298	37.52	4.67	36.34	37.57	4.68
	2	1157546	-	1157546	38.237			38.29		
	3	1117667	-	1117667	36.920			36.97		
	4	1095069	-	1095069	36.174			36.22		
	5	1234047	-	1234047	40.764			40.82		
	6	1112019	-	1112019	36.733			36.78		
20min	1	1496054	-	1496054	49.419	50.08	3.86	49.52	50.18	3.85
	2	1541719	-	1541719	50.928			51.03		
	3	1474328	-	1474328	48.702			48.81		
	4	1483032	-	1483032	48.989			49.09		
	5	1623823	-	1623823	53.640			53.75		
	6	1476448	-	1476448	48.772			48.88		
30min	1	2101544	-	2101544	69.421	69.64	2.50	69.60	69.82	2.50
	2	2094025	-	2094025	69.172			69.35		
	3	2066419	-	2066419	68.260			68.44		
	4	2076354	-	2076354	68.588			68.76		
	5	2211767	-	2211767	73.062			73.26		
	6	2099869	-	2099869	69.365			69.54		
45min	1	2577843	-	2577843	85.154	85.08	1.49	85.43	85.37	1.49
	2	2574869	-	2574869	85.056			85.34		
	3	2555414	-	2555414	84.413			84.69		
	4	2544455	-	2544455	84.051			84.33		
	5	2648962	-	2648962	87.503			87.81		
	6	2552747	-	2552747	84.325			84.61		
60min	1	2728320	-	2728320	90.125	90.60	1.70	90.53	91.01	1.71
	2	2788431	-	2788431	92.111			92.52		
	3	2716902	-	2716902	89.748			90.16		
	4	2706560	-	2706560	89.406			89.81		
	5	2813283	-	2813283	92.931			93.37		
	6	2702823	-	2702823	89.283			89.69		
极限	1	2814779	-	2814779	92.981	93.49	1.61	93.52	94.04	1.61
	2	2882604	-	2882604	95.221			95.77		
	3	2803252	-	2803252	92.600			93.14		
	4	2791594	-	2791594	92.215			92.75		
	5	2892968	-	2892968	95.564			96.14		
	6	2796188	-	2796188	92.367			92.91		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-1-3 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 10:56:23
处理时间 (V3) : 2025/01/10 08:59:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938


<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-2-3 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 11:00:46
处理时间 (V3) : 2025/01/10 08:59:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.783	3034628	100.000	498095	4846	1.072	--
总计		3034628	100.000	498095			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-3-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 11:05:09
处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.784	3034295	100.000	498752	4869	1.076	--
总计		3034295	100.000	498752			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-4-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:09:32
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:59:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.783	3033062	100.000	499670	4874	1.078	--
总计		3033062	100.000	499670			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938


<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-5-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 11:13:55
处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.784	3034379	100.000	499487	4871	1.080	--
总计		3034379	100.000	499487			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-6-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:18:18

处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.783	3033925	100.000	500493	4876	1.082	--
总计		3033925	100.000	500493			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-7-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/09 11:22:41

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:59:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	329602	100.000	56529	5278	1.072	--
总计		329602	100.000	56529			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-8-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:27:04

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/10 08:59:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	299481	100.000	51270	5283	1.071	--
总计		299481	100.000	51270			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-9-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/09 11:31:26

处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	337747	100.000	57946	5281	1.072	--
总计		337747	100.000	57946			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-10-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:35:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:59:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	334571	100.000	57405	5280	1.073	--
总计		334571	100.000	57405			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-11-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:40:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	296430	100.000	50922	5283	1.072	--
总计		296430	100.000	50922			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-12-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:44:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	344755	100.000	59138	5292	1.073	--
总计		344755	100.000	59138			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-13-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 11:48:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	830359	100.000	142486	5277	1.074	--
总计		830359	100.000	142486			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-
片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-14-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 11:53:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:59:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	781767	100.000	134228	5283	1.074	--
总计		781767	100.000	134228			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-
片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-15-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:57:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	844148	100.000	144921	5279	1.074	--
总计		844148	100.000	144921			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-
片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-16-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:02:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	812616	100.000	139493	5278	1.074	--
总计		812616	100.000	139493			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-17-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 12:06:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	788690	100.000	135332	5277	1.075	--
总计		788690	100.000	135332			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-18-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:10:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 08:59:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	910309	100.000	156073	5278	1.075	--
总计		910309	100.000	156073			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-19-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:15:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	1272386	100.000	218049	5272	1.075	--
总计		1272386	100.000	218049			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-
片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-20-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 12:19:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	1222448	100.000	209368	5261	1.075	--
总计		1222448	100.000	209368			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-21-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 12:23:50 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:00:06 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	1303077	100.000	222936	5269	1.075	--
总计		1303077	100.000	222936			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-
片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-22-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:28:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	1263945	100.000	216264	5267	1.076	--
总计		1263945	100.000	216264			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-23-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:32:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	1237089	100.000	211788	5260	1.075	--
总计		1237089	100.000	211788			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-24-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:36:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	1403583	100.000	240389	5257	1.075	--
总计		1403583	100.000	240389			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-25-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:41:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	1657869	100.000	283846	5262	1.075	--
总计		1657869	100.000	283846			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-
片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-26-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:45:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	1617641	100.000	276960	5256	1.075	--
总计		1617641	100.000	276960			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-27-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 12:50:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	1712405	100.000	292551	5250	1.076	--
总计		1712405	100.000	292551			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-28-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:54:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	1659413	100.000	283508	5260	1.075	--
总计		1659413	100.000	283508			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-29-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 12:58:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	1631414	100.000	278808	5253	1.075	--
总计		1631414	100.000	278808			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-30-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 13:03:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	1807591	100.000	309227	5251	1.075	--
总计		1807591	100.000	309227			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-
片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-31-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:07:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2252876	100.000	384951	5252	1.076	--
总计		2252876	100.000	384951			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-
片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-32-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 13:11:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:00:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2210554	100.000	376886	5252	1.076	--
总计		2210554	100.000	376886			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-33-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:16:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2271130	100.000	387531	5241	1.076	--
总计		2271130	100.000	387531			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-
片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-34-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:20:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2251113	100.000	384064	5243	1.076	--
总计		2251113	100.000	384064			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-35-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:24:57

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:00:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2193771	100.000	373557	5243	1.076	--
总计		2193771	100.000	373557			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-36-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:29:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2367046	100.000	403342	5240	1.076	--
总计		2367046	100.000	403342			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-37-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 13:33:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2685818	100.000	458224	5237	1.076	--
总计		2685818	100.000	458224			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-38-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:38:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2676131	100.000	455353	5233	1.076	--
总计		2676131	100.000	455353			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-39-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:42:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2711275	100.000	460999	5237	1.076	--
总计		2711275	100.000	460999			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-40-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:46:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2697514	100.000	459048	5236	1.076	--
总计		2697514	100.000	459048			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-41-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:51:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:00:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2655566	100.000	452631	5233	1.075	--
总计		2655566	100.000	452631			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-42-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:55:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2746058	100.000	467062	5227	1.076	--
总计		2746058	100.000	467062			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-43-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:59:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2829922	100.000	482597	5226	1.075	--
总计		2829922	100.000	482597			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-44-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:04:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2828869	100.000	481795	5225	1.075	--
总计		2828869	100.000	481795			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-45-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:08:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2845598	100.000	485169	5227	1.075	--
总计		2845598	100.000	485169			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-46-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 14:12:59
处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2834166	100.000	482857	5220	1.075	--
总计		2834166	100.000	482857			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-47-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 14:17:21
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:01:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2809602	100.000	478325	5216	1.075	--
总计		2809602	100.000	478325			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-48-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 14:21:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:01:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2861054	100.000	486222	5219	1.075	--
总计		2861054	100.000	486222			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-49-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:26:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2896622	100.000	491169	5213	1.075	--
总计		2896622	100.000	491169			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-50-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:30:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2898054	100.000	492245	5212	1.075	--
总计		2898054	100.000	492245			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-51-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:34:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.791	2895474	100.000	491950	5207	1.074	--
总计		2895474	100.000	491950			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-52-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:39:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2890175	100.000	489595	5205	1.074	--
总计		2890175	100.000	489595			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-53-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:43:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2872951	100.000	487236	5207	1.074	--
总计		2872951	100.000	487236			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-54-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:47:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	2902560	100.000	492778	5206	1.073	--
总计		2902560	100.000	492778			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-55-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:52:22

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.785	3027815	100.000	495695	4816	1.080	--
总计		3027815	100.000	495695			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-56-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:56:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.786	3034069	100.000	496594	4809	1.080	--
总计		3034069	100.000	496594			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-57-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-9

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 15:01:08


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-58-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 15:05:32

处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.785	3033160	100.000	495905	4807	1.080	--
总计		3033160	100.000	495905			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-59-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 15:09:56

处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.785	3029906	100.000	495859	4809	1.080	--
总计		3029906	100.000	495859			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-60-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 15:14:20

处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.785	3029179	100.000	494902	4804	1.080	--
总计		3029179	100.000	494902			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-61-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 15:18:44

处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.784	3028262	100.000	494224	4802	1.080	--
总计		3028262	100.000	494224			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-62-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 15:23:09
处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.784	3029658	100.000	494381	4799	1.080	--
总计		3029658	100.000	494381			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-63-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 15:27:31


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	228398	100.000	38728	5199	1.069	--
总计		228398	100.000	38728			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-64-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:31:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	219699	100.000	37189	5189	1.069	--
总计		219699	100.000	37189			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-65-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:36:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:01:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	213563	100.000	36221	5200	1.068	--
总计		213563	100.000	36221			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-66-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/09 15:40:40

处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	272715	100.000	46253	5191	1.069	--
总计		272715	100.000	46253			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-67-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:45:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	226085	100.000	38376	5193	1.068	--
总计		226085	100.000	38376			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-68-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:49:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	274337	100.000	46394	5188	1.069	--
总计		274337	100.000	46394			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-69-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:53:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	613813	100.000	104007	5176	1.069	--
总计		613813	100.000	104007			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-70-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-11

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 15:58:14


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	603723	100.000	102106	5176	1.069	--
总计		603723	100.000	102106			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-71-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-20

版本号: 6.115

进样体积: 5 μl

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 16:02:38


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.792	584439	100.000	98717	5173	1.069	--
总计		584439	100.000	98717			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-72-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:07:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	690414	100.000	116870	5173	1.068	--
总计		690414	100.000	116870			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-73-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:11:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	596763	100.000	100911	5176	1.068	--
总计		596763	100.000	100911			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-74-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:15:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	701366	100.000	118544	5173	1.068	--
总计		701366	100.000	118544			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-
片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-75-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:20:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	965625	100.000	163318	5173	1.068	--
总计		965625	100.000	163318			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-76-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:24:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	983866	100.000	166248	5170	1.068	--
总计		983866	100.000	166248			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-77-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:28:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	955358	100.000	161158	5161	1.069	--
总计		955358	100.000	161158			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-78-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 16:33:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	1090688	100.000	184339	5162	1.068	--
总计		1090688	100.000	184339			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-79-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 16:37:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	981381	100.000	165712	5159	1.068	--
总计		981381	100.000	165712			



938


<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-80-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 16:42:10
处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	1116179	100.000	188709	5158	1.068	--
总计		1116179	100.000	188709			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-81-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 16:46:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	1280341	100.000	216593	5161	1.067	--
总计		1280341	100.000	216593			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-82-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:50:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	1331005	100.000	224920	5153	1.068	--
总计		1331005	100.000	224920			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-83-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:55:22

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	1300143	100.000	219595	5146	1.067	--
总计		1300143	100.000	219595			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-84-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:59:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	1441182	100.000	242956	5144	1.068	--
总计		1441182	100.000	242956			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-85-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:04:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	1312037	100.000	221334	5135	1.067	--
总计		1312037	100.000	221334			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-86-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:08:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.794	1476550	100.000	248915	5140	1.067	--
总计		1476550	100.000	248915			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-87-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:12:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.795	1842837	100.000	311021	5136	1.067	--
总计		1842837	100.000	311021			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-88-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:17:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:02:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	1851524	100.000	312542	5136	1.067	--
总计		1851524	100.000	312542			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-89-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 17:21:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.795	1853379	100.000	312627	5134	1.067	--
总计		1853379	100.000	312627			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-90-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:26:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	1972109	100.000	332762	5129	1.067	--
总计		1972109	100.000	332762			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-91-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 17:30:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.795	1819613	100.000	306766	5127	1.066	--
总计		1819613	100.000	306766			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-92-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:34:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.795	1971590	100.000	332299	5127	1.066	--
总计		1971590	100.000	332299			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-93-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:39:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.795	2349086	100.000	395823	5120	1.066	--
总计		2349086	100.000	395823			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-94-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:43:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.795	2317130	100.000	390340	5119	1.066	--
总计		2317130	100.000	390340			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-95-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:48:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2352606	100.000	396564	5123	1.066	--
总计		2352606	100.000	396564			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-96-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:52:30

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	2423667	100.000	408325	5115	1.066	--
总计		2423667	100.000	408325			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-97-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:56:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2325694	100.000	391822	5113	1.066	--
总计		2325694	100.000	391822			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-98-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:01:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2400109	100.000	404417	5113	1.066	--
总计		2400109	100.000	404417			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-99-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:05:40
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2573880	100.000	433281	5104	1.066	--
总计		2573880	100.000	433281			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-100-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:10:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2564185	100.000	431608	5105	1.066	--
总计		2564185	100.000	431608			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-

片2

供试品溶液-1

100



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-101-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:14:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2561909	100.000	430881	5095	1.065	--
总计		2561909	100.000	430881			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3

供试品溶液-1

101

Page 101/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-102-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:18:51
处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2610673	100.000	439154	5097	1.065	--
总计		2610673	100.000	439154			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-
片4

供试品溶液-1

102

Page 102/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-103-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:23:15
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	2552599	100.000	429507	5104	1.065	--
总计		2552599	100.000	429507			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5

供试品溶液-1

103

Page 103/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-104-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:27:38
处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2575986	100.000	433273	5100	1.065	--
总计		2575986	100.000	433273			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6

供试品溶液-1

104



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-105-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:32:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.798	2723859	100.000	457535	5093	1.065	--
总计		2723859	100.000	457535			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-106-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:36:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	2722456	100.000	457248	5085	1.065	--
总计		2722456	100.000	457248			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-107-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:40:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	2699526	100.000	453418	5088	1.065	--
总计		2699526	100.000	453418			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-108-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:45:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.798	2725253	100.000	457032	5089	1.065	--
总计		2725253	100.000	457032			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-109-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:49:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	2700923	100.000	453266	5079	1.064	--
总计		2700923	100.000	453266			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-110-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:54:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	2717959	100.000	455976	5072	1.064	--
总计		2717959	100.000	455976			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-111-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:58:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:03:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	3037037	100.000	490554	4695	1.070	--
总计		3037037	100.000	490554			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-112-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:02:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	3034305	100.000	490396	4696	1.069	--
总计		3034305	100.000	490396			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-113-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:07:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-114-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:11:31

处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	3029203	100.000	489641	4697	1.068	--
总计		3029203	100.000	489641			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-115-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:15:54

处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	3031849	100.000	489889	4691	1.069	--
总计		3031849	100.000	489889			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-116-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:20:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	3029280	100.000	489212	4687	1.068	--
总计		3029280	100.000	489212			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-117-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:24:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	3030094	100.000	488780	4682	1.068	--
总计		3030094	100.000	488780			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-118-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:29:02

处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.790	3028840	100.000	488611	4683	1.068	--
总计		3028840	100.000	488611			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-119-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:33:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	248239	100.000	41534	5064	1.059	--
总计		248239	100.000	41534			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1

供试品溶液-1

119

Page 119/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-120-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:37:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	261195	100.000	43614	5054	1.060	--
总计		261195	100.000	43614			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2

供试品溶液-1

120

Page 120/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-121-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:42:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	293054	100.000	48986	5058	1.060	--
总计		293054	100.000	48986			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3

供试品溶液-1

121

Page 121/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-122-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:46:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	252298	100.000	42121	5053	1.060	--
总计		252298	100.000	42121			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4

供试品溶液-1

122

Page 122/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-123-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:50:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	294295	100.000	49108	5051	1.058	--
总计		294295	100.000	49108			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5

供试品溶液-1

123

Page 123/168

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-124-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:55:11

处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.798	266026	100.000	44520	5055	1.058	--
总计		266026	100.000	44520			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-125-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 19:59:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	679545	100.000	113306	5046	1.060	--
总计		679545	100.000	113306			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-126-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:03:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/10 09:04:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	714693	100.000	119323	5045	1.059	--
总计		714693	100.000	119323			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-127-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:08:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	718737	100.000	119847	5043	1.059	--
总计		718737	100.000	119847			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-128-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:12:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	675920	100.000	112406	5041	1.058	--
总计		675920	100.000	112406			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-

片4

供试品溶液-1

128




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-129-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:16:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	787947	100.000	131329	5037	1.059	--
总计		787947	100.000	131329			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-130-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:21:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	707909	100.000	117867	5040	1.059	--
总计		707909	100.000	117867			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-131-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:25:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/10 09:04:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	1098823	100.000	183135	5031	1.059	--
总计		1098823	100.000	183135			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-

片1

供试品溶液-1

131




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-132-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:30:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	1157546	100.000	192741	5026	1.059	--
总计		1157546	100.000	192741			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-133-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 20:34:25
处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	1117667	100.000	185761	5030	1.059	--
总计		1117667	100.000	185761			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-
片3

供试品溶液-1

133

Page 133/168




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-134-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:38:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:04:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	1095069	100.000	181938	5031	1.059	--
总计		1095069	100.000	181938			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-
片4

供试品溶液-1

134



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-135-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 20:43:07
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	1234047	100.000	205064	5020	1.059	--
总计		1234047	100.000	205064			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5

供试品溶液-1

135

Page 135/168




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-136-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:47:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	1112019	100.000	185066	5024	1.058	--
总计		1112019	100.000	185066			

图136 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-
片6

供试品溶液-1

136



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-137-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 20:51:50
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	1496054	100.000	248368	5017	1.059	--
总计		1496054	100.000	248368			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-
片1

供试品溶液-1

137

Page 137/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-138-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 20:56:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	1541719	100.000	256094	5014	1.058	--
总计		1541719	100.000	256094			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-
片2

供试品溶液-1

138



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-139-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 21:00:34
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	1474328	100.000	244106	5013	1.058	--
总计		1474328	100.000	244106			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-
片3

供试品溶液-1

139




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-140-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 21:04:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	1483032	100.000	245438	5007	1.058	--
总计		1483032	100.000	245438			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-141-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:09:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	1623823	100.000	269135	5007	1.058	--
总计		1623823	100.000	269135			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5

供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-142-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 21:13:37
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	1476448	100.000	244598	5001	1.058	--
总计		1476448	100.000	244598			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-
片6

供试品溶液-1

142

Page 142/168

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-143-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:17:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2101544	100.000	347693	5004	1.058	--
总计		2101544	100.000	347693			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-

片1

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-144-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 21:22:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2094025	100.000	346210	4998	1.058	--
总计		2094025	100.000	346210			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-145-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:26:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	2066419	100.000	341802	4987	1.058	--
总计		2066419	100.000	341802			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3

供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-146-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:31:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	2076354	100.000	343510	4989	1.057	--
总计		2076354	100.000	343510			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-

片4

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-147-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 21:35:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2211767	100.000	364996	4983	1.057	--
总计		2211767	100.000	364996			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-148-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 21:39:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2099869	100.000	346399	4979	1.057	--
总计		2099869	100.000	346399			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-

片6

供试品溶液-1

148




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-149-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 21:44:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	2577843	100.000	425935	4973	1.057	--
总计		2577843	100.000	425935			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-150-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 21:48:26
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2574869	100.000	424726	4978	1.057	--
总计		2574869	100.000	424726			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-
片2

供试品溶液-1

150



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-151-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 21:52:47
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2555414	100.000	421751	4973	1.056	--
总计		2555414	100.000	421751			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-
片3

供试品溶液-1

151

Page 151/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-152-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 21:57:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2544455	100.000	419348	4972	1.056	--
总计		2544455	100.000	419348			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-
片4

供试品溶液-1

152



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-153-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 22:01:31
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2648962	100.000	436505	4966	1.056	--
总计		2648962	100.000	436505			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5

供试品溶液-1

153

Page 153/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-154-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 22:05:52
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	2552747	100.000	421082	4964	1.055	--
总计		2552747	100.000	421082			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-
片6

供试品溶液-1

154

Page 154/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-155-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 22:10:13
处理时间(V2): 2025/01/10 09:05:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	2728320	100.000	450853	4968	1.055	--
总计		2728320	100.000	450853			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-

片1

供试品溶液-1

155



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-156-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 22:14:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2788431	100.000	459040	4957	1.055	--
总计		2788431	100.000	459040			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-
片2

供试品溶液-1

156




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-157-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 22:18:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2716902	100.000	447011	4950	1.055	--
总计		2716902	100.000	447011			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-158-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 22:23:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:06:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	2706560	100.000	445763	4947	1.055	--
总计		2706560	100.000	445763			

图158 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-

片4

供试品溶液-1

158



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-159-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 22:27:36
处理时间(V2): 2025/01/10 09:06:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	2813283	100.000	462531	4945	1.055	--
总计		2813283	100.000	462531			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-
片5

供试品溶液-1

159




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-160-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 22:31:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	2702823	100.000	445820	4948	1.054	--
总计		2702823	100.000	445820			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-161-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:36:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:06:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	2814779	100.000	463862	4943	1.054	--
总计		2814779	100.000	463862			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-162-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:40:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:06:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	2882604	100.000	474429	4937	1.054	--
总计		2882604	100.000	474429			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-163-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 22:45:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	2803252	100.000	461853	4932	1.053	--
总计		2803252	100.000	461853			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-164-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:49:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:06:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	2791594	100.000	459930	4932	1.053	--
总计		2791594	100.000	459930			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-165-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 22:53:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	2892968	100.000	476436	4928	1.053	--
总计		2892968	100.000	476436			

图165 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-166-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:58:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:06:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	2796188	100.000	460635	4931	1.052	--
总计		2796188	100.000	460635			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-167-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 23:02:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:06:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	3046092	100.000	484165	4565	1.056	--
总计		3046092	100.000	484165			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-191/24-168-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX2734.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 23:06:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:06:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	3045357	100.000	484033	4561	1.056	--
总计		3045357	100.000	484033			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2