



塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.07	3011466	3012142	3010955	3012054	3011486	3011621	0.02
2	10.08	3010691	3006523				3008607	0.10

单位质量响应值		RSD%	判断
299068.62	298472.92	0.15	数据可信

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	358199	-	358199	11.941	12.98	7.33	11.94	12.98	7.33
	2	400943	-	400943	13.366			13.37		
	3	358213	-	358213	11.942			11.94		
	4	390019	-	390019	13.002			13.00		
	5	433531	-	433531	14.452			14.45		
	6	395840	-	395840	13.196			13.20		
10min	1	960877	-	960877	32.032	33.04	4.40	32.05	33.06	4.40
	2	1005733	-	1005733	33.528			33.55		
	3	963948	-	963948	32.135			32.15		
	4	985556	-	985556	32.855			32.87		
	5	1072057	-	1072057	35.739			35.76		
	6	958986	-	958986	31.969			31.99		
15min	1	1461676	-	1461676	48.727	50.22	3.87	48.79	50.29	3.87
	2	1495006	-	1495006	49.838			49.91		
	3	1509370	-	1509370	50.317			50.38		
	4	1499006	-	1499006	49.972			50.04		
	5	1617285	-	1617285	53.915			53.99		
	6	1456874	-	1456874	48.567			48.64		
20min	1	1858300	-	1858300	61.949	63.90	2.84	62.09	64.04	2.84
	2	1894185	-	1894185	63.146			63.29		
	3	1941695	-	1941695	64.730			64.87		
	4	1915751	-	1915751	63.865			64.01		
	5	2010939	-	2010939	67.038			67.19		
	6	1879608	-	1879608	62.660			62.80		
30min	1	2372866	-	2372866	79.103	81.85	2.27	79.34	82.09	2.26
	2	2409800	-	2409800	80.335			80.57		
	3	2510125	-	2510125	83.679			83.92		
	4	2456886	-	2456886	81.904			82.14		
	5	2512983	-	2512983	83.774			84.03		
	6	2469512	-	2469512	82.325			82.56		
45min	1	2735246	-	2735246	91.184	92.83	1.43	91.53	93.20	1.44
	2	2740036	-	2740036	91.344			91.70		
	3	2829352	-	2829352	94.321			94.69		
	4	2782010	-	2782010	92.743			93.11		
	5	2803627	-	2803627	93.463			93.85		
	6	2817862	-	2817862	93.938			94.30		
60min	1	2844696	-	2844696	94.833	95.81	1.14	95.32	96.31	1.14
	2	2827492	-	2827492	94.259			94.76		
	3	2903999	-	2903999	96.810			97.32		
	4	2873119	-	2873119	95.780			96.28		
	5	2884511	-	2884511	96.160			96.68		
	6	2909368	-	2909368	96.989			97.49		
极限	1	2889247	-	2889247	96.318	97.08	1.02	96.95	97.72	1.02
	2	2866866	-	2866866	95.572			96.21		
	3	2929406	-	2929406	97.657			98.31		
	4	2916460	-	2916460	97.225			97.87		
	5	2920566	-	2920566	97.362			98.03		
	6	2949223	-	2949223	98.317			98.96		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.07	3002974	3003123	3002540	3004492	3002355	3003097	0.03
2	10.08	2999785	3001805				3000795	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
298222.14				0.13	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	264839	-	264839	8.853	10.07	10.96	8.85	10.06	10.96
	2	314596	-	314596	10.516			10.52		
	3	299390	-	299390	10.008			10.01		
	4	316344	-	316344	10.575			10.57		
	5	263022	-	263022	8.792			8.79		
	6	348623	-	348623	11.654			11.65		
10min	1	694722	-	694722	23.223	25.97	8.51	23.24	25.98	8.51
	2	823067	-	823067	27.513			27.53		
	3	781578	-	781578	26.126			26.14		
	4	824971	-	824971	27.577			27.59		
	5	696027	-	696027	23.266			23.28		
	6	840815	-	840815	28.106			28.12		
15min	1	1135746	-	1135746	37.965	40.61	5.95	38.01	40.66	5.96
	2	1239140	-	1239140	41.421			41.48		
	3	1230821	-	1230821	41.143			41.20		
	4	1279449	-	1279449	42.769			42.83		
	5	1116887	-	1116887	37.335			37.38		
	6	1286997	-	1286997	43.021			43.08		
20min	1	1507792	-	1507792	50.401	52.89	4.86	50.51	53.01	4.87
	2	1578941	-	1578941	52.780			52.90		
	3	1596788	-	1596788	53.376			53.49		
	4	1668952	-	1668952	55.789			55.91		
	5	1481316	-	1481316	49.516			49.62		
	6	1660099	-	1660099	55.493			55.62		
30min	1	1999494	-	1999494	66.838	69.45	4.02	67.02	69.64	4.03
	2	2094154	-	2094154	70.002			70.20		
	3	2117892	-	2117892	70.795			70.99		
	4	2106230	-	2106230	70.406			70.61		
	5	1960247	-	1960247	65.526			65.70		
	6	2188075	-	2188075	73.142			73.35		
45min	1	2410574	-	2410574	80.579	82.89	2.57	80.86	83.19	2.58
	2	2516197	-	2516197	84.110			84.41		
	3	2504201	-	2504201	83.709			84.01		
	4	2485686	-	2485686	83.090			83.40		
	5	2398950	-	2398950	80.190			80.47		
	6	2562863	-	2562863	85.670			85.99		
60min	1	2606935	-	2606935	87.143	88.67	1.12	87.54	89.09	1.14
	2	2665965	-	2665965	89.116			89.55		
	3	2656890	-	2656890	88.813			89.24		
	4	2660275	-	2660275	88.926			89.36		
	5	2632218	-	2632218	87.988			88.38		
	6	2693030	-	2693030	90.021			90.47		
极限	1	2758505	-	2758505	92.209	92.85	0.42	92.74	93.41	0.43
	2	2779244	-	2779244	92.903			93.47		
	3	2771205	-	2771205	92.634			93.19		
	4	2791094	-	2791094	93.299			93.87		
	5	2780118	-	2780118	92.932			93.46		
	6	2785957	-	2785957	93.127			93.71		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.07	2996742	2997282	2996542	2996531	2995396	2996499	0.03
2	10.08	2995399	2996101				2995750	0.02
单位质量响应值				RSD%	判断			
297566.93				0.09	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	410014	-	410014	13.732	11.51	23.07	13.73	11.50	23.07
	2	290561	-	290561	9.732			9.73		
	3	287915	-	287915	9.643			9.64		
	4	317187	-	317187	10.623			10.62		
	5	282717	-	282717	9.469			9.47		
	6	472696	-	472696	15.832			15.83		
10min	1	1024949	-	1024949	34.328	29.78	16.88	34.35	29.80	16.89
	2	789099	-	789099	26.429			26.44		
	3	801586	-	801586	26.847			26.86		
	4	835530	-	835530	27.984			28.00		
	5	757646	-	757646	25.375			25.39		
	6	1126511	-	1126511	37.729			37.75		
15min	1	1529825	-	1529825	51.237	45.13	12.60	51.31	45.19	12.61
	2	1185338	-	1185338	39.700			39.75		
	3	1260862	-	1260862	42.229			42.28		
	4	1312426	-	1312426	43.956			44.01		
	5	1210413	-	1210413	40.539			40.59		
	6	1586102	-	1586102	53.122			53.20		
20min	1	1895699	-	1895699	63.491	57.33	10.13	63.64	57.46	10.14
	2	1515909	-	1515909	50.771			50.89		
	3	1609113	-	1609113	53.893			54.01		
	4	1710380	-	1710380	57.285			57.41		
	5	1595774	-	1595774	53.446			53.56		
	6	1943902	-	1943902	65.106			65.27		
30min	1	2385840	-	2385840	79.907	74.58	6.27	80.15	74.79	6.29
	2	2070711	-	2070711	69.353			69.54		
	3	2155109	-	2155109	72.179			72.38		
	4	2209919	-	2209919	74.015			74.22		
	5	2130352	-	2130352	71.350			71.54		
	6	2407937	-	2407937	80.647			80.90		
45min	1	2733684	-	2733684	91.557	88.21	2.97	91.92	88.54	3.00
	2	2547855	-	2547855	85.333			85.63		
	3	2563161	-	2563161	85.846			86.15		
	4	2613902	-	2613902	87.546			87.87		
	5	2622654	-	2622654	87.839			88.14		
	6	2721476	-	2721476	91.148			91.53		
60min	1	2859811	-	2859811	95.782	92.68	2.26	96.28	93.14	2.28
	2	2727610	-	2727610	91.354			91.78		
	3	2706700	-	2706700	90.654			91.09		
	4	2755400	-	2755400	92.285			92.74		
	5	2725233	-	2725233	91.274			91.71		
	6	2828253	-	2828253	94.725			95.24		
极限	1	2915185	-	2915185	97.636	95.25	1.61	98.28	95.85	1.64
	2	2819462	-	2819462	94.430			94.99		
	3	2805740	-	2805740	93.971			94.54		
	4	2834510	-	2834510	94.934			95.52		
	5	2804796	-	2804796	93.939			94.51		
	6	2884724	-	2884724	96.616			97.27		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-420-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:09:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:14:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-421-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:13:46

处理时间(V2): 2025/01/10 09:14:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	3011466	100.000	363195	2306	1.037	--
总计		3011466	100.000	363195			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-422-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:18:08

处理时间(V2): 2025/01/10 09:14:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	3012142	100.000	362087	2302	1.032	--
总计		3012142	100.000	362087			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-423-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:22:32

处理时间(V2): 2025/01/10 09:14:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	3010955	100.000	364358	2347	1.029	--
总计		3010955	100.000	364358			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-424-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:26:55

处理时间(V2): 2025/01/10 09:14:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	3012054	100.000	363083	2328	1.024	--
总计		3012054	100.000	363083			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-425-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:31:18

处理时间(V2): 2025/01/10 09:14:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	3011486	100.000	363567	2331	1.026	--
总计		3011486	100.000	363567			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-426-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 11:35:39


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:14:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	358199	100.000	44095	2438	1.025	--
总计		358199	100.000	44095			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-427-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:40:00

处理时间(V2): 2025/01/10 09:14:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	400943	100.000	49000	2395	1.029	--
总计		400943	100.000	49000			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-428-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-19

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 11:44:22


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:15:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	358213	100.000	44050	2436	1.022	--
总计		358213	100.000	44050			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-429-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:48:44

处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	390019	100.000	48422	2477	1.021	--
总计		390019	100.000	48422			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-430-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:53:06

处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	433531	100.000	53663	2465	1.027	--
总计		433531	100.000	53663			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-431-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 11:57:27

处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	395840	100.000	49376	2489	1.028	--
总计		395840	100.000	49376			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-432-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 12:01:48

处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	960877	100.000	119038	2471	1.020	--
总计		960877	100.000	119038			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-433-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 12:06:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:15:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	1005733	100.000	124468	2471	1.024	--
总计		1005733	100.000	124468			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-
片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-434-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 12:10:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:15:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	963948	100.000	120223	2509	1.025	--
总计		963948	100.000	120223			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-435-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 12:14:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	985556	100.000	122538	2482	1.024	--
总计		985556	100.000	122538			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-436-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:19:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	1072057	100.000	131562	2421	1.031	--
总计		1072057	100.000	131562			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-
片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-437-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-47

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 12:23:42


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	958986	100.000	116698	2372	1.039	--
总计		958986	100.000	116698			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-438-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:28:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	1461676	100.000	177053	2347	1.031	--
总计		1461676	100.000	177053			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-439-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 12:32:25

处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	1495006	100.000	180153	2312	1.036	--
总计		1495006	100.000	180153			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-440-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:36:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1509370	100.000	183091	2344	1.040	--
总计		1509370	100.000	183091			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-441-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 12:41:06
处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1499006	100.000	179110	2275	1.044	--
总计		1499006	100.000	179110			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-442-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 12:45:28
处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1617285	100.000	197505	2376	1.034	--
总计		1617285	100.000	197505			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-443-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 12:49:50
处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1456874	100.000	178140	2383	1.036	--
总计		1456874	100.000	178140			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-
片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-444-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 12:54:11

处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1858300	100.000	228423	2412	1.031	--
总计		1858300	100.000	228423			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-445-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 12:58:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1894185	100.000	226752	2281	1.042	--
总计		1894185	100.000	226752			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-446-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:02:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1941695	100.000	235669	2347	1.033	--
总计		1941695	100.000	235669			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-447-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 13:07:15 版本号: 6.115
处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:50 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275) 处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1915751	100.000	231715	2331	1.038	--
总计		1915751	100.000	231715			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-
片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-448-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 13:11:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	2010939	100.000	240574	2281	1.044	--
总计		2010939	100.000	240574			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-449-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 13:15:58
处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	1879608	100.000	224658	2275	1.046	--
总计		1879608	100.000	224658			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-450-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-5

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 13:20:19


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:15:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2372866	100.000	282949	2269	1.051	--
总计		2372866	100.000	282949			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-
片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-451-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 13:24:40

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	2409800	100.000	287285	2262	1.047	--
总计		2409800	100.000	287285			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-452-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 13:29:00

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2510125	100.000	298335	2253	1.048	--
总计		2510125	100.000	298335			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-
片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-453-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 13:33:22
处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2456886	100.000	291941	2245	1.048	--
总计		2456886	100.000	291941			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-454-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:37:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2512983	100.000	299518	2256	1.046	--
总计		2512983	100.000	299518			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-455-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-50

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 13:42:06


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2469512	100.000	293966	2258	1.052	--
总计		2469512	100.000	293966			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-456-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 13:46:27
处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2735246	100.000	325532	2254	1.050	--
总计		2735246	100.000	325532			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-
片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-457-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 13:50:48
处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2740036	100.000	326773	2269	1.047	--
总计		2740036	100.000	326773			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-458-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 13:55:08

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2829352	100.000	336395	2258	1.051	--
总计		2829352	100.000	336395			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-459-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 13:59:30
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2782010	100.000	329767	2241	1.058	--
总计		2782010	100.000	329767			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-460-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 14:03:51

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2803627	100.000	332958	2250	1.049	--
总计		2803627	100.000	332958			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-461-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 14:08:13

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2817862	100.000	338475	2303	1.050	--
总计		2817862	100.000	338475			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-462-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 14:12:34
处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2844696	100.000	336155	2225	1.055	--
总计		2844696	100.000	336155			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-463-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 14:16:54
处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	2827492	100.000	335773	2246	1.052	--
总计		2827492	100.000	335773			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-
片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-464-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 14:21:16
处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2903999	100.000	346091	2263	1.053	--
总计		2903999	100.000	346091			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-465-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 14:25:37

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2873119	100.000	343044	2270	1.049	--
总计		2873119	100.000	343044			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-466-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 14:29:58

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2884511	100.000	341967	2242	1.055	--
总计		2884511	100.000	341967			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-467-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 14:34:20

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2909368	100.000	350423	2309	1.041	--
总计		2909368	100.000	350423			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-468-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-8

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 14:38:41


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2889247	100.000	346607	2295	1.047	--
总计		2889247	100.000	346607			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-469-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:43:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2866866	100.000	341320	2257	1.049	--
总计		2866866	100.000	341320			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-470-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:47:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2929406	100.000	346638	2238	1.056	--
总计		2929406	100.000	346638			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-471-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:51:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2916460	100.000	349902	2290	1.040	--
总计		2916460	100.000	349902			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-472-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-44

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 14:56:11


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:16:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	2920566	100.000	352490	2318	1.043	--
总计		2920566	100.000	352490			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-473-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:00:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	2949223	100.000	355753	2323	1.048	--
总计		2949223	100.000	355753			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-474-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:04:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	3010691	100.000	355383	2203	1.051	--
总计		3010691	100.000	355383			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-475-2 - zzp-25010701-1-yd1p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 15:09:20


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	3006523	100.000	358735	2253	1.044	--
总计		3006523	100.000	358735			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd1批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-476-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-9

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 15:13:44


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-477-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 15:18:08

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	3002974	100.000	356207	2231	1.046	--
总计		3002974	100.000	356207			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-478-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:22:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	3003123	100.000	353073	2179	1.044	--
总计		3003123	100.000	353073			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-479-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:26:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	3002540	100.000	358767	2259	1.043	--
总计		3002540	100.000	358767			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-480-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:31:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	3004492	100.000	359129	2261	1.042	--
总计		3004492	100.000	359129			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-481-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:35:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	3002355	100.000	359101	2264	1.041	--
总计		3002355	100.000	359101			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-482-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 15:40:06


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	264839	100.000	32429	2397	1.040	--
总计		264839	100.000	32429			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-483-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 15:44:29

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	314596	100.000	38665	2402	1.038	--
总计		314596	100.000	38665			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-484-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:48:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	299390	100.000	36921	2426	1.037	--
总计		299390	100.000	36921			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-485-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 15:53:15

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	316344	100.000	38212	2331	1.047	--
总计		316344	100.000	38212			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-486-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-37

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 15:57:37


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	263022	100.000	32123	2372	1.035	--
总计		263022	100.000	32123			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-
片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-487-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 16:02:00

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	348623	100.000	42556	2375	1.038	--
总计		348623	100.000	42556			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-488-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-2

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 16:06:23


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	694722	100.000	83875	2329	1.045	--
总计		694722	100.000	83875			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-489-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 16:10:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	823067	100.000	100583	2382	1.036	--
总计		823067	100.000	100583			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-490-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 16:15:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	781578	100.000	95403	2375	1.035	--
总计		781578	100.000	95403			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-491-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 16:19:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	824971	100.000	100092	2352	1.042	--
总计		824971	100.000	100092			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-492-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 16:23:55
处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	696027	100.000	84212	2332	1.043	--
总计		696027	100.000	84212			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-493-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:28:18

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/10 09:17:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	840815	100.000	102093	2347	1.037	--
总计		840815	100.000	102093			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-494-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 16:32:41

处理时间(V2): 2025/01/10 09:17:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	1135746	100.000	136598	2305	1.045	--
总计		1135746	100.000	136598			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-495-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 16:37:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1239140	100.000	148190	2274	1.043	--
总计		1239140	100.000	148190			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-496-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间:2025/01/09 16:41:26 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1230821	100.000	148637	2334	1.045	--
总计		1230821	100.000	148637			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-497-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:45:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1279449	100.000	152881	2275	1.048	--
总计		1279449	100.000	152881			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-498-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-39

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 16:50:13


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1116887	100.000	133770	2287	1.043	--
总计		1116887	100.000	133770			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-499-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:54:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1286997	100.000	156896	2372	1.037	--
总计		1286997	100.000	156896			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-500-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 16:59:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1507792	100.000	182524	2348	1.044	--
总计		1507792	100.000	182524			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-501-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:03:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	1578941	100.000	192097	2374	1.046	--
总计		1578941	100.000	192097			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-502-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 17:07:47
处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1596788	100.000	193761	2347	1.039	--
总计		1596788	100.000	193761			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-503-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 17:12:10
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	1668952	100.000	203722	2383	1.035	--
总计		1668952	100.000	203722			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-504-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 17:16:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	1481316	100.000	180387	2368	1.036	--
总计		1481316	100.000	180387			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-505-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 17:20:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	1660099	100.000	201134	2344	1.042	--
总计		1660099	100.000	201134			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-506-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 17:25:18

处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	1999494	100.000	241650	2332	1.043	--
总计		1999494	100.000	241650			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-507-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 17:29:42 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:31 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275) 处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	2094154	100.000	254323	2355	1.041	--
总计		2094154	100.000	254323			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-508-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 17:34:07
处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	2117892	100.000	258075	2367	1.037	--
总计		2117892	100.000	258075			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-509-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:38:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	2106230	100.000	255095	2352	1.043	--
总计		2106230	100.000	255095			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-510-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 17:42:53
处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	1960247	100.000	237889	2354	1.036	--
总计		1960247	100.000	237889			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-511-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 17:47:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2188075	100.000	265322	2347	1.038	--
总计		2188075	100.000	265322			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-512-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 17:51:40

处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	2410574	100.000	290733	2317	1.039	--
总计		2410574	100.000	290733			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-513-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-15

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 17:56:04


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	2516197	100.000	303323	2326	1.046	--
总计		2516197	100.000	303323			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-514-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:00:27
处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2504201	100.000	301522	2320	1.046	--
总计		2504201	100.000	301522			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-515-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:04:51 版本号: 6.115
处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:52 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275) 处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2485686	100.000	300263	2333	1.041	--
总计		2485686	100.000	300263			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-516-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 18:09:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2398950	100.000	289168	2326	1.044	--
总计		2398950	100.000	289168			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-517-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 18:13:37

处理时间(V2): 2025/01/10 09:18:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2562863	100.000	310013	2341	1.042	--
总计		2562863	100.000	310013			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-518-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 18:18:01

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2606935	100.000	314674	2337	1.047	--
总计		2606935	100.000	314674			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-519-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:22:25
处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2665965	100.000	322261	2342	1.049	--
总计		2665965	100.000	322261			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-

片2

供试品溶液-1

100




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-520-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 18:26:48
处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2656890	100.000	325300	2398	1.038	--
总计		2656890	100.000	325300			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-521-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 18:31:12

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2660275	100.000	325580	2392	1.037	--
总计		2660275	100.000	325580			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4

供试品溶液-1

102

Page 102/168




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-522-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:35:35
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2632218	100.000	322141	2397	1.038	--
总计		2632218	100.000	322141			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-523-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-52

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 18:39:58


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2693030	100.000	330329	2402	1.039	--
总计		2693030	100.000	330329			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-

片6

供试品溶液-1

104



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-524-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/09 18:44:21

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	2758505	100.000	337985	2398	1.039	--
总计		2758505	100.000	337985			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-525-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 18:48:44

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2779244	100.000	340345	2392	1.038	--
总计		2779244	100.000	340345			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-526-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:53:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2771205	100.000	338801	2388	1.038	--
总计		2771205	100.000	338801			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-527-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-35

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 18:57:31


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2791094	100.000	339249	2362	1.040	--
总计		2791094	100.000	339249			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-528-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:02:00

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2780118	100.000	336835	2342	1.040	--
总计		2780118	100.000	336835			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-529-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 19:06:24
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	2785957	100.000	339011	2364	1.038	--
总计		2785957	100.000	339011			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-530-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:10:48

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	2999785	100.000	352829	2195	1.048	--
总计		2999785	100.000	352829			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-531-2 - zzp-25010701-1-yd2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:15:11

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	3001805	100.000	352901	2193	1.047	--
总计		3001805	100.000	352901			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-532-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 19:19:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-533-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:23:54

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	2996742	100.000	357185	2248	1.043	--
总计		2996742	100.000	357185			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-534-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:28:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	2997282	100.000	357381	2259	1.044	--
总计		2997282	100.000	357381			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-535-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:32:38

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	2996542	100.000	357623	2264	1.041	--
总计		2996542	100.000	357623			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-536-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 19:37:00

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	2996531	100.000	354952	2224	1.042	--
总计		2996531	100.000	354952			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-537-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:41:22

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	2995396	100.000	354215	2221	1.040	--
总计		2995396	100.000	354215			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-538-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/09 19:45:43

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	410014	100.000	50124	2391	1.034	--
总计		410014	100.000	50124			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1

供试品溶液-1

119

Page 119/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-539-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:50:05

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	290561	100.000	35500	2388	1.033	--
总计		290561	100.000	35500			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2

供试品溶液-1

120

Page 120/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-540-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-19

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 19:54:27


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:19:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	287915	100.000	34894	2356	1.034	--
总计		287915	100.000	34894			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3

供试品溶液-1

121

Page 121/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-541-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:58:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	317187	100.000	38663	2379	1.032	--
总计		317187	100.000	38663			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4

供试品溶液-1

122

Page 122/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-542-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 20:03:09

处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	282717	100.000	34560	2397	1.034	--
总计		282717	100.000	34560			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5

供试品溶液-1

123

Page 123/168

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-543-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 20:07:30

处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	472696	100.000	57864	2394	1.036	--
总计		472696	100.000	57864			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-544-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:11:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	1024949	100.000	124719	2364	1.035	--
总计		1024949	100.000	124719			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-545-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:16:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	789099	100.000	95761	2358	1.037	--
总计		789099	100.000	95761			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-546-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 20:20:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	801586	100.000	97748	2377	1.036	--
总计		801586	100.000	97748			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3

供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-547-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 20:24:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	835530	100.000	102006	2383	1.036	--
总计		835530	100.000	102006			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4

供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-548-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 20:29:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	757646	100.000	92060	2366	1.035	--
总计		757646	100.000	92060			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5

供试品溶液-1

129

Page 129/168




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-549-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:33:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	1126511	100.000	136961	2363	1.038	--
总计		1126511	100.000	136961			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-550-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 20:37:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	1529825	100.000	186789	2378	1.038	--
总计		1529825	100.000	186789			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1

供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-551-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-12

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 20:42:21


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	1185338	100.000	144555	2391	1.036	--
总计		1185338	100.000	144555			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2

供试品溶液-1

132

Page 132/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-552-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 20:46:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	1260862	100.000	152784	2351	1.034	--
总计		1260862	100.000	152784			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3

供试品溶液-1

133

Page 133/168

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-553-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-30

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 20:51:03


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	1312426	100.000	160785	2404	1.037	--
总计		1312426	100.000	160785			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4

供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-554-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 20:55:24

处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	1210413	100.000	147482	2373	1.036	--
总计		1210413	100.000	147482			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-555-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 20:59:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	1586102	100.000	192774	2363	1.033	--
总计		1586102	100.000	192774			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-556-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:04:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	1895699	100.000	231828	2387	1.041	--
总计		1895699	100.000	231828			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-

片1

供试品溶液-1

137

Page 137/168

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-557-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:08:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	1515909	100.000	186081	2412	1.039	--
总计		1515909	100.000	186081			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-558-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 21:12:50
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	1609113	100.000	197295	2400	1.040	--
总计		1609113	100.000	197295			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-559-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:17:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	1710380	100.000	209520	2395	1.037	--
总计		1710380	100.000	209520			

图140 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4

供试品溶液-1

140

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-560-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 21:21:33

处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	1595774	100.000	195968	2417	1.038	--
总计		1595774	100.000	195968			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-561-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 21:25:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	1943902	100.000	238401	2402	1.039	--
总计		1943902	100.000	238401			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-562-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 21:30:15

处理时间(V2): 2025/01/10 09:20:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	2385840	100.000	292085	2398	1.038	--
总计		2385840	100.000	292085			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-

片1

供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-563-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 21:34:36

处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	2070711	100.000	253349	2390	1.039	--
总计		2070711	100.000	253349			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-564-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 21:38:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	2155109	100.000	263551	2390	1.039	--
总计		2155109	100.000	263551			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-565-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 21:43:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	2209919	100.000	270197	2390	1.038	--
总计		2209919	100.000	270197			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-566-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:47:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	2130352	100.000	261300	2407	1.037	--
总计		2130352	100.000	261300			

图147 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5

供试品溶液-1

147



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-567-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 21:52:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	2407937	100.000	295417	2412	1.036	--
总计		2407937	100.000	295417			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6

供试品溶液-1

148



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-568-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-6

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 21:56:21


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	2733684	100.000	334156	2391	1.038	--
总计		2733684	100.000	334156			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1

供试品溶液-1

149




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-569-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间:2025/01/09 22:00:42 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2547855	100.000	310040	2379	1.034	--
总计		2547855	100.000	310040			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-570-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 22:05:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2563161	100.000	313210	2403	1.035	--
总计		2563161	100.000	313210			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-
片3

供试品溶液-1

151

Page 151/168

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-571-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 22:09:24

处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2613902	100.000	318032	2378	1.036	--
总计		2613902	100.000	318032			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4

供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-572-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:13:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2622654	100.000	319644	2390	1.037	--
总计		2622654	100.000	319644			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5

供试品溶液-1

153

Page 153/168

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-573-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 22:18:06

处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2721476	100.000	330817	2372	1.037	--
总计		2721476	100.000	330817			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-

片6

供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-574-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:22:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2859811	100.000	348940	2389	1.035	--
总计		2859811	100.000	348940			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-

片1

供试品溶液-1

155

Page 155/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-575-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 22:26:48

处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	2727610	100.000	332047	2378	1.038	--
总计		2727610	100.000	332047			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2

供试品溶液-1

156

Page 156/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-576-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:31:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2706700	100.000	330854	2401	1.036	--
总计		2706700	100.000	330854			

图157 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3

供试品溶液-1

157

Page 157/168




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-577-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 22:35:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2755400	100.000	336086	2389	1.037	--
总计		2755400	100.000	336086			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-578-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 22:39:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	2725233	100.000	332207	2389	1.036	--
总计		2725233	100.000	332207			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-579-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 22:44:12

处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2828253	100.000	344334	2380	1.038	--
总计		2828253	100.000	344334			

图160 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-

片6

供试品溶液-1

160

Page 160/168



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-580-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 22:48:34

处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	2915185	100.000	354537	2375	1.038	--
总计		2915185	100.000	354537			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-581-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:52:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	2819462	100.000	343395	2381	1.037	--
总计		2819462	100.000	343395			

图162 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-582-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 22:57:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	2805740	100.000	342256	2388	1.035	--
总计		2805740	100.000	342256			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-583-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 23:01:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	2834510	100.000	345348	2382	1.036	--
总计		2834510	100.000	345348			

图164 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-584-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 23:06:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	2804796	100.000	342209	2385	1.036	--
总计		2804796	100.000	342209			

图165 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-585-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 23:10:22

处理时间(V2): 2025/01/10 09:21:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	2884724	100.000	350528	2363	1.035	--
总计		2884724	100.000	350528			

图166 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-586-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 23:14:43

处理时间(V2): 2025/01/10 09:22:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2995399	100.000	353958	2217	1.042	--
总计		2995399	100.000	353958			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-193/26-587-2 - zzp-25010701-1-yd3p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX275.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/09 23:19:04

处理时间(V2): 2025/01/10 09:22:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	2996101	100.000	355366	2236	1.040	--
总计		2996101	100.000	355366			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-1-yd3批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2