



塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.07	3038623	3037630	3037869	3037549	3033537	3037042	0.07
2	10.08	3043606	3034753				3039180	0.21

单位质量响应值		RSD%	判断
301593.05	301505.95	0.03	数据可信

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	276112	-	276112	9.120	8.34	5.46	9.12	8.34	5.46
	2	244100	-	244100	8.062			8.06		
	3	236455	-	236455	7.810			7.81		
	4	258871	-	258871	8.550			8.55		
	5	250244	-	250244	8.265			8.27		
	6	248557	-	248557	8.210			8.21		
10min	1	718570	-	718570	23.734	22.48	4.00	23.75	22.49	4.00
	2	686694	-	686694	22.681			22.69		
	3	639936	-	639936	21.137			21.15		
	4	698359	-	698359	23.066			23.08		
	5	671628	-	671628	22.183			22.20		
	6	667589	-	667589	22.050			22.06		
15min	1	1153102	-	1153102	38.086	36.32	3.72	38.14	36.36	3.73
	2	1116454	-	1116454	36.876			36.92		
	3	1052080	-	1052080	34.750			34.79		
	4	1134903	-	1134903	37.485			37.53		
	5	1073155	-	1073155	35.446			35.49		
	6	1067784	-	1067784	35.268			35.31		
20min	1	1533791	-	1533791	50.660	48.26	3.79	50.77	48.36	3.79
	2	1475722	-	1475722	48.742			48.84		
	3	1405998	-	1405998	46.439			46.53		
	4	1511291	-	1511291	49.917			50.02		
	5	1441079	-	1441079	47.598			47.70		
	6	1399051	-	1399051	46.210			46.31		
30min	1	2103761	-	2103761	69.486	66.51	3.46	69.67	66.68	3.46
	2	2047798	-	2047798	67.638			67.81		
	3	1940282	-	1940282	64.086			64.25		
	4	2068057	-	2068057	68.307			68.49		
	5	1982724	-	1982724	65.488			65.66		
	6	1939191	-	1939191	64.050			64.22		
45min	1	2560286	-	2560286	84.565	81.96	2.24	84.85	82.24	2.24
	2	2522199	-	2522199	83.307			83.58		
	3	2424875	-	2424875	80.092			80.35		
	4	2502325	-	2502325	82.650			82.93		
	5	2453702	-	2453702	81.044			81.31		
	6	2426010	-	2426010	80.130			80.39		
60min	1	2739411	-	2739411	90.481	88.60	1.31	90.89	89.00	1.32
	2	2703510	-	2703510	89.295			89.70		
	3	2647722	-	2647722	87.453			87.83		
	4	2687611	-	2687611	88.770			89.18		
	5	2664397	-	2664397	88.003			88.39		
	6	2652797	-	2652797	87.620			88.00		
极限	1	2849578	-	2849578	94.120	92.58	1.05	94.67	93.10	1.06
	2	2823389	-	2823389	93.255			93.79		
	3	2778625	-	2778625	91.776			92.29		
	4	2806449	-	2806449	92.695			93.23		
	5	2778910	-	2778910	91.786			92.31		
	6	2780120	-	2780120	91.826			92.34		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.07	3045825	3047164	3055509	3041472	3039386	3045871	0.21
2	10.08	3029998	3039178				3034588	0.22
单位质量响应值				RSD%	判断			
302469.81				0.34	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	258880	-	258880	8.545	8.27	6.97	8.54	8.27	6.98
	2	257065	-	257065	8.485			8.48		
	3	236733	-	236733	7.814			7.81		
	4	251725	-	251725	8.309			8.31		
	5	224796	-	224796	7.420			7.42		
	6	274097	-	274097	9.047			9.05		
10min	1	701302	-	701302	23.148	22.05	6.16	23.16	22.07	6.16
	2	691764	-	691764	22.833			22.85		
	3	666837	-	666837	22.010			22.02		
	4	643004	-	643004	21.223			21.24		
	5	599576	-	599576	19.790			19.80		
	6	706375	-	706375	23.315			23.33		
15min	1	1132603	-	1132603	37.383	35.61	4.59	37.43	35.65	4.60
	2	1106713	-	1106713	36.529			36.58		
	3	1096649	-	1096649	36.197			36.24		
	4	1056213	-	1056213	34.862			34.91		
	5	991378	-	991378	32.722			32.76		
	6	1088835	-	1088835	35.939			35.99		
20min	1	1479788	-	1479788	48.843	46.82	3.69	48.95	46.92	3.69
	2	1420733	-	1420733	46.893			47.00		
	3	1458528	-	1458528	48.141			48.24		
	4	1401579	-	1401579	46.261			46.36		
	5	1329048	-	1329048	43.867			43.96		
	6	1421702	-	1421702	46.925			47.03		
30min	1	2018889	-	2018889	66.637	63.89	2.95	66.81	64.06	2.94
	2	1932955	-	1932955	63.800			63.97		
	3	1980190	-	1980190	65.359			65.53		
	4	1911334	-	1911334	63.087			63.25		
	5	1856590	-	1856590	61.280			61.44		
	6	1914677	-	1914677	63.197			63.37		
45min	1	2468497	-	2468497	81.477	79.21	2.04	81.75	79.47	2.04
	2	2397243	-	2397243	79.125			79.39		
	3	2443994	-	2443994	80.668			80.94		
	4	2388701	-	2388701	78.843			79.10		
	5	2341779	-	2341779	77.294			77.54		
	6	2357918	-	2357918	77.827			78.09		
60min	1	2634045	-	2634045	86.941	85.85	1.33	87.34	86.23	1.33
	2	2602215	-	2602215	85.890			86.28		
	3	2641184	-	2641184	87.176			87.57		
	4	2605532	-	2605532	86.000			86.38		
	5	2557711	-	2557711	84.421			84.78		
	6	2564798	-	2564798	84.655			85.04		
极限	1	2756165	-	2756165	90.971	89.80	0.90	91.50	90.31	0.91
	2	2729621	-	2729621	90.095			90.61		
	3	2730386	-	2730386	90.121			90.64		
	4	2719963	-	2719963	89.777			90.28		
	5	2686063	-	2686063	88.658			89.15		
	6	2702240	-	2702240	89.192			89.70		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-10

复核者:

未审阅版本



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1085-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 11:09:19
处理时间(V2): 2025/01/10 09:07:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1086-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 11:13:42
处理时间(V2): 2025/01/10 09:07:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	3038623	100.000	487796	4994	1.211	--
总计		3038623	100.000	487796			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1087-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:18:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:07:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	3037630	100.000	487541	4992	1.211	--
总计		3037630	100.000	487541			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1088-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 11:22:28
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	3037869	100.000	487708	4996	1.212	--
总计		3037869	100.000	487708			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1089-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:26:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:07:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	3037549	100.000	487693	4997	1.212	--
总计		3037549	100.000	487693			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1090-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 11:31:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	3033537	100.000	486873	4993	1.212	--
总计		3033537	100.000	486873			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1091-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 11:35:36


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	276112	100.000	45928	5426	1.209	--
总计		276112	100.000	45928			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1092-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:39:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	244100	100.000	40585	5415	1.211	--
总计		244100	100.000	40585			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1093-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:44:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	236455	100.000	39335	5418	1.210	--
总计		236455	100.000	39335			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1094-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:48:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	258871	100.000	43059	5420	1.210	--
总计		258871	100.000	43059			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1095-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:53:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.862	250244	100.000	41609	5417	1.210	--
总计		250244	100.000	41609			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1096-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:57:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	248557	100.000	41338	5420	1.210	--
总计		248557	100.000	41338			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1097-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:01:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	718570	100.000	119390	5420	1.212	--
总计		718570	100.000	119390			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1098-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-11

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 12:06:07


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	686694	100.000	114175	5418	1.212	--
总计		686694	100.000	114175			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1099-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:10:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	639936	100.000	106432	5421	1.212	--
总计		639936	100.000	106432			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1100-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-29

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 12:14:50


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	698359	100.000	116132	5418	1.211	--
总计		698359	100.000	116132			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1101-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:19:11

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	671628	100.000	111659	5418	1.211	--
总计		671628	100.000	111659			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1102-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:23:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	667589	100.000	111025	5420	1.211	--
总计		667589	100.000	111025			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1103-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:27:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	1153102	100.000	191661	5411	1.212	--
总计		1153102	100.000	191661			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1104-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:32:17

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	1116454	100.000	185564	5414	1.212	--
总计		1116454	100.000	185564			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1105-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-21

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 12:36:39


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	1052080	100.000	174849	5415	1.212	--
总计		1052080	100.000	174849			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1106-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:41:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	1134903	100.000	188740	5419	1.212	--
总计		1134903	100.000	188740			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1107-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:45:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	1073155	100.000	178415	5412	1.212	--
总计		1073155	100.000	178415			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1108-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:49:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	1067784	100.000	177416	5418	1.213	--
总计		1067784	100.000	177416			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1109-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:54:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/10 09:08:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	1533791	100.000	254650	5417	1.213	--
总计		1533791	100.000	254650			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1110-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:58:26

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	1475722	100.000	244882	5414	1.213	--
总计		1475722	100.000	244882			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1111-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:02:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	1405998	100.000	233109	5417	1.213	--
总计		1405998	100.000	233109			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1112-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:07:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:08:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.863	1511291	100.000	251227	5417	1.213	--
总计		1511291	100.000	251227			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1113-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:11:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	1441079	100.000	239466	5421	1.213	--
总计		1441079	100.000	239466			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1114-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:15:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	1399051	100.000	232487	5425	1.213	--
总计		1399051	100.000	232487			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1115-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:20:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	2103761	100.000	349396	5418	1.214	--
总计		2103761	100.000	349396			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1116-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:24:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	2047798	100.000	339808	5418	1.214	--
总计		2047798	100.000	339808			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1117-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:28:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	1940282	100.000	322358	5417	1.213	--
总计		1940282	100.000	322358			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1118-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:33:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	2068057	100.000	343486	5421	1.213	--
总计		2068057	100.000	343486			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1119-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:37:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	1982724	100.000	329069	5416	1.214	--
总计		1982724	100.000	329069			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1120-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:42:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	1939191	100.000	321930	5415	1.214	--
总计		1939191	100.000	321930			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1121-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:46:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	2560286	100.000	424490	5412	1.215	--
总计		2560286	100.000	424490			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1122-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:50:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2522199	100.000	417231	5421	1.215	--
总计		2522199	100.000	417231			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1123-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:55:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2424875	100.000	401135	5418	1.215	--
总计		2424875	100.000	401135			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1124-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:59:36

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2502325	100.000	414188	5422	1.215	--
总计		2502325	100.000	414188			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1125-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:03:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2453702	100.000	405970	5420	1.215	--
总计		2453702	100.000	405970			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1126-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:08:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2426010	100.000	401218	5414	1.215	--
总计		2426010	100.000	401218			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1127-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:12:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	2739411	100.000	453442	5423	1.215	--
总计		2739411	100.000	453442			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1128-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:17:05

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2703510	100.000	447111	5420	1.215	--
总计		2703510	100.000	447111			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1129-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:21:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2647722	100.000	437508	5415	1.215	--
总计		2647722	100.000	437508			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1130-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:25:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	2687611	100.000	444930	5418	1.215	--
总计		2687611	100.000	444930			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1131-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:30:11

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2664397	100.000	440386	5418	1.215	--
总计		2664397	100.000	440386			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1132-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:34:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2652797	100.000	438476	5417	1.215	--
总计		2652797	100.000	438476			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1133-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:38:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2849578	100.000	470437	5415	1.215	--
总计		2849578	100.000	470437			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-
片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1134-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:43:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2823389	100.000	466597	5416	1.215	--
总计		2823389	100.000	466597			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1135-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:47:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:09:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2778625	100.000	458621	5416	1.215	--
总计		2778625	100.000	458621			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1136-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:52:05

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2806449	100.000	463737	5418	1.215	--
总计		2806449	100.000	463737			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1137-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:56:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2778910	100.000	458929	5423	1.216	--
总计		2778910	100.000	458929			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1138-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:00:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2780120	100.000	459722	5421	1.215	--
总计		2780120	100.000	459722			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1139-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:05:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	3043606	100.000	485690	4988	1.213	--
总计		3043606	100.000	485690			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1140-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:09:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	3034753	100.000	484302	4983	1.213	--
总计		3034753	100.000	484302			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1141-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 15:14:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1142-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 15:18:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	3045825	100.000	486429	4983	1.213	--
总计		3045825	100.000	486429			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1143-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 15:22:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	3047164	100.000	486719	4989	1.213	--
总计		3047164	100.000	486719			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1144-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 15:27:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.861	3055509	100.000	487861	4986	1.213	--
总计		3055509	100.000	487861			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1145-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/09 15:31:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	3041472	100.000	485450	4983	1.214	--
总计		3041472	100.000	485450			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1146-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 15:35:59
处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.860	3039386	100.000	485206	4989	1.214	--
总计		3039386	100.000	485206			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1147-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 15:40:23


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	258880	100.000	42809	5427	1.211	--
总计		258880	100.000	42809			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1148-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:44:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	257065	100.000	42537	5429	1.210	--
总计		257065	100.000	42537			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1149-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:49:10

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	236733	100.000	39184	5435	1.210	--
总计		236733	100.000	39184			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1150-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:53:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	251725	100.000	41703	5429	1.209	--
总计		251725	100.000	41703			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1151-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:57:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	224796	100.000	37269	5432	1.208	--
总计		224796	100.000	37269			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1152-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:02:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	274097	100.000	45432	5435	1.209	--
总计		274097	100.000	45432			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1153-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:06:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	701302	100.000	116003	5426	1.212	--
总计		701302	100.000	116003			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1154-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:11:07

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	691764	100.000	114459	5429	1.212	--
总计		691764	100.000	114459			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1155-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:15:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	666837	100.000	110350	5431	1.211	--
总计		666837	100.000	110350			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1156-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:19:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	643004	100.000	106490	5428	1.211	--
总计		643004	100.000	106490			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1157-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:24:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:10:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	599576	100.000	99211	5430	1.211	--
总计		599576	100.000	99211			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1158-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:28:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	706375	100.000	116984	5426	1.211	--
总计		706375	100.000	116984			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1159-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:33:01

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	1132603	100.000	187315	5424	1.213	--
总计		1132603	100.000	187315			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1160-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:37:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1106713	100.000	183196	5433	1.213	--
总计		1106713	100.000	183196			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1161-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:41:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1096649	100.000	181701	5429	1.212	--
总计		1096649	100.000	181701			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1162-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:46:11

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1056213	100.000	174894	5425	1.212	--
总计		1056213	100.000	174894			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1163-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:50:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	991378	100.000	164280	5429	1.212	--
总计		991378	100.000	164280			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1164-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:54:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1088835	100.000	180390	5427	1.212	--
总计		1088835	100.000	180390			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1165-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:59:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1479788	100.000	245176	5430	1.213	--
总计		1479788	100.000	245176			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1166-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:03:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1420733	100.000	235272	5426	1.213	--
总计		1420733	100.000	235272			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1167-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:08:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1458528	100.000	241298	5420	1.213	--
总计		1458528	100.000	241298			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1168-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:12:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.870	1401579	100.000	232339	5431	1.213	--
总计		1401579	100.000	232339			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1169-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:16:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	1329048	100.000	219895	5428	1.214	--
总计		1329048	100.000	219895			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1170-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:21:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	1421702	100.000	235044	5422	1.214	--
总计		1421702	100.000	235044			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1171-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:25:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	201889	100.000	333836	5429	1.214	--
总计		201889	100.000	333836			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1172-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:30:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/10 09:11:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1932955	100.000	320356	5435	1.214	--
总计		1932955	100.000	320356			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1173-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:34:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	1980190	100.000	327546	5426	1.214	--
总计		1980190	100.000	327546			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1174-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:38:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1911334	100.000	316283	5423	1.214	--
总计		1911334	100.000	316283			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1175-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:43:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1856590	100.000	307571	5428	1.214	--
总计		1856590	100.000	307571			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1176-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:47:38

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	1914677	100.000	316737	5422	1.215	--
总计		1914677	100.000	316737			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1177-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:52:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	2468497	100.000	408895	5429	1.215	--
总计		2468497	100.000	408895			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1178-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:56:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	2397243	100.000	397364	5434	1.215	--
总计		2397243	100.000	397364			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1179-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:00:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:11:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	2443994	100.000	404467	5422	1.215	--
总计		2443994	100.000	404467			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1180-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:05:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.870	2388701	100.000	395797	5429	1.215	--
总计		2388701	100.000	395797			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1181-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:09:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.870	2341779	100.000	388495	5431	1.214	--
总计		2341779	100.000	388495			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1182-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:14:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	2357918	100.000	390524	5429	1.215	--
总计		2357918	100.000	390524			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1183-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:18:26

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.870	2634045	100.000	436633	5427	1.215	--
总计		2634045	100.000	436633			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1184-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:22:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	2602215	100.000	431498	5426	1.215	--
总计		2602215	100.000	431498			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

100



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1185-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:27:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.870	2641184	100.000	437704	5429	1.215	--
总计		2641184	100.000	437704			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

101




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1186-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:31:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	2605532	100.000	432041	5427	1.215	--
总计		2605532	100.000	432041			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1187-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:36:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	2557711	100.000	424208	5429	1.215	--
总计		2557711	100.000	424208			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

103



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1188-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:40:23

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.870	2564798	100.000	425082	5421	1.215	--
总计		2564798	100.000	425082			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

104



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1189-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:44:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	2756165	100.000	456978	5427	1.216	--
总计		2756165	100.000	456978			

图105 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

105



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1190-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:49:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	2729621	100.000	452586	5423	1.215	--
总计		2729621	100.000	452586			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

106



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1191-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:53:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	2730386	100.000	452779	5429	1.216	--
总计		2730386	100.000	452779			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

107



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1192-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:57:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.872	2719963	100.000	451190	5433	1.216	--
总计		2719963	100.000	451190			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

108




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1193-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 19:02:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	2686063	100.000	445275	5424	1.216	--
总计		2686063	100.000	445275			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1194-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 19:06:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.871	2702240	100.000	448123	5431	1.216	--
总计		2702240	100.000	448123			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1195-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:11:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	3029998	100.000	484342	4993	1.214	--
总计		3029998	100.000	484342			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-192/25-1196-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 19:15:33
处理时间(V2): 2025/01/10 09:12:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.865	3039178	100.000	485661	4995	1.214	--
总计		3039178	100.000	485661			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2