




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2716-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:09:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2717-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:14:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.811	3014097	100.000	495954	4985	1.031	--
总计		3014097	100.000	495954			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2718-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:18:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.810	3013896	100.000	495340	4990	1.031	--
总计		3013896	100.000	495340			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2719-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 11:22:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.810	3013534	100.000	495259	4990	1.032	--
总计		3013534	100.000	495259			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2720-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 11:27:19


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:23:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.810	3010921	100.000	495459	5002	1.032	--
总计		3010921	100.000	495459			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2721-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:31:42
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.810	3013663	100.000	496209	5011	1.033	--
总计		3013663	100.000	496209			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2722-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 11:36:05


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	338874	100.000	57655	5379	1.023	--
总计		338874	100.000	57655			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2723-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/09 11:40:26

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	363321	100.000	61673	5375	1.024	--
总计		363321	100.000	61673			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2724-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-19

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 11:44:49


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:23:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	377851	100.000	64106	5373	1.024	--
总计		377851	100.000	64106			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2725-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:49:10

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	346431	100.000	58800	5369	1.024	--
总计		346431	100.000	58800			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2726-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 11:53:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:23:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	311650	100.000	52954	5373	1.025	--
总计		311650	100.000	52954			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2727-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 11:57:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	371282	100.000	63042	5371	1.025	--
总计		371282	100.000	63042			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2728-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:02:15

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	865487	100.000	146927	5376	1.025	--
总计		865487	100.000	146927			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2729-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 12:06:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:23:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	898556	100.000	152350	5368	1.025	--
总计		898556	100.000	152350			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2730-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-20

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 12:11:00


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:23:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	948298	100.000	160691	5361	1.025	--
总计		948298	100.000	160691			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2731-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:15:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	885701	100.000	150226	5366	1.025	--
总计		885701	100.000	150226			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2732-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:19:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	810716	100.000	137596	5378	1.025	--
总计		810716	100.000	137596			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2733-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 12:24:05
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	950228	100.000	161312	5382	1.025	--
总计		950228	100.000	161312			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2734-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:28:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	1311525	100.000	222529	5375	1.025	--
总计		1311525	100.000	222529			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2735-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-12

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 12:32:52


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	1375481	100.000	233461	5379	1.025	--
总计		1375481	100.000	233461			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2736-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:37:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	1427634	100.000	242392	5376	1.025	--
总计		1427634	100.000	242392			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2737-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-30

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 12:41:36


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	1363909	100.000	231393	5364	1.026	--
总计		1363909	100.000	231393			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2738-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:45:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	1242048	100.000	211138	5379	1.027	--
总计		1242048	100.000	211138			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2739-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 12:50:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	1460769	100.000	247959	5370	1.027	--
总计		1460769	100.000	247959			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2740-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:54:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	1678637	100.000	284892	5379	1.027	--
总计		1678637	100.000	284892			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2741-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 12:59:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	1759920	100.000	298810	5380	1.027	--
总计		1759920	100.000	298810			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2742-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:03:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	1802436	100.000	306119	5359	1.029	--
总计		1802436	100.000	306119			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2743-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:07:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	1748655	100.000	296126	5321	1.029	--
总计		1748655	100.000	296126			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2744-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 13:12:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	1602166	100.000	271392	5320	1.029	--
总计		1602166	100.000	271392			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2745-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 13:16:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	1836257	100.000	310800	5317	1.029	--
总计		1836257	100.000	310800			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2746-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 13:20:55
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2199576	100.000	372106	5312	1.030	--
总计		2199576	100.000	372106			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2747-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 13:25:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2270427	100.000	384248	5313	1.030	--
总计		2270427	100.000	384248			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2748-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 13:29:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2269228	100.000	382346	5279	1.031	--
总计		2269228	100.000	382346			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2749-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 13:34:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:24:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	2286714	100.000	385674	5294	1.031	--
总计		2286714	100.000	385674			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2750-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:38:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2139102	100.000	360750	5290	1.031	--
总计		2139102	100.000	360750			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2751-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:42:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	2301041	100.000	387967	5292	1.031	--
总计		2301041	100.000	387967			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2752-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:47:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:24:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	2617651	100.000	441253	5288	1.031	--
总计		2617651	100.000	441253			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2753-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:51:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2643932	100.000	445440	5280	1.030	--
总计		2643932	100.000	445440			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2754-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 13:55:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2632596	100.000	443572	5281	1.030	--
总计		2632596	100.000	443572			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2755-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 14:00:15
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:25:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2632330	100.000	443633	5286	1.030	--
总计		2632330	100.000	443633			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2756-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 14:04:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:25:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2584394	100.000	435581	5290	1.031	--
总计		2584394	100.000	435581			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2757-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 14:09:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:25:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	2646676	100.000	446670	5301	1.031	--
总计		2646676	100.000	446670			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2758-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:13:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	2764208	100.000	465946	5293	1.031	--
总计		2764208	100.000	465946			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2759-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 14:17:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:25:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2777043	100.000	468146	5288	1.031	--
总计		2777043	100.000	468146			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2760-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:22:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2765399	100.000	467121	5291	1.030	--
总计		2765399	100.000	467121			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2761-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:26:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	2753876	100.000	465335	5294	1.031	--
总计		2753876	100.000	465335			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2762-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:30:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	2751424	100.000	464536	5286	1.031	--
总计		2751424	100.000	464536			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2763-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-52

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 14:35:17


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	2791018	100.000	471891	5297	1.030	--
总计		2791018	100.000	471891			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2764-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:39:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	2854349	100.000	482976	5302	1.030	--
总计		2854349	100.000	482976			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2765-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:44:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	2874483	100.000	486790	5314	1.030	--
总计		2874483	100.000	486790			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2766-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:48:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	2848378	100.000	482801	5322	1.030	--
总计		2848378	100.000	482801			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2767-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:52:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	2842412	100.000	481624	5309	1.030	--
总计		2842412	100.000	481624			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2768-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 14:57:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	2840094	100.000	480903	5308	1.030	--
总计		2840094	100.000	480903			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2769-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:01:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	2865580	100.000	485406	5304	1.031	--
总计		2865580	100.000	485406			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2770-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:05:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	3008861	100.000	494113	4947	1.038	--
总计		3008861	100.000	494113			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2771-2 - zzp-25010701-2p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:10:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	3008657	100.000	494140	4949	1.038	--
总计		3008657	100.000	494140			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010701-2批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2772-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/09 15:14:46
处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2773-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:19:11

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	3015065	100.000	495023	4944	1.038	--
总计		3015065	100.000	495023			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2774-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:23:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	3010877	100.000	494717	4952	1.039	--
总计		3010877	100.000	494717			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2775-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:27:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	3010989	100.000	494624	4951	1.039	--
总计		3010989	100.000	494624			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2776-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:32:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:25:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	3012941	100.000	494789	4948	1.039	--
总计		3012941	100.000	494789			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2777-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:36:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:26:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	3011011	100.000	494376	4945	1.039	--
总计		3011011	100.000	494376			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2778-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:41:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	345330	100.000	58369	5281	1.031	--
总计		345330	100.000	58369			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2779-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:45:35

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	391797	100.000	66220	5273	1.031	--
总计		391797	100.000	66220			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2780-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 15:49:58
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	341238	100.000	57785	5295	1.032	--
总计		341238	100.000	57785			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2781-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 15:54:21
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	324321	100.000	54959	5302	1.031	--
总计		324321	100.000	54959			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2782-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 15:58:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:26:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	290515	100.000	49247	5298	1.031	--
总计		290515	100.000	49247			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2783-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 16:03:07
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	326168	100.000	55255	5301	1.032	--
总计		326168	100.000	55255			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2784-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-2

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/09 16:07:30


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	881196	100.000	148892	5275	1.032	--
总计		881196	100.000	148892			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2785-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 16:11:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	984427	100.000	166480	5282	1.032	--
总计		984427	100.000	166480			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2786-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:16:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:26:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	865077	100.000	146406	5290	1.032	--
总计		865077	100.000	146406			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2787-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 16:20:40
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	879600	100.000	148770	5281	1.033	--
总计		879600	100.000	148770			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2788-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:25:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:26:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	802753	100.000	135839	5284	1.032	--
总计		802753	100.000	135839			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2789-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:29:26

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	874564	100.000	148045	5290	1.031	--
总计		874564	100.000	148045			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2790-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:33:50

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/10 09:26:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	1355083	100.000	229232	5284	1.033	--
总计		1355083	100.000	229232			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2791-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:38:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:26:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	1464274	100.000	247315	5264	1.033	--
总计		1464274	100.000	247315			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2792-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:42:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:26:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	1300155	100.000	219546	5261	1.033	--
总计		1300155	100.000	219546			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2793-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:47:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:26:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	1384057	100.000	233729	5253	1.034	--
总计		1384057	100.000	233729			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2794-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 16:51:23

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/10 09:26:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	1241022	100.000	209244	5243	1.034	--
总计		1241022	100.000	209244			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2795-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 16:55:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	1365286	100.000	230325	5250	1.033	--
总计		1365286	100.000	230325			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2796-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 17:00:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	1763965	100.000	297905	5252	1.034	--
总计		1763965	100.000	297905			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2797-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 17:04:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	1815483	100.000	306514	5245	1.034	--
总计		1815483	100.000	306514			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2798-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 17:08:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:26:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	1680219	100.000	283735	5247	1.034	--
总计		1680219	100.000	283735			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2799-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 17:13:21
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	1775928	100.000	299709	5240	1.034	--
总计		1775928	100.000	299709			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2800-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 17:17:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	1606800	100.000	271434	5249	1.034	--
总计		1606800	100.000	271434			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2801-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:22:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	1734447	100.000	293035	5254	1.034	--
总计		1734447	100.000	293035			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2802-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:26:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2284126	100.000	385502	5245	1.035	--
总计		2284126	100.000	385502			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2803-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 17:30:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2270458	100.000	383197	5248	1.035	--
总计		2270458	100.000	383197			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2804-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:35:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2201817	100.000	368301	5146	1.036	--
总计		2201817	100.000	368301			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2805-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:39:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2242844	100.000	377909	5226	1.036	--
总计		2242844	100.000	377909			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2806-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:44:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	2121536	100.000	357834	5239	1.035	--
总计		2121536	100.000	357834			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2807-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:48:32

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	2227971	100.000	375263	5223	1.036	--
总计		2227971	100.000	375263			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2808-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:52:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2574915	100.000	433545	5219	1.036	--
总计		2574915	100.000	433545			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2809-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 17:57:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2576508	100.000	433198	5198	1.036	--
总计		2576508	100.000	433198			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2810-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:01:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2534937	100.000	425948	5193	1.036	--
总计		2534937	100.000	425948			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2811-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:06:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2554473	100.000	429130	5189	1.037	--
总计		2554473	100.000	429130			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2812-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:10:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2491544	100.000	418842	5199	1.036	--
总计		2491544	100.000	418842			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2813-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:14:57

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2578028	100.000	430218	5118	1.038	--
总计		2578028	100.000	430218			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2814-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:19:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2685254	100.000	451095	5189	1.037	--
总计		2685254	100.000	451095			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2815-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:23:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2696760	100.000	452482	5180	1.038	--
总计		2696760	100.000	452482			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2816-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:28:09

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	2657662	100.000	445476	5169	1.037	--
总计		2657662	100.000	445476			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

101




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2817-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:32:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	2681265	100.000	448831	5155	1.038	--
总计		2681265	100.000	448831			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2818-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 18:36:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:27:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	2651470	100.000	443756	5155	1.038	--
总计		2651470	100.000	443756			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2819-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:41:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	2708469	100.000	453170	5147	1.039	--
总计		2708469	100.000	453170			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2820-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:45:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	2787243	100.000	466726	5162	1.039	--
总计		2787243	100.000	466726			

图105 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2821-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/09 18:50:08

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:27:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	2787914	100.000	467034	5174	1.038	--
总计		2787914	100.000	467034			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2822-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:54:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:28:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	2768318	100.000	463341	5163	1.038	--
总计		2768318	100.000	463341			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2823-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 18:58:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:28:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	2772519	100.000	464269	5169	1.039	--
总计		2772519	100.000	464269			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2824-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 19:03:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:28:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	2766263	100.000	463057	5164	1.039	--
总计		2766263	100.000	463057			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2825-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 19:07:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:28:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	2799705	100.000	472883	5268	1.040	--
总计		2799705	100.000	472883			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2826-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/09 19:12:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/10 09:28:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.816	2999895	100.000	489471	4908	1.046	--
总计		2999895	100.000	489471			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-194/11-2827-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250109-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/09 19:16:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:28:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.816	2999327	100.000	489190	4909	1.046	--
总计		2999327	100.000	489190			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2