




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-397-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:23:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-398-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:26:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	193891	100.000	44809	1748	1.144	--
总计		193891	100.000	44809			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-399-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:29:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	194948	100.000	44839	1737	1.148	--
总计		194948	100.000	44839			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-400-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:32:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	194685	100.000	44774	1750	1.146	--
总计		194685	100.000	44774			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-401-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:35:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	193922	100.000	44639	1741	1.151	--
总计		193922	100.000	44639			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-402-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:38:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	194832	100.000	44911	1743	1.148	--
总计		194832	100.000	44911			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-403-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:40:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	170542	100.000	40199	1889	1.174	--
总计		170542	100.000	40199			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-404-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:43:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	170304	100.000	40173	1870	1.178	--
总计		170304	100.000	40173			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-405-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:46:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	164100	100.000	38667	1873	1.182	--
总计		164100	100.000	38667			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-406-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:49:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	164421	100.000	38724	1878	1.180	--
总计		164421	100.000	38724			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-407-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:52:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	172837	100.000	40679	1883	1.174	--
总计		172837	100.000	40679			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-408-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:55:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	172748	100.000	40478	1867	1.177	--
总计		172748	100.000	40478			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-409-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:58:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	172938	100.000	40878	1882	1.175	--
总计		172938	100.000	40878			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-410-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:00:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	173365	100.000	40724	1869	1.177	--
总计		173365	100.000	40724			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-411-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:03:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	171161	100.000	40317	1868	1.178	--
总计		171161	100.000	40317			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-412-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:06:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	171287	100.000	40223	1864	1.179	--
总计		171287	100.000	40223			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-413-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:09:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	171692	100.000	40221	1868	1.179	--
总计		171692	100.000	40221			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-414-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:12:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	171103	100.000	40450	1867	1.179	--
总计		171103	100.000	40450			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-415-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:15:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	166881	100.000	39207	1861	1.181	--
总计		166881	100.000	39207			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-416-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:18:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	166828	100.000	39207	1875	1.179	--
总计		166828	100.000	39207			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-417-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:20:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	166021	100.000	39014	1854	1.182	--
总计		166021	100.000	39014			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-418-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:23:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	166336	100.000	39209	1860	1.182	--
总计		166336	100.000	39209			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-419-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:26:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	176236	100.000	41360	1864	1.179	--
总计		176236	100.000	41360			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-420-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:29:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	174974	100.000	41431	1862	1.178	--
总计		174974	100.000	41431			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-421-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:32:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	172558	100.000	40778	1865	1.180	--
总计		172558	100.000	40778			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-422-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:35:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	171973	100.000	40624	1877	1.178	--
总计		171973	100.000	40624			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-423-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:37:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	177795	100.000	42206	1876	1.175	--
总计		177795	100.000	42206			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-424-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:40:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	177765	100.000	42133	1884	1.177	--
总计		177765	100.000	42133			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-425-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:43:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	166344	100.000	39358	1872	1.181	--
总计		166344	100.000	39358			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-426-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:46:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	166520	100.000	39128	1858	1.184	--
总计		166520	100.000	39128			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-427-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:49:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	169905	100.000	40074	1869	1.182	--
总计		169905	100.000	40074			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-428-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:52:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	171149	100.000	40443	1875	1.180	--
总计		171149	100.000	40443			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-429-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:55:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	170601	100.000	40082	1867	1.181	--
总计		170601	100.000	40082			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-430-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:57:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	170138	100.000	40109	1865	1.182	--
总计		170138	100.000	40109			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-431-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:00:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	165410	100.000	39312	1882	1.180	--
总计		165410	100.000	39312			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-432-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:03:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	166521	100.000	39194	1864	1.184	--
总计		166521	100.000	39194			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-433-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:06:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	167691	100.000	39585	1860	1.183	--
总计		167691	100.000	39585			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-434-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:09:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	167993	100.000	39677	1859	1.183	--
总计		167993	100.000	39677			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-435-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:12:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	172054	100.000	40550	1863	1.182	--
总计		172054	100.000	40550			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-436-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:15:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	172295	100.000	40699	1860	1.181	--
总计		172295	100.000	40699			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-437-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:17:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	164761	100.000	39081	1866	1.183	--
总计		164761	100.000	39081			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-438-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:20:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	165631	100.000	38994	1860	1.185	--
总计		165631	100.000	38994			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-439-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:23:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	195442	100.000	44957	1738	1.156	--
总计		195442	100.000	44957			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-440-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:26:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	193916	100.000	44632	1735	1.157	--
总计		193916	100.000	44632			