



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-397-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/08 11:23:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-398-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 11:26:42
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	193891	100.000	44809	1748	1.144	--
总计		193891	100.000	44809			

图2 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-399-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:29:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	194948	100.000	44839	1737	1.148	--
总计		194948	100.000	44839			

图3 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-400-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 11:32:26
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	194685	100.000	44774	1750	1.146	--
总计		194685	100.000	44774			

图4 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质
对照品溶液-1-3



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-401-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/08 11:35:17

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	193922	100.000	44639	1741	1.151	--
总计		193922	100.000	44639			

图5 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-402-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 11:38:08
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	194832	100.000	44911	1743	1.148	--
总计		194832	100.000	44911			

图6 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-403-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 11:40:59
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	170542	100.000	40199	1889	1.174	--
总计		170542	100.000	40199			

图7 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-404-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 11:43:51
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	170304	100.000	40173	1870	1.178	--
总计		170304	100.000	40173			

图8 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片1
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-405-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:46:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	164100	100.000	38667	1873	1.182	--
总计		164100	100.000	38667			

图9 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-406-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:49:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	164421	100.000	38724	1878	1.180	--
总计		164421	100.000	38724			

图10 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片2
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-407-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:52:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	172837	100.000	40679	1883	1.174	--
总计		172837	100.000	40679			

图11 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-408-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 11:55:13
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	172748	100.000	40478	1867	1.177	--
总计		172748	100.000	40478			

图12 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片3
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-409-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:58:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	172938	100.000	40878	1882	1.175	--
总计		172938	100.000	40878			

图13 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-410-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:00:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	173365	100.000	40724	1869	1.177	--
总计		173365	100.000	40724			

图14 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片4
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-411-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:03:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	171161	100.000	40317	1868	1.178	--
总计		171161	100.000	40317			

图15 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-412-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/08 12:06:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	171287	100.000	40223	1864	1.179	--
总计		171287	100.000	40223			

图16 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片5
供试品溶液-2



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-413-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/08 12:09:28

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:28:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	171692	100.000	40221	1868	1.179	--
总计		171692	100.000	40221			

图17 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片6
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-414-2 - zzp-24122701p-rcd-pH3.8jz-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/08 12:12:20

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	171103	100.000	40450	1867	1.179	--
总计		171103	100.000	40450			

图18 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(24122701批)-pH3.8介质-片6
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-415-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:15:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	166881	100.000	39207	1861	1.181	--
总计		166881	100.000	39207			

图19 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-416-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 12:18:02
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	166828	100.000	39207	1875	1.179	--
总计		166828	100.000	39207			

图20 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片1
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-417-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:20:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	166021	100.000	39014	1854	1.182	--
总计		166021	100.000	39014			

图21 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-418-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 12:23:43
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	166336	100.000	39209	1860	1.182	--
总计		166336	100.000	39209			

图22 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片2
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-419-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:26:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	176236	100.000	41360	1864	1.179	--
总计		176236	100.000	41360			

图23 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-420-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/08 12:29:25

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	174974	100.000	41431	1862	1.178	--
总计		174974	100.000	41431			

图24 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片3
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-421-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:32:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	172558	100.000	40778	1865	1.180	--
总计		172558	100.000	40778			

图25 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-422-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:35:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	171973	100.000	40624	1877	1.178	--
总计		171973	100.000	40624			

图26 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片4
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-423-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:37:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	177795	100.000	42206	1876	1.175	--
总计		177795	100.000	42206			

图27 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-424-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 12:40:49
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	177765	100.000	42133	1884	1.177	--
总计		177765	100.000	42133			

图28 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片5
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-425-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:43:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	166344	100.000	39358	1872	1.181	--
总计		166344	100.000	39358			

图29 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片6
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-426-2 - zzp-25010301p-rcd-pH3.8jz-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/08 12:46:31

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	166520	100.000	39128	1858	1.184	--
总计		166520	100.000	39128			

图30 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010301批)-pH3.8介质-片6
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-427-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:49:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	169905	100.000	40074	1869	1.182	--
总计		169905	100.000	40074			

图31 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-428-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 12:52:13
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	171149	100.000	40443	1875	1.180	--
总计		171149	100.000	40443			

图32 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片1
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-429-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 12:55:04
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	170601	100.000	40082	1867	1.181	--
总计		170601	100.000	40082			

图33 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-430-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 12:57:55
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	170138	100.000	40109	1865	1.182	--
总计		170138	100.000	40109			

图34 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片2
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-431-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 13:00:46
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	165410	100.000	39312	1882	1.180	--
总计		165410	100.000	39312			

图35 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-432-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:03:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	166521	100.000	39194	1864	1.184	--
总计		166521	100.000	39194			

图36 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片3
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-433-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 13:06:28
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	167691	100.000	39585	1860	1.183	--
总计		167691	100.000	39585			

图37 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-434-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 13:09:18
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:29:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	167993	100.000	39677	1859	1.183	--
总计		167993	100.000	39677			

图38 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片4
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-435-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:12:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	172054	100.000	40550	1863	1.182	--
总计		172054	100.000	40550			

图39 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-436-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 13:15:00
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	172295	100.000	40699	1860	1.181	--
总计		172295	100.000	40699			

图40 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片5
供试品溶液-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-437-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 13:17:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	164761	100.000	39081	1866	1.183	--
总计		164761	100.000	39081			

图41 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-438-2 - zzp-25010302p-rcd-pH3.8jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 13:20:41
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	165631	100.000	38994	1860	1.185	--
总计		165631	100.000	38994			

图42 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品(25010302批)-pH3.8介质-片6
供试品溶液-2



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-439-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/08 13:23:33

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	195442	100.000	44957	1738	1.156	--
总计		195442	100.000	44957			

图43 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-5/27-440-2 - zzp-rcd-pH3.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/08 13:26:24
处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:30:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	193916	100.000	44632	1735	1.157	--
总计		193916	100.000	44632			

图44 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品-pH3.8介质
对照品溶液-2-2