




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-488-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 11:24:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:25:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-489-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 11:27:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:25:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	198713	100.000	45615	1746	1.153	--
总计		198713	100.000	45615			

图2 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-490-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 11:30:03
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:25:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	198735	100.000	45659	1748	1.153	--
总计		198735	100.000	45659			

图3 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-491-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 11:32:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:25:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	199327	100.000	45824	1744	1.155	--
总计		199327	100.000	45824			

图4 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-492-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 11:35:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:25:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	198462	100.000	45822	1740	1.154	--
总计		198462	100.000	45822			

图5 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-493-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 11:38:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:25:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	198195	100.000	45684	1740	1.157	--
总计		198195	100.000	45684			

图6 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-494-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 11:41:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:25:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	120861	100.000	27946	1721	1.200	--
总计		120861	100.000	27946			

图7 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-495-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 11:44:22
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:25:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	126741	100.000	29642	1722	1.197	--
总计		126741	100.000	29642			

图8 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-496-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/08 11:47:13

处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	129150	100.000	29920	1715	1.199	--
总计		129150	100.000	29920			

图9 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-497-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 11:50:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	126286	100.000	29394	1713	1.198	--
总计		126286	100.000	29394			

图10 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-498-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 11:52:54
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	122476	100.000	28617	1753	1.192	--
总计		122476	100.000	28617			

图11 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-499-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 11:55:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	125765	100.000	29257	1702	1.198	--
总计		125765	100.000	29257			

图12 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-500-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 11:58:35
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	160664	100.000	37638	1716	1.187	--
总计		160664	100.000	37638			

图13 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-501-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/08 12:01:27

处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	161227	100.000	37990	1747	1.179	--
总计		161227	100.000	37990			

图14 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-502-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:04:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	167399	100.000	39320	1723	1.183	--
总计		167399	100.000	39320			

图15 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-503-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:07:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	165129	100.000	38995	1756	1.176	--
总计		165129	100.000	38995			

图16 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-504-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:10:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	163183	100.000	38533	1751	1.178	--
总计		163183	100.000	38533			

图17 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-505-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:12:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	170996	100.000	40091	1718	1.183	--
总计		170996	100.000	40091			

图18 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-506-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:15:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	178183	100.000	41744	1717	1.182	--
总计		178183	100.000	41744			

图19 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-507-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:18:32
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	178600	100.000	42190	1747	1.174	--
总计		178600	100.000	42190			

图20 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-508-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:21:23
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	183525	100.000	43048	1714	1.178	--
总计		183525	100.000	43048			

图21 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-509-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:24:14
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	183321	100.000	42984	1719	1.178	--
总计		183321	100.000	42984			

图22 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-510-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:27:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	180225	100.000	42555	1752	1.173	--
总计		180225	100.000	42555			

图23 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-511-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:29:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	183160	100.000	42895	1715	1.179	--
总计		183160	100.000	42895			

图24 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-512-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:32:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	187469	100.000	43979	1717	1.179	--
总计		187469	100.000	43979			

图25 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-513-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:35:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	187728	100.000	44367	1746	1.170	--
总计		187728	100.000	44367			

图26 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-514-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:38:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	191414	100.000	44857	1714	1.176	--
总计		191414	100.000	44857			

图27 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-515-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:41:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	191964	100.000	44933	1711	1.176	--
总计		191964	100.000	44933			

图28 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-516-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:44:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:26:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	190055	100.000	44475	1711	1.178	--
总计		190055	100.000	44475			

图29 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-517-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 12:47:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	192490	100.000	45019	1711	1.175	--
总计		192490	100.000	45019			

图30 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-518-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:49:54
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	195085	100.000	45680	1708	1.175	--
总计		195085	100.000	45680			

图31 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-519-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:52:46
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	195755	100.000	46231	1740	1.169	--
总计		195755	100.000	46231			

图32 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-520-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:55:36
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	197613	100.000	46705	1741	1.167	--
总计		197613	100.000	46705			

图33 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-521-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:58:28
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	199892	100.000	46767	1709	1.173	--
总计		199892	100.000	46767			

图34 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-522-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:01:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	197149	100.000	46248	1715	1.175	--
总计		197149	100.000	46248			

图35 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-523-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:04:10
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	199905	100.000	46775	1711	1.172	--
总计		199905	100.000	46775			

图36 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-524-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:07:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	197984	100.000	46453	1722	1.173	--
总计		197984	100.000	46453			

图37 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-525-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:09:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	199152	100.000	46643	1712	1.174	--
总计		199152	100.000	46643			

图38 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-526-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:12:43
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	201360	100.000	47110	1711	1.174	--
总计		201360	100.000	47110			

图39 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-527-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:15:34
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	203616	100.000	47507	1710	1.173	--
总计		203616	100.000	47507			

图40 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-528-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:18:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	200253	100.000	46754	1707	1.173	--
总计		200253	100.000	46754			

图41 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-529-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:21:17
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	203829	100.000	47733	1711	1.172	--
总计		203829	100.000	47733			

图42 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-530-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:24:08
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	199066	100.000	46700	1723	1.172	--
总计		199066	100.000	46700			

图43 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-531-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:26:59
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	200342	100.000	46633	1706	1.176	--
总计		200342	100.000	46633			

图44 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-532-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:29:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	201318	100.000	47585	1740	1.167	--
总计		201318	100.000	47585			

图45 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-533-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:32:40
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	205380	100.000	47926	1708	1.174	--
总计		205380	100.000	47926			

图46 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-534-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:35:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.149	201651	100.000	47096	1703	1.176	--
总计		201651	100.000	47096			

图47 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-535-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:38:23
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	204712	100.000	47765	1708	1.174	--
总计		204712	100.000	47765			

图48 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-536-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:41:16
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:27:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	200084	100.000	46591	1713	1.173	--
总计		200084	100.000	46591			

图49 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-537-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:44:11
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	200849	100.000	46679	1704	1.176	--
总计		200849	100.000	46679			

图50 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-538-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:47:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	201207	100.000	46892	1710	1.177	--
总计		201207	100.000	46892			

图51 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-539-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:49:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	205374	100.000	48001	1710	1.174	--
总计		205374	100.000	48001			

图52 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-540-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:52:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	202013	100.000	46872	1704	1.178	--
总计		202013	100.000	46872			

图53 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-541-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:55:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	204180	100.000	47602	1706	1.179	--
总计		204180	100.000	47602			

图54 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-542-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 13:58:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	199236	100.000	46154	1722	1.161	--
总计		199236	100.000	46154			

图55 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-543-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:01:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	198168	100.000	46007	1722	1.162	--
总计		198168	100.000	46007			

图56 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-544-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:04:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-545-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:07:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	199096	100.000	46251	1741	1.157	--
总计		199096	100.000	46251			

图58 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-546-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:10:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	199012	100.000	46252	1724	1.160	--
总计		199012	100.000	46252			

图59 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-547-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:13:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	198356	100.000	46046	1725	1.162	--
总计		198356	100.000	46046			

图60 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-548-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:15:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	199376	100.000	46381	1740	1.157	--
总计		199376	100.000	46381			

图61 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-549-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:18:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	199411	100.000	46378	1731	1.159	--
总计		199411	100.000	46378			

图62 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-550-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:21:45
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	120727	100.000	28354	1780	1.211	--
总计		120727	100.000	28354			

图63 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-551-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:24:39
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	114564	100.000	26969	1786	1.211	--
总计		114564	100.000	26969			

图64 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-552-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:27:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	123128	100.000	29052	1792	1.205	--
总计		123128	100.000	29052			

图65 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-553-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:30:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	116626	100.000	27404	1780	1.210	--
总计		116626	100.000	27404			

图66 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-554-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:33:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	126036	100.000	29670	1791	1.206	--
总计		126036	100.000	29670			

图67 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-555-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/08 14:36:10

处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	129687	100.000	30572	1795	1.207	--
总计		129687	100.000	30572			

图68 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-556-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:39:05
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	152257	100.000	35881	1799	1.198	--
总计		152257	100.000	35881			

图69 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-557-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/08 14:41:57

处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:28:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	148777	100.000	34974	1790	1.199	--
总计		148777	100.000	34974			

图70 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-558-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:44:51
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	152468	100.000	36056	1799	1.194	--
总计		152468	100.000	36056			

图71 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-559-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:47:45
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	148198	100.000	35069	1798	1.198	--
总计		148198	100.000	35069			

图72 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-560-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:50:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	156208	100.000	36860	1789	1.196	--
总计		156208	100.000	36860			

图73 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-561-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:53:31
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	158330	100.000	37345	1799	1.195	--
总计		158330	100.000	37345			

图74 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-562-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:56:24
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	170094	100.000	40185	1796	1.191	--
总计		170094	100.000	40185			

图75 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-563-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 14:59:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	166402	100.000	39087	1807	1.193	--
总计		166402	100.000	39087			

图76 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-564-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:02:13
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	167517	100.000	39775	1816	1.191	--
总计		167517	100.000	39775			

图77 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-565-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:05:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	166819	100.000	39376	1793	1.192	--
总计		166819	100.000	39376			

图78 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-566-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:07:58
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	171641	100.000	40447	1787	1.191	--
总计		171641	100.000	40447			

图79 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-567-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:10:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	172715	100.000	41044	1814	1.186	--
总计		172715	100.000	41044			

图80 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-568-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:13:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	179591	100.000	42509	1800	1.186	--
总计		179591	100.000	42509			

图81 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-569-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:16:40
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	177421	100.000	41915	1792	1.187	--
总计		177421	100.000	41915			

图82 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-570-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:19:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	176501	100.000	41816	1814	1.188	--
总计		176501	100.000	41816			

图83 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-571-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:22:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	176308	100.000	41815	1809	1.188	--
总计		176308	100.000	41815			

图84 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-572-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:25:20
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	181060	100.000	42732	1795	1.186	--
总计		181060	100.000	42732			

图85 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-573-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:28:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	180620	100.000	42794	1812	1.186	--
总计		180620	100.000	42794			

图86 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-574-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:31:06
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	189428	100.000	44889	1810	1.183	--
总计		189428	100.000	44889			

图87 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-575-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:34:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	189274	100.000	44643	1793	1.185	--
总计		189274	100.000	44643			

图88 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-576-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:36:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	186521	100.000	44244	1815	1.183	--
总计		186521	100.000	44244			

图89 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-577-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:39:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	187521	100.000	44134	1791	1.183	--
总计		187521	100.000	44134			

图90 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-578-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:42:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:29:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	189623	100.000	44813	1806	1.185	--
总计		189623	100.000	44813			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-579-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:45:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	190243	100.000	45007	1806	1.181	--
总计		190243	100.000	45007			

图92 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-580-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:48:29
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	196096	100.000	46121	1796	1.181	--
总计		196096	100.000	46121			

图93 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-581-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:51:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	196579	100.000	46251	1793	1.180	--
总计		196579	100.000	46251			

图94 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-582-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:54:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	192258	100.000	45626	1812	1.180	--
总计		192258	100.000	45626			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-583-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 15:57:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	193785	100.000	45856	1804	1.181	--
总计		193785	100.000	45856			

图96 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-584-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:00:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	195245	100.000	46119	1802	1.181	--
总计		195245	100.000	46119			

图97 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-585-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:02:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	196402	100.000	46496	1804	1.178	--
总计		196402	100.000	46496			

图98 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-586-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:05:51
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	197947	100.000	47016	1810	1.179	--
总计		197947	100.000	47016			

图99 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-587-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:08:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	199434	100.000	47292	1806	1.179	--
总计		199434	100.000	47292			

图100 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-588-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:11:39
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	195557	100.000	46484	1815	1.179	--
总计		195557	100.000	46484			

图101 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-589-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:14:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	196371	100.000	46325	1797	1.179	--
总计		196371	100.000	46325			

图102 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-590-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:17:27
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	198710	100.000	47070	1800	1.178	--
总计		198710	100.000	47070			

图103 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-591-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:20:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	197853	100.000	46829	1808	1.178	--
总计		197853	100.000	46829			

图104 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-592-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:23:15
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	203927	100.000	48168	1802	1.176	--
总计		203927	100.000	48168			

图105 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-593-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:26:09
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	201483	100.000	47930	1817	1.178	--
总计		201483	100.000	47930			

图106 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-594-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:29:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	197411	100.000	46907	1814	1.178	--
总计		197411	100.000	46907			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-595-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:31:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	198331	100.000	46870	1801	1.181	--
总计		198331	100.000	46870			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-596-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:34:50
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	200396	100.000	47443	1800	1.177	--
总计		200396	100.000	47443			

图109 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-597-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:37:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	198345	100.000	47003	1815	1.178	--
总计		198345	100.000	47003			

图110 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-598-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:40:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	197861	100.000	46037	1718	1.162	--
总计		197861	100.000	46037			

图111 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-599-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:43:32
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:30:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	198705	100.000	46235	1735	1.159	--
总计		198705	100.000	46235			

图112 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-600-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/08 16:46:25

处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH3.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-601-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 16:49:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	198354	100.000	45851	1716	1.162	--
总计		198354	100.000	45851			

图114 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-602-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:52:09
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	200185	100.000	46347	1713	1.159	--
总计		200185	100.000	46347			

图115 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-603-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:55:02
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	199028	100.000	46152	1719	1.165	--
总计		199028	100.000	46152			

图116 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-604-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:57:54
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	198076	100.000	46039	1718	1.164	--
总计		198076	100.000	46039			

图117 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-605-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 17:00:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	198714	100.000	46101	1725	1.160	--
总计		198714	100.000	46101			

图118 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-606-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:03:39
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104298	100.000	24714	1820	1.214	--
总计		104298	100.000	24714			

图119 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-607-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:06:30
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	94345	100.000	22334	1807	1.220	--
总计		94345	100.000	22334			

图120 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-608-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:09:22
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	88185	100.000	20688	1802	1.224	--
总计		88185	100.000	20688			

图121 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-609-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:12:14
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	97178	100.000	22903	1819	1.222	--
总计		97178	100.000	22903			

图122 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-610-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:15:06
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	100660	100.000	23687	1805	1.217	--
总计		100660	100.000	23687			

图123 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-611-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:17:58
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	91994	100.000	21759	1814	1.220	--
总计		91994	100.000	21759			


图124 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-612-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 17:20:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	137823	100.000	32722	1815	1.200	--
总计		137823	100.000	32722			

图125 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-613-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:23:41
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	124688	100.000	29609	1819	1.207	--
总计		124688	100.000	29609			

图126 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-614-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:26:33
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	120764	100.000	28823	1832	1.207	--
总计		120764	100.000	28823			

图127 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-615-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:29:24
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	126411	100.000	30020	1825	1.203	--
总计		126411	100.000	30020			

图128 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-616-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:32:17
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	131760	100.000	31138	1809	1.203	--
总计		131760	100.000	31138			

图129 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-617-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:35:08
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	122107	100.000	28910	1824	1.209	--
总计		122107	100.000	28910			

图130 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-618-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 17:38:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	151080	100.000	36043	1829	1.193	--
总计		151080	100.000	36043			

图131 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-619-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:40:53
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	141910	100.000	33765	1823	1.198	--
总计		141910	100.000	33765			

图132 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-620-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:43:45
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	142148	100.000	33892	1825	1.197	--
总计		142148	100.000	33892			

图133 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-621-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 17:46:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:31:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	146540	100.000	34959	1833	1.197	--
总计		146540	100.000	34959			

图134 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-622-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:49:29
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	148073	100.000	35254	1825	1.197	--
总计		148073	100.000	35254			

图135 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-623-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:52:21
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	142435	100.000	33894	1825	1.199	--
总计		142435	100.000	33894			

图136 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-624-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:55:14
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	163085	100.000	38932	1830	1.189	--
总计		163085	100.000	38932			

图137 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-625-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:58:05
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	153807	100.000	36664	1826	1.193	--
总计		153807	100.000	36664			

图138 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-626-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:00:57
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	153216	100.000	36558	1835	1.193	--
总计		153216	100.000	36558			

图139 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-627-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:03:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	158481	100.000	37750	1834	1.193	--
总计		158481	100.000	37750			

图140 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-628-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:06:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	158665	100.000	37798	1827	1.193	--
总计		158665	100.000	37798			

图141 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-629-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:09:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	152755	100.000	36466	1832	1.192	--
总计		152755	100.000	36466			

图142 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-630-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:12:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	173876	100.000	41490	1836	1.185	--
总计		173876	100.000	41490			

图143 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-631-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:15:14
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	166392	100.000	39579	1827	1.191	--
总计		166392	100.000	39579			

图144 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-632-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:18:06
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	170265	100.000	40521	1823	1.188	--
总计		170265	100.000	40521			

图145 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-633-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:20:57
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	172207	100.000	41280	1845	1.187	--
总计		172207	100.000	41280			

图146 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-634-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:23:48
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	171964	100.000	40977	1833	1.186	--
总计		171964	100.000	40977			

图147 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-635-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:26:39
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	168492	100.000	40132	1825	1.188	--
总计		168492	100.000	40132			

图148 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-636-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:29:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	184154	100.000	43997	1834	1.184	--
总计		184154	100.000	43997			

图149 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-637-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:32:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	178371	100.000	42525	1835	1.184	--
总计		178371	100.000	42525			

图150 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-638-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:35:15
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	180441	100.000	43008	1827	1.185	--
总计		180441	100.000	43008			

图151 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-639-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:38:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	183099	100.000	43808	1841	1.182	--
总计		183099	100.000	43808			

图152 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-640-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:40:57
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	180968	100.000	43233	1833	1.182	--
总计		180968	100.000	43233			

图153 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-641-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:43:47
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	178235	100.000	42592	1842	1.184	--
总计		178235	100.000	42592			

图154 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-642-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:46:39
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:32:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	188727	100.000	45162	1837	1.180	--
总计		188727	100.000	45162			

图155 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-643-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:49:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	183967	100.000	43940	1836	1.182	--
总计		183967	100.000	43940			

图156 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-644-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:52:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	186797	100.000	44701	1839	1.180	--
总计		186797	100.000	44701			

图157 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-645-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:55:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	189485	100.000	45408	1848	1.180	--
总计		189485	100.000	45408			

图158 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-646-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 18:58:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	187053	100.000	44702	1835	1.182	--
总计		187053	100.000	44702			

图159 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-647-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:00:54
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	184063	100.000	44085	1850	1.183	--
总计		184063	100.000	44085			

图160 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-648-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 19:03:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	193643	100.000	46437	1851	1.179	--
总计		193643	100.000	46437			

图161 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-649-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:06:39
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	189762	100.000	45378	1838	1.182	--
总计		189762	100.000	45378			

图162 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-650-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:09:31
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	191851	100.000	46029	1848	1.179	--
总计		191851	100.000	46029			

图163 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-651-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:12:23
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	194397	100.000	46589	1854	1.180	--
总计		194397	100.000	46589			

图164 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-652-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 19:15:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	191601	100.000	45711	1842	1.180	--
总计		191601	100.000	45711			

图165 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-653-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:18:07
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	189905	100.000	45316	1840	1.182	--
总计		189905	100.000	45316			

图166 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-654-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 19:20:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	199084	100.000	46285	1720	1.163	--
总计		199084	100.000	46285			

图167 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-6/30-655-2 - zzp-24122701p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250108-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/08 19:23:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/09 10:33:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	198869	100.000	46301	1717	1.163	--
总计		198869	100.000	46301			

图168 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2