



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-234-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:25:01

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:23:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-235-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:28:30

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:23:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.571	21931	100.000	4805	2939	1.378	--
总计		21931	100.000	4805			

图2 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-236-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:31:59

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	22072	100.000	4829	2966	1.391	--
总计		22072	100.000	4829			

图3 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-237-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:35:28

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.571	22093	100.000	4833	2963	1.385	--
总计		22093	100.000	4833			

图4 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-238-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:38:57

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	21933	100.000	4826	2990	1.390	--
总计		21933	100.000	4826			

图5 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-239-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:42:27

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	22068	100.000	4835	2979	1.397	--
总计		22068	100.000	4835			

图6 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-240-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:45:55

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.518	5768	100.000	1339	2897	1.186	--
总计		5768	100.000	1339			

图7 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-241-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:49:23

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.517	6538	100.000	1525	2926	1.201	--
总计		6538	100.000	1525			

图8 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-242-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:52:51

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	6189	100.000	1389	2724	1.178	--
总计		6189	100.000	1389			

图9 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-243-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:56:20

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.517	8676	100.000	1997	2831	1.220	--
总计		8676	100.000	1997			

图10 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-244-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 11:59:48

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	3910	100.000	922	2943	1.132	--
总计		3910	100.000	922			

图11 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-245-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:03:16

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	8415	100.000	1922	2812	1.197	--
总计		8415	100.000	1922			

图12 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-246-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:06:46

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	12088	100.000	2787	2869	1.244	--
总计		12088	100.000	2787			

图13 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-247-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:10:14

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	12621	100.000	2882	2810	1.223	--
总计		12621	100.000	2882			

图14 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30°C
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-248-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-20
: 100 μl
: 2025/01/09 12:13:42
: 2025/01/10 09:24:36
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	12235	100.000	2819	2829	1.232	--
总计		12235	100.000	2819			

图15 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-249-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:17:10

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	13769	100.000	3165	2847	1.239	--
总计		13769	100.000	3165			

图16 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-250-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-38
: 100 μl
: 2025/01/09 12:20:38
: 2025/01/10 09:24:41
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	12586	100.000	2917	2877	1.246	--
总计		12586	100.000	2917			

图17 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-251-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:24:06

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	13242	100.000	3046	2838	1.248	--
总计		13242	100.000	3046			

图18 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-252-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:27:35

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	15529	100.000	3561	2853	1.257	--
总计		15529	100.000	3561			

图19 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-253-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-12
: 100 μl
: 2025/01/09 12:31:04
: 2025/01/10 09:24:50
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	15491	100.000	3580	2888	1.251	--
总计		15491	100.000	3580			

图20 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-254-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:34:32

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	15586	100.000	3585	2869	1.260	--
总计		15586	100.000	3585			

图21 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-255-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:38:01

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:24:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	16089	100.000	3710	2883	1.241	--
总计		16089	100.000	3710			

图22 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-256-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-39
: 100 μl
: 2025/01/09 12:41:29
: 2025/01/10 09:24:58
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	15687	100.000	3620	2896	1.249	--
总计		15687	100.000	3620			

图23 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-257-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-48
: 100 μl
: 2025/01/09 12:44:58
: 2025/01/10 09:25:01
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	15973	100.000	3693	2889	1.247	--
总计		15973	100.000	3693			

图24 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-258-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:48:26

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	17161	100.000	3957	2879	1.254	--
总计		17161	100.000	3957			

图25 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-259-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-13
: 100 μl
: 2025/01/09 12:51:55
: 2025/01/10 09:25:07
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	17096	100.000	3934	2875	1.248	--
总计		17096	100.000	3934			

图26 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-260-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:55:23

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	16797	100.000	3903	2894	1.236	--
总计		16797	100.000	3903			

图27 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-261-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 12:58:51

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	17650	100.000	4082	2903	1.259	--
总计		17650	100.000	4082			

图28 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-262-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-40
: 100 μl
: 2025/01/09 13:02:19
: 2025/01/10 09:25:15
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	16586	100.000	3874	2924	1.248	--
总计		16586	100.000	3874			

图29 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-263-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:05:47

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	16901	100.000	3951	2921	1.242	--
总计		16901	100.000	3951			

图30 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-264-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:09:16

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	18443	100.000	4281	2910	1.255	--
总计		18443	100.000	4281			

图31 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-265-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:12:44

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	17857	100.000	4154	2904	1.252	--
总计		17857	100.000	4154			

图32 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-266-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:16:12

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	16021	100.000	3799	2965	1.235	--
总计		16021	100.000	3799			

图33 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-267-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:19:40

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	18790	100.000	4356	2924	1.256	--
总计		18790	100.000	4356			

图34 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-268-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:23:09

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18195	100.000	4238	2927	1.261	--
总计		18195	100.000	4238			

图35 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-269-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:26:36

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	18427	100.000	4276	2920	1.259	--
总计		18427	100.000	4276			

图36 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-270-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:30:04

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18944	100.000	4425	2942	1.258	--
总计		18944	100.000	4425			

图37 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-271-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:33:32

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18698	100.000	4347	2907	1.254	--
总计		18698	100.000	4347			

图38 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-272-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:37:01

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18847	100.000	4370	2915	1.261	--
总计		18847	100.000	4370			

图39 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-273-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:40:29

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	19510	100.000	4517	2906	1.261	--
总计		19510	100.000	4517			

图40 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-274-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:43:57

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	18808	100.000	4333	2889	1.267	--
总计		18808	100.000	4333			

图41 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-275-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:47:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	19108	100.000	4427	2897	1.258	--
总计		19108	100.000	4427			

图42 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-276-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p1-60min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-7
: 100 μl
: 2025/01/09 13:50:55
: 2025/01/10 09:25:53
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	19436	100.000	4511	2916	1.265	--
总计		19436	100.000	4511			

图43 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-277-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:54:23

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	19185	100.000	4440	2898	1.256	--
总计		19185	100.000	4440			

图44 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-278-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 13:57:51

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:25:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19198	100.000	4450	2913	1.254	--
总计		19198	100.000	4450			

图45 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-279-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:01:19

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19665	100.000	4595	2937	1.242	--
总计		19665	100.000	4595			

图46 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-280-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:04:47

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19374	100.000	4524	2948	1.263	--
总计		19374	100.000	4524			

图47 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-281-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:08:15

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	19371	100.000	4508	2931	1.244	--
总计		19371	100.000	4508			

图48 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-282-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p1-jx.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 1-8
: 100 μl
: 2025/01/09 14:11:44
: 2025/01/10 09:26:09
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19829	100.000	4597	2918	1.253	--
总计		19829	100.000	4597			

图49 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-283-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:15:13

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19507	100.000	4542	2949	1.264	--
总计		19507	100.000	4542			

图50 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-284-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:18:43

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19277	100.000	4479	2928	1.261	--
总计		19277	100.000	4479			

图51 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-285-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:22:13

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19749	100.000	4585	2918	1.258	--
总计		19749	100.000	4585			

图52 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-286-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:25:42

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19165	100.000	4457	2936	1.261	--
总计		19165	100.000	4457			

图53 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-287-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:29:11

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19610	100.000	4570	2941	1.258	--
总计		19610	100.000	4570			

图54 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-288-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:32:40

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	21866	100.000	4875	3064	1.390	--
总计		21866	100.000	4875			

图55 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-289-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:36:10

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	21822	100.000	4851	3072	1.386	--
总计		21822	100.000	4851			

图56 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-290-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:39:40

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-291-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:43:10

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	20928	100.000	4715	3089	1.388	--
总计		20928	100.000	4715			

图58 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-292-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:46:40

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	21014	100.000	4712	3085	1.391	--
总计		21014	100.000	4712			

图59 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-293-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:50:11

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	20925	100.000	4705	3091	1.383	--
总计		20925	100.000	4705			

图60 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-294-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:53:41

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	20907	100.000	4713	3111	1.383	--
总计		20907	100.000	4713			

图61 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-295-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 14:57:11

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	20907	100.000	4694	3083	1.395	--
总计		20907	100.000	4694			

图62 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-296-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:00:40

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	5870	100.000	1363	2915	1.239	--
总计		5870	100.000	1363			

图63 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-297-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-10
: 100 μl
: 2025/01/09 15:04:09
: 2025/01/10 09:26:49
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	5845	100.000	1359	2902	1.224	--
总计		5845	100.000	1359			

图64 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-298-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-19
: 100 μl
: 2025/01/09 15:07:38
: 2025/01/10 09:26:52
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.520	2035	100.000	477	2934	1.108	--
总计		2035	100.000	477			

图65 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-299-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:11:07

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:26:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	3620	100.000	871	3126	1.148	--
总计		3620	100.000	871			

图66 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-300-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-37
: 100 μl
: 2025/01/09 15:14:36
: 2025/01/10 09:26:57
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	2507	100.000	611	3140	1.138	--
总计		2507	100.000	611			

图67 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-301-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:18:06

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	5020	100.000	1207	3037	1.196	--
总计		5020	100.000	1207			

图68 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-302-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:21:35

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	13779	100.000	3188	2924	1.234	--
总计		13779	100.000	3188			

图69 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30°C
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-303-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-11
: 100 μl
: 2025/01/09 15:25:05
: 2025/01/10 09:27:06
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	13022	100.000	3048	2936	1.229	--
总计		13022	100.000	3048			

图70 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-304-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:28:34

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	12385	100.000	2865	2895	1.232	--
总计		12385	100.000	2865			

图71 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-305-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:32:04

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	11608	100.000	2694	2904	1.246	--
总计		11608	100.000	2694			

图72 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-306-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-38
: 100 μl
: 2025/01/09 15:35:33
: 2025/01/10 09:27:14
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	11189	100.000	2618	2944	1.233	--
总计		11189	100.000	2618			

图73 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-307-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:39:02

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	12889	100.000	2993	2913	1.242	--
总计		12889	100.000	2993			

图74 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-308-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-3
: 100 μl
: 2025/01/09 15:42:32
: 2025/01/10 09:27:19
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	16849	100.000	3916	2940	1.248	--
总计		16849	100.000	3916			

图75 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-309-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-12
: 100 μl
: 2025/01/09 15:46:02
: 2025/01/10 09:27:22
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	16481	100.000	3823	2926	1.249	--
总计		16481	100.000	3823			

图76 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-310-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:49:30

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	16338	100.000	3776	2882	1.252	--
总计		16338	100.000	3776			

图77 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-311-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-30
: 100 μl
: 2025/01/09 15:52:59
: 2025/01/10 09:27:28
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	15903	100.000	3682	2882	1.255	--
总计		15903	100.000	3682			

图78 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-312-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:56:29

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	15528	100.000	3596	2891	1.247	--
总计		15528	100.000	3596			

图79 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-313-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 15:59:58

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	15939	100.000	3684	2895	1.258	--
总计		15939	100.000	3684			

图80 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-314-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:03:28

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18697	100.000	4289	2862	1.265	--
总计		18697	100.000	4289			

图81 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-315-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:06:58

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18216	100.000	4159	2839	1.271	--
总计		18216	100.000	4159			

图82 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-316-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:10:27

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18108	100.000	4178	2873	1.263	--
总计		18108	100.000	4178			

图83 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-317-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:13:57

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	17807	100.000	4102	2864	1.280	--
总计		17807	100.000	4102			

图84 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-318-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:17:27

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	17547	100.000	4025	2843	1.258	--
总计		17547	100.000	4025			

图85 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-319-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:20:57

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	17604	100.000	4064	2870	1.260	--
总计		17604	100.000	4064			

图86 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-320-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-5
: 100 μl
: 2025/01/09 16:24:27
: 2025/01/10 09:27:53
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	20150	100.000	4641	2861	1.265	--
总计		20150	100.000	4641			

图87 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-321-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:27:57

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19299	100.000	4422	2846	1.271	--
总计		19299	100.000	4422			

图88 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-322-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:31:26

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:27:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19749	100.000	4560	2882	1.266	--
总计		19749	100.000	4560			

图89 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-323-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-32
: 100 μl
: 2025/01/09 16:34:56
: 2025/01/10 09:28:01
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	20164	100.000	4672	2932	1.264	--
总计		20164	100.000	4672			

图90 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-324-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:38:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19231	100.000	4443	2878	1.260	--
总计		19231	100.000	4443			

图91 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-325-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:41:56

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	19988	100.000	4615	2936	1.265	--
总计		19988	100.000	4615			

图92 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-326-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:45:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	21125	100.000	4927	2948	1.264	--
总计		21125	100.000	4927			

图93 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-327-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:48:56

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20736	100.000	4791	2903	1.257	--
总计		20736	100.000	4791			

图94 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30°C
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-328-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p3-45min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-24
: 100 μl
: 2025/01/09 16:52:26
: 2025/01/10 09:28:14
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20485	100.000	4750	2902	1.258	--
总计		20485	100.000	4750			

图95 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-329-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:55:56

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	20599	100.000	4756	2890	1.245	--
总计		20599	100.000	4756			

图96 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-330-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 16:59:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	20524	100.000	4725	2863	1.259	--
总计		20524	100.000	4725			

图97 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-331-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:02:55

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	20166	100.000	4672	2901	1.262	--
总计		20166	100.000	4672			

图98 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-332-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:06:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	21338	100.000	4954	2909	1.258	--
总计		21338	100.000	4954			

图99 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-333-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:09:55

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	21159	100.000	4846	2842	1.244	--
总计		21159	100.000	4846			

图100 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-334-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:13:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	21228	100.000	4887	2876	1.259	--
总计		21228	100.000	4887			

图101 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-335-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p4-60min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-34
: 100 μl
: 2025/01/09 17:16:55
: 2025/01/10 09:28:33
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	21250	100.000	4886	2877	1.273	--
总计		21250	100.000	4886			

图102 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-336-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p5-60min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 2-43
: 100 μl
: 2025/01/09 17:20:25
: 2025/01/10 09:28:36
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	20734	100.000	4773	2879	1.262	--
总计		20734	100.000	4773			

图103 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-337-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:23:53

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	21146	100.000	4869	2884	1.263	--
总计		21146	100.000	4869			

图104 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-338-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:27:24

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	21580	100.000	4996	2901	1.264	--
总计		21580	100.000	4996			

图105 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-339-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:30:54

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20983	100.000	4868	2912	1.258	--
总计		20983	100.000	4868			

图106 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-340-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:34:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	21416	100.000	4906	2866	1.260	--
总计		21416	100.000	4906			

图107 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-341-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:37:55

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	21106	100.000	4873	2897	1.262	--
总计		21106	100.000	4873			

图108 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-342-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:41:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	21175	100.000	4857	2842	1.232	--
总计		21175	100.000	4857			

图109 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-343-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:44:55

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20628	100.000	4812	2917	1.254	--
总计		20628	100.000	4812			

图110 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-344-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:48:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:28:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	23659	100.000	5306	3102	1.404	--
总计		23659	100.000	5306			

图111 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-345-2 - zzp-25010202p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:51:55

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	23699	100.000	5313	3099	1.410	--
总计		23699	100.000	5313			

图112 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-346-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:55:24

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质
溶剂



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-347-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 17:58:52

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	28857	100.000	6445	3099	1.409	--
总计		28857	100.000	6445			

图114 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-348-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 18:02:20

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	28747	100.000	6443	3092	1.396	--
总计		28747	100.000	6443			

图115 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-349-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 18:05:50

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	28886	100.000	6464	3092	1.412	--
总计		28886	100.000	6464			

图116 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-350-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 18:09:17

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	28859	100.000	6473	3111	1.411	--
总计		28859	100.000	6473			

图117 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-351-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 18:12:46

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	28808	100.000	6463	3102	1.405	--
总计		28808	100.000	6463			

图118 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-352-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-1
: 100 μl
: 2025/01/09 18:16:14
: 2025/01/10 09:29:19
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	4546	100.000	1048	2848	1.072	--
总计		4546	100.000	1048			

图119 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


样品信息

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-353-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-10
: 100 μl
: 2025/01/09 18:19:43
: 2025/01/10 09:29:22
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

色谱图



峰表

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	5233	100.000	1197	2840	1.144	--
总计		5233	100.000	1197			

图120 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-354-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-19
: 100 μl
: 2025/01/09 18:23:10
: 2025/01/10 09:29:25
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	5141	100.000	1171	2831	1.074	--
总计		5141	100.000	1171			

图121 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-355-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-28
: 100 μl
: 2025/01/09 18:26:38
: 2025/01/10 09:29:28
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	6276	100.000	1412	2776	1.155	--
总计		6276	100.000	1412			

图122 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-356-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-37
: 100 μl
: 2025/01/09 18:30:06
: 2025/01/10 09:29:30
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	6968	100.000	1608	2910	1.218	--
总计		6968	100.000	1608			

图123 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-357-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 18:33:34

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	5747	100.000	1304	2776	1.173	--
总计		5747	100.000	1304			

图124 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-358-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 18:37:02

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	11369	100.000	2623	2871	1.215	--
总计		11369	100.000	2623			

图125 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-359-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-11
: 100 μl
: 2025/01/09 18:40:30
: 2025/01/10 09:29:39
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	11683	100.000	2651	2787	1.189	--
总计		11683	100.000	2651			

图126 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-360-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-20
: 100 μl
: 2025/01/09 18:43:57
: 2025/01/10 09:29:42
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	11842	100.000	2720	2864	1.217	--
总计		11842	100.000	2720			

图127 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-361-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 18:47:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	12361	100.000	2834	2869	1.231	--
总计		12361	100.000	2834			

图128 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-362-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 18:50:53

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	12888	100.000	2919	2788	1.205	--
总计		12888	100.000	2919			

图129 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-363-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-47
: 100 μl
: 2025/01/09 18:54:21
: 2025/01/10 09:29:50
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	12065	100.000	2767	2835	1.229	--
总计		12065	100.000	2767			

图130 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-364-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-3
: 100 μl
: 2025/01/09 18:57:49
: 2025/01/10 09:29:52
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	14536	100.000	3375	2918	1.254	--
总计		14536	100.000	3375			

图131 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-365-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:01:17

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:29:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	15240	100.000	3501	2881	1.241	--
总计		15240	100.000	3501			

图132 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-366-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-21
: 100 μl
: 2025/01/09 19:04:45
: 2025/01/10 09:29:58
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	15213	100.000	3444	2791	1.219	--
总计		15213	100.000	3444			

图133 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-367-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-30
: 100 μl
: 2025/01/09 19:08:12
: 2025/01/10 09:30:00
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	15256	100.000	3545	2937	1.266	--
总计		15256	100.000	3545			

图134 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-368-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-39
: 100 μl
: 2025/01/09 19:11:40
: 2025/01/10 09:30:03
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	15809	100.000	3630	2888	1.259	--
总计		15809	100.000	3630			

图135 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-369-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-48
: 100 μl
: 2025/01/09 19:15:08
: 2025/01/10 09:30:06
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	15515	100.000	3540	2831	1.217	--
总计		15515	100.000	3540			

图136 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-370-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-4
: 100 μl
: 2025/01/09 19:18:36
: 2025/01/10 09:30:09
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	16922	100.000	3932	2926	1.238	--
总计		16922	100.000	3932			

图137 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-371-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:22:04

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	17174	100.000	3955	2895	1.248	--
总计		17174	100.000	3955			

图138 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-372-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:25:30

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	16847	100.000	3876	2890	1.241	--
总计		16847	100.000	3876			

图139 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-373-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:28:59

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	17087	100.000	3969	2936	1.262	--
总计		17087	100.000	3969			

图140 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-374-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:32:26

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	17391	100.000	4038	2948	1.269	--
总计		17391	100.000	4038			

图141 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-375-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-49
: 100 μl
: 2025/01/09 19:35:53
: 2025/01/10 09:30:22
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	17116	100.000	3940	2886	1.238	--
总计		17116	100.000	3940			

图142 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-376-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:39:22

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18744	100.000	4353	2938	1.259	--
总计		18744	100.000	4353			

图143 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-377-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:42:48

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	18947	100.000	4353	2890	1.241	--
总计		18947	100.000	4353			

图144 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-378-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:46:17

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	17846	100.000	4162	2949	1.245	--
总计		17846	100.000	4162			

图145 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-379-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:49:43

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18761	100.000	4338	2916	1.247	--
总计		18761	100.000	4338			

图146 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-380-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:53:11

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18555	100.000	4325	2954	1.261	--
总计		18555	100.000	4325			

图147 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-381-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 19:56:38

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	19100	100.000	4394	2902	1.243	--
总计		19100	100.000	4394			

图148 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-382-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:00:06

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	19890	100.000	4655	2993	1.260	--
总计		19890	100.000	4655			

图149 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-383-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:03:33

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	19823	100.000	4556	2877	1.263	--
总计		19823	100.000	4556			

图150 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-384-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:07:01

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	18997	100.000	4448	2973	1.243	--
总计		18997	100.000	4448			

图151 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-385-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p4-45min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-33
: 100 μl
: 2025/01/09 20:10:29
: 2025/01/10 09:30:50
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19591	100.000	4623	3040	1.275	--
总计		19591	100.000	4623			

图152 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-386-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p5-45min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-42
: 100 μl
: 2025/01/09 20:13:56
: 2025/01/10 09:30:53
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19883	100.000	4631	2950	1.252	--
总计		19883	100.000	4631			

图153 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-387-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:17:23

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	19854	100.000	4653	2988	1.253	--
总计		19854	100.000	4653			

图154 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-388-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:20:50

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:30:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20545	100.000	4773	2958	1.260	--
总计		20545	100.000	4773			

图155 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-389-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:24:18

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20244	100.000	4722	2983	1.261	--
总计		20244	100.000	4722			

图156 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-390-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:27:47

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	19544	100.000	4560	2979	1.256	--
总计		19544	100.000	4560			

图157 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-391-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:31:13

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20476	100.000	4774	2974	1.256	--
总计		20476	100.000	4774			

图158 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-392-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:34:40

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20188	100.000	4765	3019	1.258	--
总计		20188	100.000	4765			

图159 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-393-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:38:08

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	19825	100.000	4659	3027	1.275	--
总计		19825	100.000	4659			

图160 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 18-6/18-394-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-jx.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb
: 3-8
: 100 μl
: 2025/01/09 20:41:37
: 2025/01/10 09:31:16
: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20331	100.000	4778	3013	1.274	--
总计		20331	100.000	4778			

图161 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-395-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:45:04

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20455	100.000	4794	3005	1.263	--
总计		20455	100.000	4794			

图162 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-396-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:48:33

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	19498	100.000	4571	3014	1.275	--
总计		19498	100.000	4571			

图163 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-397-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:52:01

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20197	100.000	4767	3036	1.275	--
总计		20197	100.000	4767			

图164 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-398-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:55:29

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	20543	100.000	4825	3014	1.268	--
总计		20543	100.000	4825			

图165 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-399-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 20:58:57

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	20357	100.000	4801	3029	1.273	--
总计		20357	100.000	4801			

图166 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-400-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 21:02:25

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	25002	100.000	5646	3200	1.396	--
总计		25002	100.000	5646			

图167 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 18-6/18-401-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250109-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/09 21:05:53

处理时间(V2) : 2025/01/10 09:31:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	24906	100.000	5636	3197	1.397	--
总计		24906	100.000	5636			

图168 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122801批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2