




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-555-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 10:55:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-556-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 10:58:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	194502	100.000	43971	1769	1.146	--
总计		194502	100.000	43971			

图2 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-557-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:01:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	194816	100.000	44020	1765	1.147	--
总计		194816	100.000	44020			

图3 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-558-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:04:30
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	194364	100.000	44014	1771	1.145	--
总计		194364	100.000	44014			

图4 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-559-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:07:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	194954	100.000	44045	1769	1.146	--
总计		194954	100.000	44045			

图5 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-560-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:10:16
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	194687	100.000	44010	1770	1.147	--
总计		194687	100.000	44010			

图6 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-561-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:13:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	111535	100.000	25120	1704	1.187	--
总计		111535	100.000	25120			

图7 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-562-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:16:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	109661	100.000	24727	1707	1.187	--
总计		109661	100.000	24727			

图8 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-563-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:18:52
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	110912	100.000	24988	1713	1.187	--
总计		110912	100.000	24988			

图9 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-564-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:21:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	108621	100.000	24523	1711	1.187	--
总计		108621	100.000	24523			

图10 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-565-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:24:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	112736	100.000	25315	1712	1.187	--
总计		112736	100.000	25315			

图11 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-566-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:27:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	115922	100.000	26120	1711	1.186	--
总计		115922	100.000	26120			

图12 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-567-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:30:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	152264	100.000	34457	1717	1.170	--
总计		152264	100.000	34457			

图13 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-568-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:33:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	150336	100.000	34074	1724	1.168	--
总计		150336	100.000	34074			

图14 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-569-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:36:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	151477	100.000	34223	1715	1.171	--
总计		151477	100.000	34223			

图15 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-570-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:38:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:46:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	148727	100.000	33794	1734	1.166	--
总计		148727	100.000	33794			

图16 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-571-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:41:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	152532	100.000	34467	1715	1.171	--
总计		152532	100.000	34467			

图17 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-572-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:44:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	155713	100.000	35146	1714	1.169	--
总计		155713	100.000	35146			

图18 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-573-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:47:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	170004	100.000	38514	1721	1.163	--
总计		170004	100.000	38514			

图19 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-574-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:50:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	169094	100.000	38291	1720	1.163	--
总计		169094	100.000	38291			

图20 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-575-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:53:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	169960	100.000	38442	1717	1.165	--
总计		169960	100.000	38442			

图21 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-576-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:56:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	167511	100.000	37803	1718	1.166	--
总计		167511	100.000	37803			

图22 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-577-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:59:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	171795	100.000	38769	1713	1.164	--
总计		171795	100.000	38769			

图23 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-578-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:01:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	173720	100.000	39553	1736	1.156	--
总计		173720	100.000	39553			

图24 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-579-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:04:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	179410	100.000	40551	1714	1.160	--
总计		179410	100.000	40551			

图25 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-580-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:07:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	179384	100.000	40500	1716	1.162	--
总计		179384	100.000	40500			

图26 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-581-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:10:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	179349	100.000	40348	1708	1.163	--
总计		179349	100.000	40348			

图27 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-582-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:13:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	178138	100.000	40132	1718	1.162	--
总计		178138	100.000	40132			

图28 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-583-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 12:16:15

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	181792	100.000	41344	1739	1.152	--
总计		181792	100.000	41344			

图29 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-584-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 12:19:07

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	183855	100.000	41502	1717	1.159	--
总计		183855	100.000	41502			

图30 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-585-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:21:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	188989	100.000	42495	1710	1.160	--
总计		188989	100.000	42495			

图31 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-586-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:24:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	189013	100.000	42637	1721	1.159	--
总计		189013	100.000	42637			

图32 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-587-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:27:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	191843	100.000	42988	1709	1.159	--
总计		191843	100.000	42988			

图33 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-588-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:30:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	187555	100.000	42523	1735	1.151	--
总计		187555	100.000	42523			

图34 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-589-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:33:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	191931	100.000	43189	1717	1.157	--
总计		191931	100.000	43189			

图35 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-590-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:36:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	193764	100.000	43510	1714	1.158	--
总计		193764	100.000	43510			

图36 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-591-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:39:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	194197	100.000	43828	1716	1.156	--
总计		194197	100.000	43828			

图37 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-592-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:42:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:47:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	194906	100.000	43921	1716	1.156	--
总计		194906	100.000	43921			

图38 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-593-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:44:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	193884	100.000	43494	1713	1.158	--
总计		193884	100.000	43494			

图39 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-594-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:47:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	193728	100.000	44053	1736	1.150	--
总计		193728	100.000	44053			

图40 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-595-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:50:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	198104	100.000	44553	1715	1.156	--
总计		198104	100.000	44553			

图41 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-596-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:53:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	198493	100.000	44516	1710	1.156	--
总计		198493	100.000	44516			

图42 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-597-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:56:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	195431	100.000	43928	1714	1.156	--
总计		195431	100.000	43928			

图43 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-598-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:59:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	195526	100.000	44028	1721	1.155	--
总计		195526	100.000	44028			

图44 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-599-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:02:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	195876	100.000	44133	1716	1.159	--
总计		195876	100.000	44133			

图45 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-600-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:05:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	195455	100.000	43944	1718	1.156	--
总计		195455	100.000	43944			

图46 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-601-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:07:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	199289	100.000	44715	1712	1.157	--
总计		199289	100.000	44715			

图47 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-602-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:10:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	199639	100.000	44891	1707	1.158	--
总计		199639	100.000	44891			

图48 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-603-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:13:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	198152	100.000	44578	1711	1.158	--
总计		198152	100.000	44578			

图49 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-604-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:16:31
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	196829	100.000	44266	1711	1.157	--
总计		196829	100.000	44266			

图50 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-605-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:19:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	196291	100.000	44236	1717	1.157	--
总计		196291	100.000	44236			

图51 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-606-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:22:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	196153	100.000	44108	1709	1.159	--
总计		196153	100.000	44108			

图52 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-607-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:25:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	199318	100.000	44980	1710	1.157	--
总计		199318	100.000	44980			

图53 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-608-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:28:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	199838	100.000	44937	1711	1.159	--
总计		199838	100.000	44937			

图54 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-609-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:30:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	194075	100.000	43795	1759	1.148	--
总计		194075	100.000	43795			

图55 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-610-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:33:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	194536	100.000	43881	1763	1.147	--
总计		194536	100.000	43881			

图56 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-611-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:36:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	3761	100.000	825	1634	1.213	--
总计		3761	100.000	825			

图57 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-612-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:39:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	194106	100.000	43790	1758	1.148	--
总计		194106	100.000	43790			

图58 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-613-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:42:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.215	194412	100.000	44003	1761	1.148	--
总计		194412	100.000	44003			

图59 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-614-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:45:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:48:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	194690	100.000	43804	1763	1.148	--
总计		194690	100.000	43804			

图60 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-615-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:48:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	194873	100.000	43898	1764	1.146	--
总计		194873	100.000	43898			

图61 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-616-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:51:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	195111	100.000	43941	1761	1.149	--
总计		195111	100.000	43941			

图62 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-617-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:54:07
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	120980	100.000	27321	1702	1.185	--
总计		120980	100.000	27321			

图63 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-618-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:57:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	110881	100.000	25087	1703	1.187	--
总计		110881	100.000	25087			

图64 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-619-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:59:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	113455	100.000	25682	1703	1.187	--
总计		113455	100.000	25682			

图65 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-620-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:02:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	113773	100.000	25740	1706	1.188	--
总计		113773	100.000	25740			

图66 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-621-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:05:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	114493	100.000	25847	1698	1.187	--
总计		114493	100.000	25847			

图67 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-622-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:08:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	106120	100.000	23926	1702	1.191	--
总计		106120	100.000	23926			

图68 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-623-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:11:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	160136	100.000	36065	1712	1.170	--
总计		160136	100.000	36065			

图69 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-624-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:14:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	151495	100.000	34199	1702	1.174	--
总计		151495	100.000	34199			

图70 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-625-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:17:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	153351	100.000	34557	1717	1.171	--
总计		153351	100.000	34557			

图71 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-626-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:20:07
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	155515	100.000	35194	1707	1.171	--
总计		155515	100.000	35194			

图72 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-627-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:23:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	154992	100.000	34893	1706	1.174	--
总计		154992	100.000	34893			

图73 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-628-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:25:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	148291	100.000	33314	1708	1.176	--
总计		148291	100.000	33314			

图74 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-629-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:28:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	178141	100.000	40152	1708	1.165	--
总计		178141	100.000	40152			

图75 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-630-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:31:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	169470	100.000	38302	1704	1.168	--
总计		169470	100.000	38302			

图76 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-631-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:34:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	171069	100.000	38663	1708	1.167	--
总计		171069	100.000	38663			

图77 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-632-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:37:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	172563	100.000	38789	1710	1.167	--
总计		172563	100.000	38789			

图78 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-633-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:40:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	174916	100.000	39518	1712	1.164	--
总计		174916	100.000	39518			

图79 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-634-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:43:13
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	167936	100.000	37853	1712	1.168	--
总计		167936	100.000	37853			

图80 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-635-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:46:06
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	187565	100.000	42344	1708	1.162	--
总计		187565	100.000	42344			

图81 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-636-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:49:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:49:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	179415	100.000	40480	1729	1.158	--
总计		179415	100.000	40480			

图82 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-637-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:51:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	185068	100.000	41726	1706	1.162	--
总计		185068	100.000	41726			

图83 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-638-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:54:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	182404	100.000	41125	1708	1.163	--
总计		182404	100.000	41125			

图84 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-639-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:57:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	183663	100.000	41464	1700	1.163	--
总计		183663	100.000	41464			

图85 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-640-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:00:35
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	178699	100.000	40428	1706	1.164	--
总计		178699	100.000	40428			

图86 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-641-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:03:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	196559	100.000	44267	1707	1.160	--
总计		196559	100.000	44267			

图87 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-642-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:06:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	191534	100.000	43205	1710	1.160	--
总计		191534	100.000	43205			

图88 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-643-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:09:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	189737	100.000	42555	1708	1.161	--
总计		189737	100.000	42555			

图89 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-644-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:12:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	191397	100.000	43095	1714	1.158	--
总计		191397	100.000	43095			

图90 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-645-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:15:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	193505	100.000	43795	1702	1.159	--
总计		193505	100.000	43795			

图91 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-646-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:17:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	192684	100.000	43392	1707	1.159	--
总计		192684	100.000	43392			

图92 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-647-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:20:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	201140	100.000	45454	1708	1.156	--
总计		201140	100.000	45454			

图93 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-648-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:23:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	194619	100.000	43926	1710	1.159	--
总计		194619	100.000	43926			

图94 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-649-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:26:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	195144	100.000	44009	1728	1.151	--
总计		195144	100.000	44009			

图95 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-650-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:29:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	196257	100.000	44427	1717	1.159	--
总计		196257	100.000	44427			

图96 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-651-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:32:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	199844	100.000	45125	1714	1.155	--
总计		199844	100.000	45125			

图97 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-652-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:35:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	195167	100.000	43990	1712	1.158	--
总计		195167	100.000	43990			

图98 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-653-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:38:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	202459	100.000	45433	1710	1.157	--
总计		202459	100.000	45433			

图99 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-654-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:41:08
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	196416	100.000	43967	1706	1.159	--
总计		196416	100.000	43967			

图100 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-655-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:44:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	199727	100.000	45055	1717	1.156	--
总计		199727	100.000	45055			

图101 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-656-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:46:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	197526	100.000	44530	1713	1.156	--
总计		197526	100.000	44530			

图102 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-657-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:49:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	199641	100.000	45239	1736	1.148	--
总计		199641	100.000	45239			

图103 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-658-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:52:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:50:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	195973	100.000	44198	1725	1.154	--
总计		195973	100.000	44198			

图104 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-659-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:55:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	201755	100.000	45388	1718	1.153	--
总计		201755	100.000	45388			

图105 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-660-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:58:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	196446	100.000	44242	1715	1.158	--
总计		196446	100.000	44242			

图106 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-661-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:01:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	196396	100.000	44197	1720	1.157	--
总计		196396	100.000	44197			

图107 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-662-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:04:21
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	197770	100.000	44427	1718	1.154	--
总计		197770	100.000	44427			

图108 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-663-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:07:15
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	200708	100.000	45124	1717	1.153	--
总计		200708	100.000	45124			

图109 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-664-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:10:10
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	200058	100.000	44870	1710	1.157	--
总计		200058	100.000	44870			

图110 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-665-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 16:13:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	195096	100.000	43827	1769	1.148	--
总计		195096	100.000	43827			

图111 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-666-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:16:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	195617	100.000	44287	1769	1.145	--
总计		195617	100.000	44287			

图112 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-667-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 16:18:52

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-668-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 16:21:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	193884	100.000	43782	1774	1.146	--
总计		193884	100.000	43782			

图114 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-669-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:24:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	193814	100.000	43643	1771	1.147	--
总计		193814	100.000	43643			

图115 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-670-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:27:28
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	194141	100.000	43707	1768	1.146	--
总计		194141	100.000	43707			

图116 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-671-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:30:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	193988	100.000	43849	1778	1.144	--
总计		193988	100.000	43849			

图117 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-672-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:33:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	193154	100.000	43440	1773	1.149	--
总计		193154	100.000	43440			

图118 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-673-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:36:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	2987	100.000	717	2199	1.226	--
总计		2987	100.000	717			

图119 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-674-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:38:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	605	100.000	154	2314	1.192	--
总计		605	100.000	154			

图120 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-675-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:41:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	595	100.000	147	2301	1.202	--
总计		595	100.000	147			

图121 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-676-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 16:44:36

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	808	100.000	198	2182	1.180	--
总计		808	100.000	198			

图122 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-677-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:47:28
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图123 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-678-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 16:50:20

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图124 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-679-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 16:53:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:51:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	922	100.000	221	2043	1.218	--
总计		922	100.000	221			

图125 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-680-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 16:56:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1154	100.000	284	2248	1.231	--
总计		1154	100.000	284			

图126 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-681-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:58:55
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1203	100.000	295	2152	1.222	--
总计		1203	100.000	295			

图127 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-682-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 17:01:46

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1424	100.000	349	2226	1.208	--
总计		1424	100.000	349			

图128 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-683-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:04:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	2251	100.000	540	2197	1.224	--
总计		2251	100.000	540			

图129 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-684-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:07:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	947	100.000	230	2190	1.221	--
总计		947	100.000	230			

图130 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-685-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:10:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1039	100.000	259	2259	1.178	--
总计		1039	100.000	259			

图131 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-686-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:13:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1416	100.000	341	2189	1.194	--
总计		1416	100.000	341			

图132 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-687-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:16:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1327	100.000	326	2253	1.236	--
总计		1327	100.000	326			

图133 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-688-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:18:55
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	1561	100.000	379	2213	1.211	--
总计		1561	100.000	379			

图134 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-689-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:21:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1099	100.000	271	2186	1.210	--
总计		1099	100.000	271			

图135 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-690-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:24:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1187	100.000	290	2236	1.221	--
总计		1187	100.000	290			

图136 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-691-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:27:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1043	100.000	256	2273	1.193	--
总计		1043	100.000	256			

图137 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-692-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:30:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1419	100.000	337	2167	1.252	--
总计		1419	100.000	337			

图138 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-693-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:33:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1356	100.000	329	2210	1.221	--
总计		1356	100.000	329			

图139 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-694-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:36:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1510	100.000	360	2172	1.265	--
总计		1510	100.000	360			

图140 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-695-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 17:38:55

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1136	100.000	276	2225	1.192	--
总计		1136	100.000	276			

图141 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-696-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 17:41:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1256	100.000	304	2138	1.223	--
总计		1256	100.000	304			

图142 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-697-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 17:44:38

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1048	100.000	251	2198	1.197	--
总计		1048	100.000	251			

图143 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-698-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:47:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1230	100.000	298	2223	1.192	--
总计		1230	100.000	298			

图144 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-699-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 17:50:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1286	100.000	308	2142	1.187	--
总计		1286	100.000	308			

图145 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-700-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 17:53:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1269	100.000	310	2195	1.241	--
总计		1269	100.000	310			

图146 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-701-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 17:56:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:52:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1065	100.000	259	2240	1.256	--
总计		1065	100.000	259			

图147 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-702-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 17:58:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1229	100.000	293	2164	1.283	--
总计		1229	100.000	293			

图148 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-703-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:01:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	945	100.000	234	2291	1.234	--
总计		945	100.000	234			

图149 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-704-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:04:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1103	100.000	267	2146	1.247	--
总计		1103	100.000	267			

图150 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-705-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 18:07:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	3578	100.000	851	2175	1.265	--
总计		3578	100.000	851			

图151 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-706-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:10:21
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1164	100.000	281	2156	1.245	--
总计		1164	100.000	281			

图152 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-707-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:13:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1057	100.000	257	2190	1.223	--
总计		1057	100.000	257			

图153 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-708-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:16:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1059	100.000	261	2268	1.208	--
总计		1059	100.000	261			

图154 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-709-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 18:18:54

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	945	100.000	233	2155	1.187	--
总计		945	100.000	233			

图155 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-710-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:21:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1014	100.000	256	2281	1.182	--
总计		1014	100.000	256			

图156 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-711-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:24:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1118	100.000	267	2223	1.267	--
总计		1118	100.000	267			

图157 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-712-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:27:28
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	2325	100.000	559	2207	1.225	--
总计		2325	100.000	559			

图158 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-713-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 18:30:19

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	990	100.000	242	2245	1.234	--
总计		990	100.000	242			

图159 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-714-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:33:10
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	1115	100.000	269	2127	1.205	--
总计		1115	100.000	269			

图160 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-715-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 18:36:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	908	100.000	222	2233	1.259	--
总计		908	100.000	222			

图161 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-716-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:38:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	957	100.000	241	2318	1.202	--
总计		957	100.000	241			

图162 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-717-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:41:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1043	100.000	256	2183	1.230	--
总计		1043	100.000	256			

图163 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-718-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:44:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1043	100.000	255	2240	1.235	--
总计		1043	100.000	255			

图164 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-719-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 18:47:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	967	100.000	236	2260	1.206	--
总计		967	100.000	236			

图165 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-720-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 18:50:21
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1037	100.000	253	2191	1.218	--
总计		1037	100.000	253			

图166 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-721-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 18:53:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	194797	100.000	44110	1775	1.145	--
总计		194797	100.000	44110			

图167 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-722-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 18:56:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:53:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	194207	100.000	44029	1775	1.145	--
总计		194207	100.000	44029			

图168 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-723-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 18:58:59

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-724-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:01:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	195022	100.000	44180	1773	1.144	--
总计		195022	100.000	44180			

图170 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-725-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:04:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	195078	100.000	44218	1776	1.144	--
总计		195078	100.000	44218			

图171 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-726-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:07:40
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	194936	100.000	44459	1801	1.140	--
总计		194936	100.000	44459			

图172 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-727-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:10:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	194443	100.000	44169	1785	1.144	--
总计		194443	100.000	44169			

图173 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-728-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:13:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	193754	100.000	44014	1785	1.144	--
总计		193754	100.000	44014			

图174 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-729-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 19:16:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图175 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-730-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 19:19:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图176 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-731-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:22:05
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图177 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-732-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:24:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图178 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-733-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 19:27:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图179 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-734-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:30:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图180 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-735-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 19:33:33

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	933	100.000	228	2156	1.218	--
总计		933	100.000	228			

图181 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-736-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 19:36:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	955	100.000	233	2219	1.164	--
总计		955	100.000	233			

图182 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-737-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:39:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	934	100.000	226	2185	1.192	--
总计		934	100.000	226			

图183 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-738-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:42:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1040	100.000	253	2184	1.180	--
总计		1040	100.000	253			

图184 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-739-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:45:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1077	100.000	258	2175	1.330	--
总计		1077	100.000	258			

图185 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-740-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:47:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	898	100.000	217	2122	1.162	--
总计		898	100.000	217			

图186 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-741-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:50:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1220	100.000	295	2185	1.222	--
总计		1220	100.000	295			

图187 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-742-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:53:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1636	100.000	400	2204	1.240	--
总计		1636	100.000	400			

图188 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-743-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 19:56:31

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1090	100.000	261	2227	1.224	--
总计		1090	100.000	261			

图189 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-744-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 19:59:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:54:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1214	100.000	294	2209	1.223	--
总计		1214	100.000	294			

图190 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-745-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:02:16
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1182	100.000	287	2189	1.209	--
总计		1182	100.000	287			

图191 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-746-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:05:08
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1064	100.000	253	2173	1.301	--
总计		1064	100.000	253			

图192 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-747-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:08:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1236	100.000	298	2176	1.210	--
总计		1236	100.000	298			

图193 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-748-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:10:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	5006	100.000	1202	2190	1.248	--
总计		5006	100.000	1202			

图194 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-749-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 20:13:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1129	100.000	277	2223	1.221	--
总计		1129	100.000	277			

图195 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-750-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:16:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1152	100.000	280	2179	1.230	--
总计		1152	100.000	280			

图196 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-751-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 20:19:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	1275	100.000	304	2224	1.220	--
总计		1275	100.000	304			

图197 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-752-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:22:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1073	100.000	262	2204	1.186	--
总计		1073	100.000	262			

图198 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-753-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:25:18
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	1487	100.000	365	2229	1.205	--
总计		1487	100.000	365			

图199 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-754-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 20:28:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1155	100.000	281	2198	1.242	--
总计		1155	100.000	281			

图200 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-755-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:31:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1066	100.000	258	2174	1.228	--
总计		1066	100.000	258			

图201 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-756-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:33:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1165	100.000	283	2222	1.204	--
总计		1165	100.000	283			

图202 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-757-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 20:36:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1078	100.000	265	2205	1.123	--
总计		1078	100.000	265			

图203 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-758-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:39:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1038	100.000	252	2234	1.198	--
总计		1038	100.000	252			

图204 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-759-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:42:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1156	100.000	278	2213	1.238	--
总计		1156	100.000	278			

图205 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-760-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 20:45:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1133	100.000	272	2083	1.228	--
总计		1133	100.000	272			

图206 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-761-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:48:21
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	1008	100.000	248	2194	1.187	--
总计		1008	100.000	248			

图207 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-762-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:51:14
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1117	100.000	268	2173	1.201	--
总计		1117	100.000	268			

图208 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-763-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 20:54:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1028	100.000	253	2304	1.270	--
总计		1028	100.000	253			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-764-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 20:57:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1009	100.000	244	2238	1.246	--
总计		1009	100.000	244			

图210 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-765-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 20:59:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	1069	100.000	259	2144	1.258	--
总计		1069	100.000	259			

图211 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-766-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 21:02:46

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1057	100.000	257	2186	1.214	--
总计		1057	100.000	257			

图212 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-767-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 21:05:39

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:55:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	2975	100.000	714	2175	1.258	--
总计		2975	100.000	714			

图213 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-768-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 21:08:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1036	100.000	251	2173	1.216	--
总计		1036	100.000	251			

图214 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-769-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 21:11:29

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	965	100.000	242	2344	1.172	--
总计		965	100.000	242			

图215 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-770-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 21:14:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	928	100.000	230	2263	1.130	--
总计		928	100.000	230			

图216 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-771-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 21:17:18
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1076	100.000	256	2168	1.189	--
总计		1076	100.000	256			

图217 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-772-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 21:20:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	1009	100.000	249	2240	1.183	--
总计		1009	100.000	249			

图218 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-773-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 21:23:05
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	1007	100.000	245	2234	1.219	--
总计		1007	100.000	245			

图219 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-774-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 21:26:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	982	100.000	246	2267	1.218	--
总计		982	100.000	246			

图220 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-775-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 21:28:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	982	100.000	239	2064	1.189	--
总计		982	100.000	239			

图221 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-776-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 21:31:50

处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	961	100.000	228	2052	1.169	--
总计		961	100.000	228			

图222 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-777-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 21:34:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	195932	100.000	44389	1776	1.146	--
总计		195932	100.000	44389			

图223 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-8/27-778-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 21:37:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:56:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	194843	100.000	44017	1775	1.146	--
总计		194843	100.000	44017			

图224 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2