




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-509-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 10:56:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-510-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 10:58:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	196892	100.000	42837	1717	1.166	--
总计		196892	100.000	42837			

图2 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-511-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:01:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	196966	100.000	42824	1715	1.166	--
总计		196966	100.000	42824			

图3 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-512-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:04:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	196923	100.000	42820	1712	1.165	--
总计		196923	100.000	42820			

图4 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-513-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:07:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	196893	100.000	42823	1713	1.165	--
总计		196893	100.000	42823			

图5 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-514-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:10:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	197190	100.000	42864	1715	1.166	--
总计		197190	100.000	42864			

图6 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-515-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:13:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	87070	100.000	19664	1871	1.200	--
总计		87070	100.000	19664			

图7 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-516-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:16:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	86072	100.000	19423	1866	1.205	--
总计		86072	100.000	19423			

图8 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-517-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:19:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	84769	100.000	19186	1868	1.195	--
总计		84769	100.000	19186			

图9 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-518-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:21:59
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	93166	100.000	20974	1870	1.199	--
总计		93166	100.000	20974			

图10 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-519-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:24:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	86170	100.000	19470	1870	1.198	--
总计		86170	100.000	19470			

图11 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-520-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:27:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	54727	100.000	12368	1861	1.209	--
总计		54727	100.000	12368			

图12 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-521-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:30:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	116056	100.000	26156	1879	1.193	--
总计		116056	100.000	26156			

图13 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-522-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:33:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	118640	100.000	26754	1878	1.192	--
总计		118640	100.000	26754			

图14 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-523-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:36:19
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:16:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	109818	100.000	24808	1875	1.192	--
总计		109818	100.000	24808			

图15 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-524-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 11:39:11

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	122007	100.000	27482	1878	1.192	--
总计		122007	100.000	27482			

图16 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-525-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:42:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	115314	100.000	26049	1880	1.191	--
总计		115314	100.000	26049			

图17 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-526-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:44:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	116825	100.000	26367	1879	1.191	--
总计		116825	100.000	26367			

图18 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-527-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:47:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	133480	100.000	30051	1882	1.185	--
总计		133480	100.000	30051			

图19 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-528-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:50:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	132415	100.000	29814	1880	1.187	--
总计		132415	100.000	29814			

图20 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-529-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 11:53:31
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	127310	100.000	28691	1882	1.188	--
总计		127310	100.000	28691			

图21 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-530-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 11:56:22

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	139247	100.000	31295	1886	1.182	--
总计		139247	100.000	31295			

图22 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-531-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 11:59:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	133341	100.000	29962	1886	1.187	--
总计		133341	100.000	29962			

图23 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-532-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:02:05
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	124704	100.000	28146	1895	1.188	--
总计		124704	100.000	28146			

图24 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-533-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 12:04:58

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	144692	100.000	32749	1884	1.182	--
总计		144692	100.000	32749			

图25 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-534-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:07:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	145991	100.000	33000	1885	1.181	--
总计		145991	100.000	33000			

图26 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-535-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:10:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	139491	100.000	31539	1882	1.185	--
总计		139491	100.000	31539			

图27 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-536-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:13:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	152207	100.000	34258	1888	1.180	--
总计		152207	100.000	34258			

图28 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-537-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:16:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	145780	100.000	33018	1886	1.179	--
总计		145780	100.000	33018			

图29 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-538-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:19:18
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	145020	100.000	32851	1882	1.181	--
总计		145020	100.000	32851			

图30 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-539-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:22:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	160277	100.000	36249	1885	1.178	--
总计		160277	100.000	36249			

图31 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-540-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:25:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	160522	100.000	36274	1883	1.179	--
总计		160522	100.000	36274			

图32 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-541-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:27:55
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	154352	100.000	34885	1880	1.178	--
总计		154352	100.000	34885			

图33 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-542-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 12:30:47

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	166309	100.000	37602	1884	1.175	--
总计		166309	100.000	37602			

图34 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-543-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:33:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	160896	100.000	36403	1883	1.177	--
总计		160896	100.000	36403			

图35 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-544-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:36:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	159690	100.000	36143	1884	1.176	--
总计		159690	100.000	36143			

图36 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-545-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:39:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	172660	100.000	39062	1887	1.172	--
总计		172660	100.000	39062			

图37 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-546-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:42:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:17:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	173935	100.000	39299	1886	1.173	--
总计		173935	100.000	39299			

图38 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-547-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:45:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	168728	100.000	38144	1885	1.174	--
总计		168728	100.000	38144			

图39 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-548-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:47:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	176813	100.000	39927	1884	1.170	--
总计		176813	100.000	39927			

图40 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-549-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:50:50
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	173123	100.000	39042	1887	1.173	--
总计		173123	100.000	39042			

图41 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-550-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:53:42
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	173846	100.000	39318	1887	1.171	--
总计		173846	100.000	39318			

图42 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-551-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 12:56:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	178011	100.000	40214	1885	1.172	--
总计		178011	100.000	40214			

图43 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-552-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 12:59:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	182432	100.000	41182	1886	1.169	--
总计		182432	100.000	41182			

图44 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-553-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:02:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	176900	100.000	40036	1885	1.170	--
总计		176900	100.000	40036			

图45 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-554-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:05:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	185114	100.000	41809	1887	1.170	--
总计		185114	100.000	41809			

图46 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-555-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:08:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	180756	100.000	40906	1886	1.169	--
总计		180756	100.000	40906			

图47 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-556-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:10:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	184963	100.000	41841	1885	1.168	--
总计		184963	100.000	41841			

图48 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-557-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:13:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	187906	100.000	42608	1886	1.167	--
总计		187906	100.000	42608			

图49 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-558-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:16:42
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	188377	100.000	42731	1881	1.167	--
总计		188377	100.000	42731			

图50 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-559-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:19:35
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	183960	100.000	41795	1883	1.167	--
总计		183960	100.000	41795			

图51 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-560-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:22:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	190760	100.000	43359	1885	1.165	--
总计		190760	100.000	43359			

图52 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-561-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:25:19
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	189432	100.000	43011	1881	1.167	--
总计		189432	100.000	43011			

图53 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-562-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:28:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	190001	100.000	43141	1882	1.167	--
总计		190001	100.000	43141			

图54 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-563-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:31:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	196743	100.000	42700	1709	1.166	--
总计		196743	100.000	42700			

图55 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-564-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:33:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	196553	100.000	42693	1710	1.165	--
总计		196553	100.000	42693			

图56 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性1-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-565-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:36:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-566-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:39:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	197091	100.000	42969	1717	1.166	--
总计		197091	100.000	42969			

图58 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-567-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:42:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	196868	100.000	42940	1719	1.166	--
总计		196868	100.000	42940			

图59 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-568-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:45:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:18:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	197202	100.000	42951	1716	1.166	--
总计		197202	100.000	42951			

图60 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-569-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:48:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	196773	100.000	42798	1715	1.167	--
总计		196773	100.000	42798			

图61 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-570-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 13:51:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	197080	100.000	42806	1713	1.167	--
总计		197080	100.000	42806			

图62 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-571-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:54:13
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	86638	100.000	19600	1860	1.201	--
总计		86638	100.000	19600			

图63 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-572-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 13:57:06
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	90870	100.000	20579	1862	1.196	--
总计		90870	100.000	20579			

图64 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-573-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:00:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	84100	100.000	19002	1862	1.202	--
总计		84100	100.000	19002			

图65 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-574-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:02:52
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	87728	100.000	19837	1864	1.204	--
总计		87728	100.000	19837			

图66 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-575-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:05:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	89753	100.000	20315	1863	1.200	--
总计		89753	100.000	20315			

图67 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-576-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:08:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	92164	100.000	20861	1866	1.200	--
总计		92164	100.000	20861			

图68 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-577-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 14:11:31

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	113886	100.000	25783	1867	1.191	--
总计		113886	100.000	25783			

图69 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-578-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 14:14:24

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	119107	100.000	26980	1871	1.191	--
总计		119107	100.000	26980			

图70 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-579-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:17:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	114725	100.000	25988	1869	1.189	--
总计		114725	100.000	25988			

图71 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-580-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:20:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	115295	100.000	26126	1870	1.189	--
总计		115295	100.000	26126			

图72 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-581-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 14:23:03

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	119081	100.000	27002	1868	1.189	--
总计		119081	100.000	27002			

图73 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-582-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:25:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	119368	100.000	27037	1872	1.191	--
总计		119368	100.000	27037			

图74 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-583-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:28:49
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	134501	100.000	30462	1873	1.187	--
总计		134501	100.000	30462			

图75 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-584-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:31:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	137811	100.000	31237	1876	1.185	--
总计		137811	100.000	31237			

图76 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-585-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:34:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	130710	100.000	29648	1876	1.186	--
总计		130710	100.000	29648			

图77 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-586-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 14:37:30

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	132280	100.000	30015	1877	1.185	--
总计		132280	100.000	30015			

图78 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-587-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:40:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	136863	100.000	31012	1875	1.185	--
总计		136863	100.000	31012			

图79 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-588-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 14:43:16

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	138212	100.000	31327	1877	1.185	--
总计		138212	100.000	31327			

图80 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-589-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:46:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	144521	100.000	32755	1875	1.181	--
总计		144521	100.000	32755			

图81 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-590-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:49:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:19:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	147115	100.000	33353	1873	1.179	--
总计		147115	100.000	33353			

图82 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-591-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:51:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	142786	100.000	32358	1874	1.182	--
总计		142786	100.000	32358			

图83 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-592-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 14:54:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	144797	100.000	32857	1872	1.180	--
总计		144797	100.000	32857			

图84 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-593-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 14:57:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	148823	100.000	33774	1876	1.179	--
总计		148823	100.000	33774			

图85 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-594-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:00:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	149776	100.000	33970	1875	1.180	--
总计		149776	100.000	33970			

图86 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-595-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:03:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	159635	100.000	36224	1878	1.177	--
总计		159635	100.000	36224			

图87 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-596-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:06:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	163126	100.000	37023	1880	1.175	--
总计		163126	100.000	37023			

图88 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-597-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:09:16
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	158143	100.000	35859	1879	1.177	--
总计		158143	100.000	35859			

图89 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-598-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:12:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	163552	100.000	37107	1878	1.174	--
总计		163552	100.000	37107			

图90 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-599-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:15:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	164104	100.000	37189	1878	1.173	--
总计		164104	100.000	37189			

图91 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-600-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/09 15:17:55

处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	162467	100.000	36844	1879	1.173	--
总计		162467	100.000	36844			

图92 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-601-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:20:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	171956	100.000	39035	1879	1.172	--
总计		171956	100.000	39035			

图93 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-602-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:23:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	175702	100.000	39846	1878	1.170	--
总计		175702	100.000	39846			

图94 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-603-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:26:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	170888	100.000	38748	1879	1.171	--
总计		170888	100.000	38748			

图95 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-604-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:29:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	173277	100.000	39273	1877	1.171	--
总计		173277	100.000	39273			

图96 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-605-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:32:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	176940	100.000	39995	1882	1.171	--
总计		176940	100.000	39995			

图97 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-606-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:35:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	169490	100.000	38022	1876	1.188	--
总计		169490	100.000	38022			

图98 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-607-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:38:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	178638	100.000	40534	1881	1.170	--
总计		178638	100.000	40534			

图99 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-608-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:41:05
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	183245	100.000	41498	1880	1.168	--
总计		183245	100.000	41498			

图100 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-609-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:43:59
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	179383	100.000	40629	1881	1.171	--
总计		179383	100.000	40629			

图101 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-610-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:46:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	180359	100.000	40879	1880	1.169	--
总计		180359	100.000	40879			

图102 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-611-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:49:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	184578	100.000	41861	1883	1.166	--
总计		184578	100.000	41861			

图103 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-612-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:52:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:20:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	182684	100.000	41428	1880	1.168	--
总计		182684	100.000	41428			

图104 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-613-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 15:55:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	187186	100.000	42279	1878	1.170	--
总计		187186	100.000	42279			

图105 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-614-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 15:58:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	189222	100.000	42851	1883	1.165	--
总计		189222	100.000	42851			

图106 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-615-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 16:01:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	186932	100.000	42330	1885	1.166	--
总计		186932	100.000	42330			

图107 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-616-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/09 16:04:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	188154	100.000	42601	1884	1.167	--
总计		188154	100.000	42601			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-617-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:07:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	191992	100.000	43431	1885	1.166	--
总计		191992	100.000	43431			

图109 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-618-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:10:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	189161	100.000	42731	1884	1.167	--
总计		189161	100.000	42731			

图110 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-619-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:12:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	197761	100.000	43064	1717	1.164	--
总计		197761	100.000	43064			

图111 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-10/29-620-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/09 16:15:50
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:21:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	197705	100.000	43050	1715	1.164	--
总计		197705	100.000	43050			

图112 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010301批-均一性2-pH4.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2