




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-658-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 10:56:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-659-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 10:59:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	198109	100.000	45884	1703	1.169	--
总计		198109	100.000	45884			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-660-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:01:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	198562	100.000	45963	1713	1.167	--
总计		198562	100.000	45963			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-661-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:04:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	198489	100.000	45785	1700	1.167	--
总计		198489	100.000	45785			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-662-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:07:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	198145	100.000	45701	1714	1.168	--
总计		198145	100.000	45701			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-663-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:10:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	198842	100.000	45937	1700	1.168	--
总计		198842	100.000	45937			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-664-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:13:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	106210	100.000	24950	1766	1.224	--
总计		106210	100.000	24950			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-665-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:16:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	107791	100.000	25152	1775	1.223	--
总计		107791	100.000	25152			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-666-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:19:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	102787	100.000	23942	1764	1.225	--
总计		102787	100.000	23942			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-667-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:22:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	105613	100.000	24750	1768	1.226	--
总计		105613	100.000	24750			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-668-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:24:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	112712	100.000	26531	1770	1.221	--
总计		112712	100.000	26531			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-669-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:27:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	107094	100.000	25158	1772	1.222	--
总计		107094	100.000	25158			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-670-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:30:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	140163	100.000	32979	1786	1.209	--
总计		140163	100.000	32979			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-671-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:33:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	141062	100.000	32893	1781	1.207	--
总计		141062	100.000	32893			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-672-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:36:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	135837	100.000	31828	1779	1.211	--
总计		135837	100.000	31828			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-673-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:39:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	138680	100.000	32536	1780	1.209	--
总计		138680	100.000	32536			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-674-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:42:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	144015	100.000	34001	1789	1.206	--
总计		144015	100.000	34001			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-675-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:45:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	136701	100.000	32160	1777	1.210	--
总计		136701	100.000	32160			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-676-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:47:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	158008	100.000	37295	1782	1.202	--
总计		158008	100.000	37295			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-677-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:50:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:03:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	157120	100.000	37067	1797	1.201	--
总计		157120	100.000	37067			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-678-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:53:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	157055	100.000	37030	1777	1.204	--
总计		157055	100.000	37030			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-679-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:56:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	155971	100.000	36860	1785	1.201	--
总计		155971	100.000	36860			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-680-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 11:59:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	161683	100.000	38031	1788	1.201	--
总计		161683	100.000	38031			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-681-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:02:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	154788	100.000	36474	1780	1.203	--
总计		154788	100.000	36474			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-682-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:05:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	167998	100.000	39794	1781	1.196	--
总计		167998	100.000	39794			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-683-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:08:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	170178	100.000	40127	1782	1.197	--
总计		170178	100.000	40127			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-684-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:10:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	161394	100.000	38186	1793	1.201	--
总计		161394	100.000	38186			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-685-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:13:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	170868	100.000	40234	1779	1.197	--
总计		170868	100.000	40234			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-686-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:16:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	171175	100.000	40541	1783	1.196	--
总计		171175	100.000	40541			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-687-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:19:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	164510	100.000	38959	1780	1.200	--
总计		164510	100.000	38959			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-688-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:22:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	181466	100.000	43178	1796	1.191	--
总计		181466	100.000	43178			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-689-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:25:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	179823	100.000	42585	1782	1.193	--
总计		179823	100.000	42585			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-690-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:28:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	178066	100.000	42243	1784	1.192	--
总计		178066	100.000	42243			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-691-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:30:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	180754	100.000	42800	1782	1.193	--
总计		180754	100.000	42800			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-692-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:33:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	184146	100.000	43672	1790	1.192	--
总计		184146	100.000	43672			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-693-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:36:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	178929	100.000	42430	1785	1.193	--
总计		178929	100.000	42430			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-694-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:39:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	190911	100.000	45188	1785	1.190	--
总计		190911	100.000	45188			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-695-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:42:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	188849	100.000	44712	1792	1.190	--
总计		188849	100.000	44712			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-696-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:45:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	188828	100.000	44799	1787	1.190	--
总计		188828	100.000	44799			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-697-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:48:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	190215	100.000	45029	1783	1.192	--
总计		190215	100.000	45029			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-698-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:50:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	192823	100.000	45698	1784	1.187	--
总计		192823	100.000	45698			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-699-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:53:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:04:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	188961	100.000	44676	1781	1.192	--
总计		188961	100.000	44676			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-700-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:56:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	193187	100.000	45785	1786	1.190	--
总计		193187	100.000	45785			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-701-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 12:59:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	195598	100.000	46365	1785	1.186	--
总计		195598	100.000	46365			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-702-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:02:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	192432	100.000	45811	1797	1.186	--
总计		192432	100.000	45811			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-703-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:05:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	194667	100.000	46149	1787	1.187	--
总计		194667	100.000	46149			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-704-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:08:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	196659	100.000	46641	1784	1.185	--
总计		196659	100.000	46641			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-705-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:11:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	193311	100.000	45888	1785	1.185	--
总计		193311	100.000	45888			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-706-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:13:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	198054	100.000	46960	1785	1.186	--
总计		198054	100.000	46960			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-707-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:16:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	195815	100.000	46446	1786	1.186	--
总计		195815	100.000	46446			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-708-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:19:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	196001	100.000	46501	1784	1.185	--
总计		196001	100.000	46501			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-709-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:22:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	197034	100.000	46769	1787	1.186	--
总计		197034	100.000	46769			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-710-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:25:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	199188	100.000	47384	1795	1.184	--
总计		199188	100.000	47384			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-711-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:28:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	196766	100.000	46644	1781	1.186	--
总计		196766	100.000	46644			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-712-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:31:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	197922	100.000	46004	1702	1.166	--
总计		197922	100.000	46004			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-713-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:34:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	197314	100.000	45437	1693	1.169	--
总计		197314	100.000	45437			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-714-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:37:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-715-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:39:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	197438	100.000	45581	1697	1.168	--
总计		197438	100.000	45581			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-716-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:42:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	197668	100.000	45786	1699	1.167	--
总计		197668	100.000	45786			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-717-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:45:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	197485	100.000	45770	1703	1.167	--
总计		197485	100.000	45770			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-718-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:48:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	197190	100.000	45627	1701	1.168	--
总计		197190	100.000	45627			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-719-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:51:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	197370	100.000	45746	1700	1.167	--
总计		197370	100.000	45746			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-720-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:54:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:05:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	112175	100.000	26381	1763	1.215	--
总计		112175	100.000	26381			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-721-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 13:57:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	109412	100.000	25758	1771	1.220	--
总计		109412	100.000	25758			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-722-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:00:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	109752	100.000	25843	1766	1.217	--
总计		109752	100.000	25843			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-723-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:03:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	108832	100.000	25568	1759	1.221	--
总计		108832	100.000	25568			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-724-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:05:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	112294	100.000	26491	1767	1.217	--
总计		112294	100.000	26491			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-725-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:08:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	115535	100.000	27222	1765	1.215	--
总计		115535	100.000	27222			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-726-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:11:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	144232	100.000	34052	1774	1.207	--
总计		144232	100.000	34052			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-727-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:14:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	144037	100.000	34076	1772	1.204	--
总计		144037	100.000	34076			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-728-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:17:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	142886	100.000	33756	1770	1.204	--
总计		142886	100.000	33756			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-729-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:20:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	141635	100.000	33342	1766	1.208	--
总计		141635	100.000	33342			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-730-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:23:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	144996	100.000	34214	1773	1.206	--
总计		144996	100.000	34214			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-731-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:26:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	149671	100.000	35463	1788	1.204	--
总计		149671	100.000	35463			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-732-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:28:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	160850	100.000	38125	1782	1.200	--
总计		160850	100.000	38125			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-733-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:31:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	161263	100.000	38220	1780	1.199	--
总计		161263	100.000	38220			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-734-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:34:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	160330	100.000	37872	1776	1.201	--
总计		160330	100.000	37872			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-735-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:37:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	157775	100.000	37283	1777	1.201	--
总计		157775	100.000	37283			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-736-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:40:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	161127	100.000	38128	1776	1.198	--
总计		161127	100.000	38128			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-737-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:43:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	165329	100.000	39255	1789	1.196	--
总计		165329	100.000	39255			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-738-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:46:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	170358	100.000	40553	1795	1.193	--
总计		170358	100.000	40553			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-739-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:49:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	172784	100.000	40895	1783	1.196	--
总计		172784	100.000	40895			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-740-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:52:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	170723	100.000	40606	1804	1.195	--
总计		170723	100.000	40606			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-741-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:54:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:06:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	168383	100.000	39882	1784	1.195	--
总计		168383	100.000	39882			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-742-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 14:57:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	175356	100.000	41494	1778	1.192	--
总计		175356	100.000	41494			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-743-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:00:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	175327	100.000	41577	1782	1.194	--
总计		175327	100.000	41577			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-744-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:03:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	183541	100.000	43579	1786	1.191	--
总计		183541	100.000	43579			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-745-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:06:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	184613	100.000	43810	1787	1.192	--
总计		184613	100.000	43810			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-746-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:09:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	182959	100.000	43425	1801	1.193	--
总计		182959	100.000	43425			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-747-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:12:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	181460	100.000	43095	1789	1.191	--
总计		181460	100.000	43095			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-748-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:15:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	182280	100.000	43352	1796	1.190	--
总计		182280	100.000	43352			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-749-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:18:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	187249	100.000	44420	1787	1.190	--
总计		187249	100.000	44420			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-750-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:20:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	192008	100.000	45594	1787	1.186	--
总计		192008	100.000	45594			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-751-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:23:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	192947	100.000	45758	1783	1.188	--
总计		192947	100.000	45758			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-752-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:26:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	192218	100.000	45658	1785	1.186	--
总计		192218	100.000	45658			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-753-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:29:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	191001	100.000	45321	1781	1.188	--
总计		191001	100.000	45321			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-754-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:32:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	191330	100.000	45374	1792	1.188	--
总计		191330	100.000	45374			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-755-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:35:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	195472	100.000	46541	1797	1.183	--
总计		195472	100.000	46541			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-756-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:38:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	196833	100.000	46685	1785	1.185	--
总计		196833	100.000	46685			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-757-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:41:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	198227	100.000	47011	1786	1.186	--
总计		198227	100.000	47011			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-758-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:44:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	196098	100.000	46541	1788	1.186	--
总计		196098	100.000	46541			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-759-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:47:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	195824	100.000	46401	1783	1.187	--
总计		195824	100.000	46401			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-760-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:49:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	197085	100.000	46781	1788	1.186	--
总计		197085	100.000	46781			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-761-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:52:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	198969	100.000	47389	1801	1.183	--
总计		198969	100.000	47389			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-762-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:55:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:07:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	199680	100.000	47310	1785	1.187	--
总计		199680	100.000	47310			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-763-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 15:58:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	200334	100.000	47567	1792	1.185	--
总计		200334	100.000	47567			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-764-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:01:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	197572	100.000	47189	1804	1.184	--
总计		197572	100.000	47189			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-765-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:04:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	197432	100.000	47055	1800	1.184	--
总计		197432	100.000	47055			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-766-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:07:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	196571	100.000	46830	1801	1.185	--
总计		196571	100.000	46830			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-767-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:10:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	201426	100.000	47887	1799	1.183	--
总计		201426	100.000	47887			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-768-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:13:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	197786	100.000	45928	1702	1.166	--
总计		197786	100.000	45928			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-769-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:16:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	197187	100.000	45817	1702	1.166	--
总计		197187	100.000	45817			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-770-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:18:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-771-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:21:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	197885	100.000	46117	1708	1.166	--
总计		197885	100.000	46117			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-772-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:24:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	197862	100.000	46006	1704	1.166	--
总计		197862	100.000	46006			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-773-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:27:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	197740	100.000	46123	1709	1.165	--
总计		197740	100.000	46123			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-774-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:30:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	197635	100.000	46061	1711	1.166	--
总计		197635	100.000	46061			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-775-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:33:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	197266	100.000	45994	1708	1.164	--
总计		197266	100.000	45994			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-776-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:36:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	64921	100.000	15471	2074	1.214	--
总计		64921	100.000	15471			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-777-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:39:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	65561	100.000	15625	2071	1.211	--
总计		65561	100.000	15625			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-778-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:41:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	59079	100.000	14061	2068	1.218	--
总计		59079	100.000	14061			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-779-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:44:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	65389	100.000	15526	2082	1.214	--
总计		65389	100.000	15526			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-780-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:47:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	64570	100.000	15457	2069	1.210	--
总计		64570	100.000	15457			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-781-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:50:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	68453	100.000	16380	2068	1.208	--
总计		68453	100.000	16380			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-782-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:53:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	99808	100.000	23679	2082	1.203	--
总计		99808	100.000	23679			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-783-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:56:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	103177	100.000	24365	2072	1.205	--
总计		103177	100.000	24365			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-784-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 16:58:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:08:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	94501	100.000	22331	2068	1.207	--
总计		94501	100.000	22331			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-785-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:01:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	99669	100.000	23573	2073	1.206	--
总计		99669	100.000	23573			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-786-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:04:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	97510	100.000	23210	2075	1.205	--
总计		97510	100.000	23210			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-787-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:07:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	104320	100.000	24680	2078	1.203	--
总计		104320	100.000	24680			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-788-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:10:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	120893	100.000	28628	2077	1.198	--
总计		120893	100.000	28628			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-789-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:13:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	126016	100.000	29790	2071	1.196	--
总计		126016	100.000	29790			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-790-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:16:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	116745	100.000	27553	2072	1.200	--
总计		116745	100.000	27553			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-791-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:19:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	125266	100.000	29645	2070	1.197	--
总计		125266	100.000	29645			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-792-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:21:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	118801	100.000	28123	2069	1.201	--
总计		118801	100.000	28123			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-793-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:24:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	125989	100.000	29911	2078	1.197	--
总计		125989	100.000	29911			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-794-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:27:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	136242	100.000	32217	2072	1.196	--
总计		136242	100.000	32217			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-795-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:30:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	141290	100.000	33447	2070	1.195	--
总计		141290	100.000	33447			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-796-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:33:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	132286	100.000	31399	2071	1.195	--
总计		132286	100.000	31399			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-797-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:36:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	137273	100.000	32411	2065	1.194	--
总计		137273	100.000	32411			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-798-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:39:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	133867	100.000	31872	2078	1.192	--
总计		133867	100.000	31872			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-799-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:41:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	141650	100.000	33558	2077	1.193	--
总计		141650	100.000	33558			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-800-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:44:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	156674	100.000	37131	2064	1.188	--
总计		156674	100.000	37131			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-801-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:47:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	161047	100.000	38099	2076	1.187	--
总计		161047	100.000	38099			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-802-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:50:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	152584	100.000	36160	2072	1.189	--
总计		152584	100.000	36160			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-803-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:53:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	156842	100.000	37026	2074	1.189	--
总计		156842	100.000	37026			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-804-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:56:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	153767	100.000	36508	2081	1.189	--
总计		153767	100.000	36508			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-805-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 17:59:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	160428	100.000	38249	2080	1.184	--
总计		160428	100.000	38249			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-806-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:01:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:09:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	173593	100.000	41169	2080	1.183	--
总计		173593	100.000	41169			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-807-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:04:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	178140	100.000	42197	2073	1.181	--
总计		178140	100.000	42197			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-808-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:07:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	170506	100.000	40470	2077	1.183	--
总计		170506	100.000	40470			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-809-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:10:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	173668	100.000	41305	2081	1.183	--
总计		173668	100.000	41305			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-810-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:13:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	171577	100.000	40838	2079	1.183	--
总计		171577	100.000	40838			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-811-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:16:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	176940	100.000	42060	2076	1.183	--
总计		176940	100.000	42060			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-812-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:18:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.246	184413	100.000	44045	2085	1.179	--
总计		184413	100.000	44045			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-813-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:21:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	187594	100.000	44699	2080	1.178	--
总计		187594	100.000	44699			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-814-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:24:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	181069	100.000	43159	2084	1.180	--
总计		181069	100.000	43159			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-815-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:27:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	183040	100.000	43625	2081	1.177	--
总计		183040	100.000	43625			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-816-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:30:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	181788	100.000	43263	2077	1.180	--
总计		181788	100.000	43263			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-817-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:33:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	185646	100.000	44371	2083	1.178	--
总计		185646	100.000	44371			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-818-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:36:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.246	191668	100.000	45713	2078	1.175	--
总计		191668	100.000	45713			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-819-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:38:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	193399	100.000	46019	2078	1.177	--
总计		193399	100.000	46019			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-820-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:41:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.246	188416	100.000	44987	2082	1.177	--
总计		188416	100.000	44987			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-821-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:44:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.247	190316	100.000	45437	2080	1.176	--
总计		190316	100.000	45437			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-822-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:47:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	188298	100.000	44894	2080	1.176	--
总计		188298	100.000	44894			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-823-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:50:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.247	192172	100.000	45972	2085	1.176	--
总计		192172	100.000	45972			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-824-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:53:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	197281	100.000	45990	1713	1.166	--
总计		197281	100.000	45990			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-825-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:56:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	197393	100.000	46029	1707	1.164	--
总计		197393	100.000	46029			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-826-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 18:59:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-827-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:01:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:10:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	198339	100.000	46203	1706	1.165	--
总计		198339	100.000	46203			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-828-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:04:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	197931	100.000	46186	1713	1.164	--
总计		197931	100.000	46186			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-829-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:07:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	198028	100.000	46084	1704	1.164	--
总计		198028	100.000	46084			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-830-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:10:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	197485	100.000	46092	1709	1.164	--
总计		197485	100.000	46092			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-831-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:13:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	197591	100.000	46036	1705	1.166	--
总计		197591	100.000	46036			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-832-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:16:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	66539	100.000	15902	2069	1.213	--
总计		66539	100.000	15902			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-833-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:19:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	61221	100.000	14476	2078	1.214	--
总计		61221	100.000	14476			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-834-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:22:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	70212	100.000	16682	2074	1.213	--
总计		70212	100.000	16682			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-835-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:25:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	61435	100.000	14604	2080	1.219	--
总计		61435	100.000	14604			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-836-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:27:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	63260	100.000	15043	2079	1.217	--
总计		63260	100.000	15043			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-837-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:30:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	67879	100.000	16163	2075	1.215	--
总计		67879	100.000	16163			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-838-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:33:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	102032	100.000	24211	2085	1.203	--
总计		102032	100.000	24211			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-839-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:36:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	101069	100.000	23890	2081	1.204	--
总计		101069	100.000	23890			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-840-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:39:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	105707	100.000	24962	2078	1.204	--
总计		105707	100.000	24962			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-841-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:42:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	96189	100.000	22744	2074	1.206	--
总计		96189	100.000	22744			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-842-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:45:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	97337	100.000	23032	2080	1.204	--
总计		97337	100.000	23032			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-843-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:47:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	101490	100.000	23999	2071	1.205	--
总计		101490	100.000	23999			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-844-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:50:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	126216	100.000	30097	2082	1.194	--
总计		126216	100.000	30097			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-845-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:53:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	122861	100.000	29187	2080	1.197	--
总计		122861	100.000	29187			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-846-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:56:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	127335	100.000	30134	2078	1.195	--
总计		127335	100.000	30134			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-847-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 19:59:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	116994	100.000	27689	2078	1.197	--
总计		116994	100.000	27689			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-848-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:02:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	119235	100.000	28425	2085	1.197	--
总计		119235	100.000	28425			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-849-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:05:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:11:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	122857	100.000	29186	2079	1.196	--
总计		122857	100.000	29186			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-850-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:08:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	138687	100.000	32921	2083	1.191	--
总计		138687	100.000	32921			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-851-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:10:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	138173	100.000	32684	2077	1.196	--
总计		138173	100.000	32684			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-852-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:13:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	142156	100.000	33690	2079	1.192	--
总计		142156	100.000	33690			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-853-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:16:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	132658	100.000	31501	2079	1.194	--
总计		132658	100.000	31501			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-854-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:19:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	133641	100.000	31841	2084	1.193	--
总计		133641	100.000	31841			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-855-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:22:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	137452	100.000	32665	2079	1.192	--
总计		137452	100.000	32665			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-856-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:25:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	157337	100.000	37390	2077	1.188	--
总计		157337	100.000	37390			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-857-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:28:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	157478	100.000	37536	2085	1.187	--
总计		157478	100.000	37536			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-858-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:31:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	160891	100.000	38183	2071	1.187	--
总计		160891	100.000	38183			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-859-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:34:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	151959	100.000	35979	2078	1.188	--
总计		151959	100.000	35979			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-860-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:36:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	153140	100.000	36324	2079	1.187	--
总计		153140	100.000	36324			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-861-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:39:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	156447	100.000	37132	2078	1.187	--
总计		156447	100.000	37132			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-862-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:42:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	173655	100.000	41410	2082	1.180	--
总计		173655	100.000	41410			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-863-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:45:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	175830	100.000	41885	2084	1.184	--
总计		175830	100.000	41885			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-864-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:48:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	175389	100.000	41731	2085	1.181	--
总计		175389	100.000	41731			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-865-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:51:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	169490	100.000	40338	2082	1.182	--
总计		169490	100.000	40338			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-866-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:54:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	169727	100.000	40413	2079	1.184	--
总计		169727	100.000	40413			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-867-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:57:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	172832	100.000	41159	2082	1.181	--
总计		172832	100.000	41159			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-868-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 20:59:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	182813	100.000	43626	2085	1.179	--
总计		182813	100.000	43626			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-869-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:02:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	184910	100.000	44088	2083	1.178	--
总计		184910	100.000	44088			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-870-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:05:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.246	184192	100.000	44034	2083	1.180	--
总计		184192	100.000	44034			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-871-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:08:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:12:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	179505	100.000	42869	2086	1.180	--
总计		179505	100.000	42869			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-872-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:11:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	183721	100.000	43860	2085	1.178	--
总计		183721	100.000	43860			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-873-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:14:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	181758	100.000	43317	2083	1.181	--
总计		181758	100.000	43317			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-874-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:17:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	189718	100.000	45247	2083	1.178	--
总计		189718	100.000	45247			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-875-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:20:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	190859	100.000	45617	2083	1.176	--
总计		190859	100.000	45617			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-876-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:23:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	190502	100.000	44959	2097	1.177	--
总计		190502	100.000	44959			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-877-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:25:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	186295	100.000	44444	2086	1.179	--
总计		186295	100.000	44444			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-878-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:28:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	186973	100.000	44500	2079	1.179	--
总计		186973	100.000	44500			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-879-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:31:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.244	188061	100.000	44803	2081	1.177	--
总计		188061	100.000	44803			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-880-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:34:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	199529	100.000	46682	1721	1.163	--
总计		199529	100.000	46682			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 27-9/30-881-2 - zzp-25010301p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250109-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/09 21:37:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/10 09:13:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	199228	100.000	46468	1710	1.163	--
总计		199228	100.000	46468			