




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-462-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:16:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-463-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:19:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105821	100.000	23110	1434	1.198	--
总计		105821	100.000	23110			

图2 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-464-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:23:18
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	105734	100.000	23024	1439	1.198	--
总计		105734	100.000	23024			

图3 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-465-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:26:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105841	100.000	23146	1437	1.196	--
总计		105841	100.000	23146			

图4 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-466-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:30:10
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	106184	100.000	23132	1434	1.197	--
总计		106184	100.000	23132			

图5 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-467-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:33:35
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105943	100.000	23156	1439	1.196	--
总计		105943	100.000	23156			

图6 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-468-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:37:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	95741	100.000	24339	2066	1.170	--
总计		95741	100.000	24339			

图7 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-469-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:40:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	96643	100.000	24546	2038	1.177	--
总计		96643	100.000	24546			

图8 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-470-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:43:50
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	92140	100.000	23590	2050	1.168	--
总计		92140	100.000	23590			

图9 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-471-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:47:14
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	92973	100.000	23767	2048	1.176	--
总计		92973	100.000	23767			

图10 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-472-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:50:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	94309	100.000	24020	2036	1.174	--
总计		94309	100.000	24020			

图11 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-473-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:54:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	92599	100.000	23453	2058	1.172	--
总计		92599	100.000	23453			

图12 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-474-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:57:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	108022	100.000	27308	2060	1.161	--
总计		108022	100.000	27308			

图13 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-475-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:00:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:31:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	107646	100.000	27398	2051	1.168	--
总计		107646	100.000	27398			

图14 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-476-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:04:18
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106362	100.000	27004	2070	1.164	--
总计		106362	100.000	27004			

图15 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-477-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:07:42
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	105128	100.000	26997	2082	1.167	--
总计		105128	100.000	26997			

图16 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-478-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:11:06
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	107316	100.000	27587	2068	1.163	--
总计		107316	100.000	27587			

图17 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-479-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:14:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106277	100.000	27069	2074	1.166	--
总计		106277	100.000	27069			

图18 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-480-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:17:55
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	107478	100.000	27314	2079	1.163	--
总计		107478	100.000	27314			

图19 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-481-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:21:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	108302	100.000	27552	2081	1.169	--
总计		108302	100.000	27552			

图20 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-482-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:24:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	105925	100.000	26998	2091	1.164	--
总计		105925	100.000	26998			

图21 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-483-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:28:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	106439	100.000	27277	2068	1.163	--
总计		106439	100.000	27277			

图22 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-484-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:31:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	108546	100.000	27586	2081	1.162	--
总计		108546	100.000	27586			

图23 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-485-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:35:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	106123	100.000	27110	2071	1.167	--
总计		106123	100.000	27110			

图24 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-486-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:38:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	107803	100.000	27593	2049	1.162	--
总计		107803	100.000	27593			

图25 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-487-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:41:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	109017	100.000	27824	2077	1.162	--
总计		109017	100.000	27824			

图26 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-488-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:45:16
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	105889	100.000	27276	2078	1.162	--
总计		105889	100.000	27276			

图27 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-489-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:48:40
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	106537	100.000	27267	2061	1.163	--
总计		106537	100.000	27267			

图28 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-490-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:52:05
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	108670	100.000	27627	2068	1.165	--
总计		108670	100.000	27627			

图29 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-491-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:55:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	106301	100.000	27202	2066	1.162	--
总计		106301	100.000	27202			

图30 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-492-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:58:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	107615	100.000	27518	2083	1.161	--
总计		107615	100.000	27518			

图31 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-493-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:02:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	108710	100.000	27600	2073	1.164	--
总计		108710	100.000	27600			

图32 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-494-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:05:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	106400	100.000	27034	2079	1.165	--
总计		106400	100.000	27034			

图33 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-495-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:09:05
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	106774	100.000	27412	2061	1.157	--
总计		106774	100.000	27412			

图34 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-496-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:12:30
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	108424	100.000	27576	2083	1.162	--
总计		108424	100.000	27576			

图35 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-497-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:15:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	106506	100.000	27185	2079	1.164	--
总计		106506	100.000	27185			

图36 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-498-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:19:19
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	105203	100.000	23399	1473	1.184	--
总计		105203	100.000	23399			

图37 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-499-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:22:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:32:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.130	104408	100.000	23021	1431	1.196	--
总计		104408	100.000	23021			

图38 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-500-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:26:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-501-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:29:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	105351	100.000	23482	1460	1.179	--
总计		105351	100.000	23482			

图40 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-502-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:33:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.129	104529	100.000	23116	1439	1.192	--
总计		104529	100.000	23116			

图41 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-503-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:36:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	105033	100.000	23035	1442	1.193	--
总计		105033	100.000	23035			

图42 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-504-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:39:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	104809	100.000	23006	1439	1.196	--
总计		104809	100.000	23006			

图43 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-505-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:43:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105625	100.000	23217	1446	1.193	--
总计		105625	100.000	23217			

图44 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-506-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:46:50
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	95413	100.000	24391	2063	1.169	--
总计		95413	100.000	24391			

图45 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-507-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:50:15
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	82013	100.000	20916	2051	1.166	--
总计		82013	100.000	20916			

图46 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-508-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:53:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	92793	100.000	23614	2052	1.171	--
总计		92793	100.000	23614			

图47 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-509-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:57:06
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	85227	100.000	21659	2048	1.175	--
总计		85227	100.000	21659			

图48 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-510-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:00:32
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	88174	100.000	22564	2044	1.170	--
总计		88174	100.000	22564			

图49 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-511-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:03:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	96027	100.000	24585	2046	1.171	--
总计		96027	100.000	24585			

图50 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-512-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:07:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	106304	100.000	27134	2054	1.165	--
总计		106304	100.000	27134			

图51 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-513-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:10:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	104889	100.000	26785	2053	1.161	--
总计		104889	100.000	26785			

图52 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-514-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:14:13
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	104806	100.000	26833	2065	1.161	--
总计		104806	100.000	26833			

图53 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-515-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:17:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	103541	100.000	26429	2065	1.165	--
总计		103541	100.000	26429			

图54 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-516-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:21:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	104538	100.000	26564	2056	1.164	--
总计		104538	100.000	26564			

图55 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-517-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:24:31
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	105099	100.000	27138	2058	1.158	--
总计		105099	100.000	27138			

图56 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-518-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:27:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	104201	100.000	26731	2096	1.163	--
总计		104201	100.000	26731			

图57 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-519-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:31:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	104555	100.000	26915	2086	1.165	--
总计		104555	100.000	26915			

图58 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-520-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:34:52
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	104704	100.000	26598	2053	1.167	--
总计		104704	100.000	26598			

图59 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-521-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:38:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	103892	100.000	26454	2065	1.164	--
总计		103892	100.000	26454			

图60 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-522-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:41:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	104190	100.000	26580	2068	1.163	--
总计		104190	100.000	26580			

图61 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-523-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:45:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:33:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	103301	100.000	26639	2076	1.162	--
总计		103301	100.000	26639			

图62 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-524-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:48:35
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	106643	100.000	27519	2083	1.157	--
总计		106643	100.000	27519			

图63 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-525-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:52:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	103451	100.000	26571	2066	1.158	--
总计		103451	100.000	26571			

图64 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-526-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:55:28
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	103918	100.000	26818	2082	1.158	--
总计		103918	100.000	26818			

图65 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-527-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:58:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	103384	100.000	26683	2083	1.154	--
总计		103384	100.000	26683			

图66 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-528-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:02:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	103771	100.000	26446	2065	1.165	--
总计		103771	100.000	26446			

图67 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-529-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:05:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	103817	100.000	26402	2091	1.162	--
总计		103817	100.000	26402			

图68 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-530-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:09:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	106885	100.000	27530	2073	1.159	--
总计		106885	100.000	27530			

图69 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-531-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:12:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	103722	100.000	26690	2074	1.161	--
总计		103722	100.000	26690			

图70 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-532-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:16:05
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	103725	100.000	26678	2075	1.156	--
总计		103725	100.000	26678			

图71 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-533-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:19:31
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	103368	100.000	26478	2053	1.161	--
总计		103368	100.000	26478			

图72 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-534-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:22:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	104613	100.000	26658	2058	1.162	--
总计		104613	100.000	26658			

图73 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-535-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:26:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	102641	100.000	26135	2061	1.164	--
总计		102641	100.000	26135			

图74 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-536-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:29:49
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	105274	100.000	23297	1445	1.191	--
总计		105274	100.000	23297			

图75 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-537-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:33:16
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	105778	100.000	23164	1436	1.192	--
总计		105778	100.000	23164			

图76 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-538-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:36:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-539-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:40:06
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	105845	100.000	23588	1462	1.182	--
总计		105845	100.000	23588			

图78 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-540-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:43:31
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.130	105093	100.000	23294	1445	1.193	--
总计		105093	100.000	23294			

图79 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-541-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:46:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.130	105216	100.000	23377	1449	1.190	--
总计		105216	100.000	23377			

图80 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-542-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:50:21
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.129	105239	100.000	23365	1449	1.187	--
总计		105239	100.000	23365			

图81 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-543-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:53:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.129	105542	100.000	23386	1446	1.189	--
总计		105542	100.000	23386			

图82 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-544-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:57:10
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	90026	100.000	23289	2059	1.163	--
总计		90026	100.000	23289			

图83 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-545-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:00:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	79354	100.000	20445	2065	1.168	--
总计		79354	100.000	20445			

图84 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-546-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:03:59
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	95151	100.000	24428	2065	1.160	--
总计		95151	100.000	24428			

图85 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-547-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:07:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:34:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	95066	100.000	24328	2076	1.163	--
总计		95066	100.000	24328			

图86 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-548-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:10:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	94987	100.000	24315	2071	1.165	--
总计		94987	100.000	24315			

图87 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-549-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:14:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	91003	100.000	23252	2073	1.168	--
总计		91003	100.000	23252			

图88 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-550-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:17:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	104887	100.000	26648	2058	1.158	--
总计		104887	100.000	26648			

图89 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-551-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50µl
进样时间: 2025/01/09 16:21:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	104065	100.000	26826	2075	1.161	--
总计		104065	100.000	26826			

图90 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-552-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:24:24
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	105147	100.000	26973	2064	1.155	--
总计		105147	100.000	26973			

图91 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-553-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:27:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	103268	100.000	26372	2066	1.164	--
总计		103268	100.000	26372			

图92 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-554-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:31:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	104307	100.000	26846	2079	1.161	--
总计		104307	100.000	26846			

图93 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-555-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:34:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	102543	100.000	26523	2068	1.161	--
总计		102543	100.000	26523			

图94 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-556-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:38:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	104722	100.000	26702	2071	1.159	--
总计		104722	100.000	26702			

图95 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-557-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:41:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	103477	100.000	26455	2068	1.165	--
总计		103477	100.000	26455			

图96 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-558-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:44:50
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	105855	100.000	27150	2069	1.161	--
总计		105855	100.000	27150			

图97 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-559-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:48:14
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	105413	100.000	26921	2064	1.162	--
总计		105413	100.000	26921			

图98 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-560-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:51:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	104619	100.000	26784	2064	1.161	--
总计		104619	100.000	26784			

图99 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-561-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:55:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	104435	100.000	26861	2064	1.162	--
总计		104435	100.000	26861			

图100 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-562-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:58:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	104513	100.000	27068	2067	1.158	--
总计		104513	100.000	27068			

图101 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-563-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:01:50
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	104985	100.000	26918	2059	1.166	--
总计		104985	100.000	26918			

图102 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-564-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:05:14
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	106019	100.000	27137	2065	1.166	--
总计		106019	100.000	27137			

图103 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-565-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:08:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	105392	100.000	26853	2071	1.163	--
总计		105392	100.000	26853			

图104 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-566-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:12:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	105091	100.000	26999	2070	1.163	--
总计		105091	100.000	26999			

图105 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-567-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:15:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	105562	100.000	27154	2076	1.161	--
总计		105562	100.000	27154			

图106 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-568-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:18:50
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	106999	100.000	27261	2054	1.162	--
总计		106999	100.000	27261			

图107 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-569-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:22:14
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	104589	100.000	26785	2075	1.161	--
总计		104589	100.000	26785			

图108 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-570-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:25:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	104980	100.000	26771	2070	1.163	--
总计		104980	100.000	26771			

图109 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-571-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:29:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:35:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	105472	100.000	27123	2061	1.162	--
总计		105472	100.000	27123			

图110 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-572-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:32:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:36:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	105511	100.000	27073	2054	1.158	--
总计		105511	100.000	27073			

图111 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-573-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:35:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:36:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	105510	100.000	27067	2064	1.159	--
总计		105510	100.000	27067			

图112 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-574-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:39:16
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:36:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	104968	100.000	23445	1466	1.181	--
总计		104968	100.000	23445			

图113 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-7/31-575-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:42:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:36:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	104759	100.000	23122	1439	1.194	--
总计		104759	100.000	23122			

图114 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-8/31-576-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:46:08
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:37:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-9/31-577-3 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:49:34
处理时间 (V3) : 2025/01/10 08:38:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.130	104178	100.000	23457	1476	1.172	--
总计		104178	100.000	23457			

图116 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-10/31-578-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:53:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:39:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	103658	100.000	22607	1424	1.201	--
总计		103658	100.000	22607			

图117 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-579-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:56:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:39:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	103379	100.000	22601	1412	1.203	--
总计		103379	100.000	22601			

图118 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-580-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:59:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:39:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	103535	100.000	22632	1415	1.202	--
总计		103535	100.000	22632			

图119 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-581-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:03:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:39:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	102339	100.000	22443	1432	1.205	--
总计		102339	100.000	22443			

图120 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-582-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:06:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:39:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	93207	100.000	24024	2077	1.167	--
总计		93207	100.000	24024			

图121 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-583-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:10:08
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:39:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	94666	100.000	24238	2072	1.168	--
总计		94666	100.000	24238			

图122 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-584-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:13:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:39:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	93396	100.000	24266	2072	1.159	--
总计		93396	100.000	24266			

图123 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-585-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:16:58
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	91791	100.000	23736	2066	1.165	--
总计		91791	100.000	23736			

图124 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-586-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:20:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	92501	100.000	23931	2070	1.166	--
总计		92501	100.000	23931			

图125 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-587-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:23:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	91869	100.000	23840	2066	1.161	--
总计		91869	100.000	23840			

图126 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-588-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:27:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	105699	100.000	27142	2086	1.162	--
总计		105699	100.000	27142			

图127 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-589-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:30:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	107111	100.000	27667	2085	1.163	--
总计		107111	100.000	27667			

图128 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-590-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:34:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	106015	100.000	27031	2074	1.163	--
总计		106015	100.000	27031			

图129 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-591-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:37:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	106140	100.000	27171	2074	1.163	--
总计		106140	100.000	27171			

图130 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-592-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:40:49
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	108204	100.000	27659	2056	1.163	--
总计		108204	100.000	27659			

图131 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-593-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:44:13
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	106173	100.000	27338	2086	1.161	--
总计		106173	100.000	27338			

图132 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-594-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:47:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	105542	100.000	27040	2079	1.165	--
总计		105542	100.000	27040			

图133 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-595-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:51:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	107612	100.000	27764	2082	1.162	--
总计		107612	100.000	27764			

图134 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-596-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:54:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	106486	100.000	27501	2064	1.160	--
总计		106486	100.000	27501			

图135 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-597-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:57:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	106432	100.000	27228	2069	1.157	--
总计		106432	100.000	27228			

图136 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-598-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:01:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	108311	100.000	27809	2073	1.161	--
总计		108311	100.000	27809			

图137 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-599-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:04:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	107016	100.000	27590	2085	1.162	--
总计		107016	100.000	27590			

图138 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-600-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:08:07
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	105815	100.000	27239	2077	1.160	--
总计		105815	100.000	27239			

图139 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-601-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:11:32
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	108143	100.000	27822	2073	1.163	--
总计		108143	100.000	27822			

图140 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-602-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:14:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	106487	100.000	27224	2072	1.163	--
总计		106487	100.000	27224			

图141 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-603-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:18:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	106225	100.000	27428	2084	1.162	--
总计		106225	100.000	27428			

图142 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-604-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:21:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	107403	100.000	27559	2069	1.166	--
总计		107403	100.000	27559			

图143 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-605-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:25:13
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	106788	100.000	27194	2066	1.164	--
总计		106788	100.000	27194			

图144 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-606-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:28:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	105156	100.000	26841	2070	1.160	--
总计		105156	100.000	26841			

图145 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-607-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:32:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:40:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	107218	100.000	27599	2066	1.160	--
总计		107218	100.000	27599			

图146 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-608-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:35:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:41:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	106257	100.000	27429	2085	1.165	--
总计		106257	100.000	27429			

图147 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-609-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:38:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:41:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	106178	100.000	27073	2063	1.163	--
总计		106178	100.000	27073			

图148 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-610-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:42:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:41:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	107222	100.000	27511	2068	1.164	--
总计		107222	100.000	27511			

图149 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-611-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:45:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:41:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	106723	100.000	27458	2080	1.163	--
总计		106723	100.000	27458			

图150 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-612-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:49:14
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:41:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105231	100.000	23287	1450	1.194	--
总计		105231	100.000	23287			

图151 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-11/31-613-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:52:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:41:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	105836	100.000	23219	1451	1.193	--
总计		105836	100.000	23219			

图152 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2