




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-961-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:16:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-962-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:20:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	104815	100.000	22421	1393	1.239	--
总计		104815	100.000	22421			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-963-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:23:31
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	105649	100.000	22517	1383	1.237	--
总计		105649	100.000	22517			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-964-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:26:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	105656	100.000	22693	1396	1.236	--
总计		105656	100.000	22693			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-965-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:30:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.129	105732	100.000	22706	1391	1.235	--
总计		105732	100.000	22706			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-966-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:33:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.129	105747	100.000	22736	1394	1.234	--
总计		105747	100.000	22736			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-967-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:37:12
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:23:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	94793	100.000	24225	2126	1.200	--
总计		94793	100.000	24225			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-968-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:40:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	97717	100.000	24942	2105	1.195	--
总计		97717	100.000	24942			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-969-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:44:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	97328	100.000	25067	2121	1.204	--
总计		97328	100.000	25067			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-970-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:47:27
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:23:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	96731	100.000	24798	2112	1.208	--
总计		96731	100.000	24798			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-971-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:50:52
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:23:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	72396	100.000	18270	2078	1.226	--
总计		72396	100.000	18270			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-972-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:54:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:23:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	91648	100.000	23899	2152	1.179	--
总计		91648	100.000	23899			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-973-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 11:57:42
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:23:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	106923	100.000	27725	2158	1.185	--
总计		106923	100.000	27725			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-974-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:01:06
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:23:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	105946	100.000	27507	2157	1.186	--
总计		105946	100.000	27507			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-975-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:04:30
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	107233	100.000	27845	2157	1.188	--
总计		107233	100.000	27845			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-976-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:07:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	108552	100.000	27846	2143	1.190	--
总计		108552	100.000	27846			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-977-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:11:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	105529	100.000	27016	2136	1.190	--
总计		105529	100.000	27016			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-978-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:14:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	105548	100.000	27257	2152	1.187	--
总计		105548	100.000	27257			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-979-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:18:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	106904	100.000	27498	2157	1.189	--
总计		106904	100.000	27498			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-980-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:21:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	106310	100.000	27486	2154	1.186	--
总计		106310	100.000	27486			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-981-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:25:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	107577	100.000	27977	2167	1.186	--
总计		107577	100.000	27977			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-982-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:28:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	108723	100.000	28262	2161	1.186	--
总计		108723	100.000	28262			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-983-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:31:50
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:24:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	105889	100.000	27569	2166	1.186	--
总计		105889	100.000	27569			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-984-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:35:15
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	105772	100.000	27398	2157	1.186	--
总计		105772	100.000	27398			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-985-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:38:40
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:24:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	107367	100.000	27935	2168	1.185	--
总计		107367	100.000	27935			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-986-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:42:05
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:24:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	105889	100.000	27550	2172	1.183	--
总计		105889	100.000	27550			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-987-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:45:29
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:24:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	107703	100.000	27732	2153	1.186	--
总计		107703	100.000	27732			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-988-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:48:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	108769	100.000	28034	2149	1.189	--
总计		108769	100.000	28034			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-989-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:52:18
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	106354	100.000	27282	2147	1.187	--
总计		106354	100.000	27282			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-990-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:55:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	105824	100.000	27183	2150	1.188	--
总计		105824	100.000	27183			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-991-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 12:59:08
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	107301	100.000	27931	2171	1.186	--
总计		107301	100.000	27931			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-992-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:02:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	106181	100.000	27437	2161	1.185	--
总计		106181	100.000	27437			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-993-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:05:58
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	107370	100.000	27925	2172	1.184	--
总计		107370	100.000	27925			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-994-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:09:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	108803	100.000	28081	2157	1.185	--
总计		108803	100.000	28081			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-995-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:12:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	106408	100.000	27687	2168	1.185	--
总计		106408	100.000	27687			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-996-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:16:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	105935	100.000	27223	2153	1.187	--
总计		105935	100.000	27223			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-997-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:19:38
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	105708	100.000	22608	1392	1.241	--
总计		105708	100.000	22608			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-998-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:23:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:24:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	104708	100.000	22540	1413	1.242	--
总计		104708	100.000	22540			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-999-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:26:30
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1000-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:29:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105353	100.000	22727	1391	1.240	--
总计		105353	100.000	22727			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1001-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:33:24
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	104700	100.000	22703	1402	1.243	--
总计		104700	100.000	22703			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1002-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:36:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	105698	100.000	22688	1395	1.239	--
总计		105698	100.000	22688			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1003-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:40:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	105506	100.000	22571	1393	1.239	--
总计		105506	100.000	22571			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1004-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:43:44
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:25:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105664	100.000	22756	1384	1.239	--
总计		105664	100.000	22756			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1005-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:47:10
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	94915	100.000	24734	2165	1.190	--
总计		94915	100.000	24734			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1006-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:50:36
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	96766	100.000	25315	2159	1.190	--
总计		96766	100.000	25315			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1007-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:54:02
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:25:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	93838	100.000	24462	2189	1.189	--
总计		93838	100.000	24462			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1008-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 13:57:28
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	98094	100.000	25544	2137	1.184	--
总计		98094	100.000	25544			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1009-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:00:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	84914	100.000	22208	2151	1.197	--
总计		84914	100.000	22208			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1010-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:04:19
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	90589	100.000	23808	2157	1.187	--
总计		90589	100.000	23808			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1011-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:07:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	106886	100.000	27822	2146	1.180	--
总计		106886	100.000	27822			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1012-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:11:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	105463	100.000	27211	2153	1.187	--
总计		105463	100.000	27211			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1013-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:14:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	106149	100.000	27661	2170	1.185	--
总计		106149	100.000	27661			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1014-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:17:59
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	105519	100.000	27624	2159	1.185	--
总计		105519	100.000	27624			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1015-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:21:25
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:25:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	104697	100.000	27294	2173	1.187	--
总计		104697	100.000	27294			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1016-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:24:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	105700	100.000	27255	2155	1.187	--
总计		105700	100.000	27255			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1017-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:28:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	107567	100.000	27917	2148	1.184	--
总计		107567	100.000	27917			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1018-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:31:43
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	105661	100.000	27423	2163	1.183	--
总计		105661	100.000	27423			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1019-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:35:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	106376	100.000	27639	2167	1.185	--
总计		106376	100.000	27639			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1020-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:38:35
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	105924	100.000	27544	2179	1.183	--
总计		105924	100.000	27544			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1021-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:42:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	105093	100.000	27258	2153	1.192	--
总计		105093	100.000	27258			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1022-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:45:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:25:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	105929	100.000	27573	2167	1.186	--
总计		105929	100.000	27573			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1023-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:48:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	107518	100.000	27805	2149	1.189	--
总计		107518	100.000	27805			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1024-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:52:19
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	104695	100.000	27400	2167	1.189	--
总计		104695	100.000	27400			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1025-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:55:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	106427	100.000	27632	2146	1.186	--
总计		106427	100.000	27632			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1026-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 14:59:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	106474	100.000	27696	2164	1.185	--
总计		106474	100.000	27696			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1027-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:02:36
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:26:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	105376	100.000	27429	2169	1.186	--
总计		105376	100.000	27429			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1028-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:06:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	106175	100.000	27458	2148	1.187	--
总计		106175	100.000	27458			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1029-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:09:27
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:26:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	107636	100.000	27971	2168	1.183	--
总计		107636	100.000	27971			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1030-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:12:54
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	105907	100.000	27549	2169	1.184	--
总计		105907	100.000	27549			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1031-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:16:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	106038	100.000	27565	2168	1.184	--
总计		106038	100.000	27565			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1032-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:19:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	106301	100.000	27638	2167	1.184	--
总计		106301	100.000	27638			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1033-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:23:13
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	104488	100.000	27350	2160	1.187	--
总计		104488	100.000	27350			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1034-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:26:40
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	105832	100.000	27213	2155	1.187	--
总计		105832	100.000	27213			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1035-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:30:06
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:26:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	104817	100.000	22716	1398	1.240	--
总计		104817	100.000	22716			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1036-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:33:33
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	104917	100.000	22725	1394	1.237	--
总计		104917	100.000	22725			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1037-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:36:58
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1038-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:40:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	105448	100.000	22826	1386	1.239	--
总计		105448	100.000	22826			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1039-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:43:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105472	100.000	22807	1386	1.240	--
总计		105472	100.000	22807			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1040-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:47:12
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	105217	100.000	22801	1391	1.244	--
总计		105217	100.000	22801			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1041-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:50:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	104553	100.000	22759	1400	1.238	--
总计		104553	100.000	22759			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1042-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:54:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	105495	100.000	22785	1381	1.238	--
总计		105495	100.000	22785			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1043-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 15:57:27
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	54212	100.000	14163	2149	1.207	--
总计		54212	100.000	14163			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1044-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:00:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	57649	100.000	15061	2153	1.199	--
总计		57649	100.000	15061			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1045-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:04:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	62011	100.000	16173	2141	1.198	--
总计		62011	100.000	16173			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1046-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:07:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:26:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	60100	100.000	15746	2155	1.201	--
总计		60100	100.000	15746			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1047-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:11:06
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:27:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	67861	100.000	17491	2113	1.214	--
总计		67861	100.000	17491			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1048-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:14:31
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:27:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	56860	100.000	14985	2161	1.193	--
总计		56860	100.000	14985			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1049-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:17:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	101218	100.000	26336	2150	1.179	--
总计		101218	100.000	26336			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1050-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:21:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	101466	100.000	26506	2176	1.187	--
总计		101466	100.000	26506			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1051-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:24:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	102452	100.000	26714	2172	1.186	--
总计		102452	100.000	26714			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1052-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:28:08
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	103427	100.000	26936	2167	1.187	--
总计		103427	100.000	26936			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1053-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:31:32
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	104344	100.000	27059	2185	1.190	--
总计		104344	100.000	27059			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1054-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:34:57
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	101799	100.000	26568	2175	1.187	--
总计		101799	100.000	26568			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1055-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:38:22
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	103900	100.000	27096	2173	1.186	--
总计		103900	100.000	27096			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1056-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:41:46
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	104722	100.000	26929	2161	1.190	--
总计		104722	100.000	26929			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1057-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:45:10
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	104598	100.000	27465	2173	1.187	--
总计		104598	100.000	27465			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1058-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:48:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	106426	100.000	27685	2138	1.184	--
总计		106426	100.000	27685			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1059-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:51:59
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:27:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	106409	100.000	27657	2194	1.189	--
总计		106409	100.000	27657			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1060-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:55:23
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104090	100.000	27069	2162	1.188	--
总计		104090	100.000	27069			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1061-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 16:58:47
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	103130	100.000	26861	2189	1.192	--
总计		103130	100.000	26861			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1062-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:02:11
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	104774	100.000	27238	2174	1.187	--
总计		104774	100.000	27238			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1063-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:05:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	105085	100.000	27425	2177	1.190	--
总计		105085	100.000	27425			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1064-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:08:59
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	106425	100.000	27444	2171	1.187	--
总计		106425	100.000	27444			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1065-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:12:24
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	107378	100.000	27919	2161	1.187	--
总计		107378	100.000	27919			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1066-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:15:49
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:27:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	104207	100.000	27307	2171	1.187	--
总计		104207	100.000	27307			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1067-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:19:13
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	103100	100.000	27055	2173	1.188	--
总计		103100	100.000	27055			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1068-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:22:37
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	104043	100.000	27301	2175	1.187	--
总计		104043	100.000	27301			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1069-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:26:01
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	105130	100.000	27455	2152	1.186	--
总计		105130	100.000	27455			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1070-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:29:25
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	106797	100.000	27823	2142	1.185	--
总计		106797	100.000	27823			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1071-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:32:49
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:27:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	107585	100.000	27964	2154	1.187	--
总计		107585	100.000	27964			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1072-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:36:13
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	104473	100.000	27401	2174	1.188	--
总计		104473	100.000	27401			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1073-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:39:38
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:28:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	105654	100.000	22730	1404	1.240	--
总计		105654	100.000	22730			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1074-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:43:03
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	104935	100.000	22687	1412	1.237	--
总计		104935	100.000	22687			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1075-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:46:29
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1076-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:49:56
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	104706	100.000	22654	1414	1.245	--
总计		104706	100.000	22654			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1077-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:53:22
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:28:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	104732	100.000	22786	1409	1.241	--
总计		104732	100.000	22786			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1078-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 17:56:48
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	104988	100.000	22791	1397	1.236	--
总计		104988	100.000	22791			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1079-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:00:15
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:28:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	105600	100.000	22709	1403	1.242	--
总计		105600	100.000	22709			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1080-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:03:41
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104725	100.000	22681	1399	1.243	--
总计		104725	100.000	22681			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1081-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:07:06
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:28:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	69290	100.000	18061	2168	1.201	--
总计		69290	100.000	18061			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1082-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:10:30
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	62936	100.000	16437	2209	1.202	--
总计		62936	100.000	16437			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1083-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:13:55
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	61970	100.000	16412	2195	1.194	--
总计		61970	100.000	16412			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1084-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:17:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	59034	100.000	15579	2203	1.200	--
总计		59034	100.000	15579			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1085-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:20:44
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	63575	100.000	16605	2167	1.197	--
总计		63575	100.000	16605			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1086-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:24:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	55211	100.000	14631	2198	1.199	--
总计		55211	100.000	14631			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1087-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:27:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	105772	100.000	27577	2160	1.184	--
总计		105772	100.000	27577			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1088-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:30:59
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	101942	100.000	26440	2159	1.191	--
总计		101942	100.000	26440			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1089-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:34:24
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	103502	100.000	27131	2203	1.188	--
总计		103502	100.000	27131			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1090-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:37:49
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	101516	100.000	26462	2194	1.193	--
总计		101516	100.000	26462			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1091-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:41:14
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	104171	100.000	26884	2169	1.191	--
总计		104171	100.000	26884			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1092-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:44:39
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	100583	100.000	26152	2163	1.191	--
总计		100583	100.000	26152			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1093-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:48:04
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	106884	100.000	27823	2191	1.191	--
总计		106884	100.000	27823			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1094-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:51:30
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:28:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104419	100.000	27123	2159	1.189	--
总计		104419	100.000	27123			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1095-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:54:55
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:28:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	106769	100.000	27711	2139	1.187	--
总计		106769	100.000	27711			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1096-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 18:58:20
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	105406	100.000	27693	2175	1.188	--
总计		105406	100.000	27693			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1097-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:01:45
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	105127	100.000	27391	2164	1.189	--
总计		105127	100.000	27391			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1098-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:05:10
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	103641	100.000	27153	2171	1.189	--
总计		103641	100.000	27153			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1099-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:08:36
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:29:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	106940	100.000	27766	2157	1.189	--
总计		106940	100.000	27766			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1100-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:12:02
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104481	100.000	27233	2164	1.188	--
总计		104481	100.000	27233			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1101-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:15:28
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	107079	100.000	27937	2179	1.187	--
总计		107079	100.000	27937			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1102-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:18:53
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	105475	100.000	27341	2170	1.190	--
总计		105475	100.000	27341			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1103-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:22:18
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	106370	100.000	27436	2164	1.189	--
总计		106370	100.000	27436			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1104-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:25:43
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:29:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	103851	100.000	27223	2170	1.188	--
总计		103851	100.000	27223			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1105-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:29:08
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	107915	100.000	28137	2177	1.185	--
总计		107915	100.000	28137			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1106-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:32:34
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	105447	100.000	27502	2178	1.187	--
总计		105447	100.000	27502			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1107-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:36:00
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	107055	100.000	27917	2177	1.187	--
总计		107055	100.000	27917			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1108-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:39:26
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104741	100.000	27176	2154	1.190	--
总计		104741	100.000	27176			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1109-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:42:51
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	106168	100.000	27446	2165	1.188	--
总计		106168	100.000	27446			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1110-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:46:17
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104183	100.000	26947	2153	1.191	--
总计		104183	100.000	26947			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1111-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:49:43
处理时间 (V2): 2025/01/10 08:29:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104676	100.000	22657	1399	1.240	--
总计		104676	100.000	22657			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 31-6/28-1112-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250109-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/09 19:53:09
处理时间 (V2) : 2025/01/10 08:29:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104953	100.000	22676	1390	1.241	--
总计		104953	100.000	22676			