



JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-1-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/10 10:55:45

处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:42:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-2-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 10:59:10
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	103621	100.000	22857	1507	1.177	--
总计		103621	100.000	22857			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-3-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:02:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	103985	100.000	22892	1507	1.182	--
总计		103985	100.000	22892			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-4-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:06:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	103772	100.000	22890	1509	1.181	--
总计		103772	100.000	22890			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-5-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:09:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	103744	100.000	22930	1511	1.179	--
总计		103744	100.000	22930			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-6-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:12:51
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	103842	100.000	22933	1506	1.177	--
总计		103842	100.000	22933			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-7-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:16:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	52655	100.000	13355	2065	1.174	--
总计		52655	100.000	13355			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-8-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:20:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	52062	100.000	13159	2061	1.169	--
总计		52062	100.000	13159			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-9-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:23:48
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	53312	100.000	13429	2048	1.170	--
总计		53312	100.000	13429			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-10-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:27:13
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	50118	100.000	12658	2060	1.177	--
总计		50118	100.000	12658			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-11-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:30:38
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	52336	100.000	13222	2060	1.175	--
总计		52336	100.000	13222			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-12-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:34:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	50455	100.000	12726	2057	1.173	--
总计		50455	100.000	12726			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-13-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:37:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	97643	100.000	24754	2071	1.158	--
总计		97643	100.000	24754			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-14-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:40:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	93179	100.000	23623	2068	1.163	--
总计		93179	100.000	23623			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-15-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:44:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	97932	100.000	24944	2073	1.160	--
总计		97932	100.000	24944			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-16-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:47:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	93065	100.000	23687	2074	1.161	--
总计		93065	100.000	23687			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-17-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:51:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	94931	100.000	24160	2075	1.163	--
总计		94931	100.000	24160			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-18-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:54:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	92641	100.000	23573	2074	1.164	--
总计		92641	100.000	23573			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-19-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:58:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104570	100.000	26589	2075	1.160	--
总计		104570	100.000	26589			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-20-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:01:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	102459	100.000	26056	2073	1.161	--
总计		102459	100.000	26056			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-21-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:04:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	105200	100.000	26771	2070	1.158	--
总计		105200	100.000	26771			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-22-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:08:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	102231	100.000	25972	2070	1.158	--
总计		102231	100.000	25972			



JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-23-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/10 12:11:40

处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:43:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	102274	100.000	26019	2074	1.161	--
总计		102274	100.000	26019			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-24-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:15:05
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	102463	100.000	26062	2072	1.162	--
总计		102463	100.000	26062			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-25-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:18:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105137	100.000	26721	2072	1.158	--
总计		105137	100.000	26721			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-26-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:21:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	103061	100.000	26195	2074	1.159	--
总计		103061	100.000	26195			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-27-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:25:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105391	100.000	26799	2072	1.158	--
总计		105391	100.000	26799			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-28-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:28:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	102529	100.000	26111	2077	1.160	--
总计		102529	100.000	26111			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-29-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:32:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	102745	100.000	26160	2073	1.161	--
总计		102745	100.000	26160			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-30-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:35:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	102787	100.000	26158	2076	1.157	--
总计		102787	100.000	26158			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-31-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:38:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105279	100.000	26754	2072	1.159	--
总计		105279	100.000	26754			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-32-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:42:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	102944	100.000	26126	2068	1.159	--
总计		102944	100.000	26126			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-33-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:45:51
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105202	100.000	26747	2072	1.157	--
总计		105202	100.000	26747			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-34-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:49:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	102709	100.000	26086	2068	1.160	--
总计		102709	100.000	26086			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-35-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:52:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	103500	100.000	26351	2072	1.158	--
总计		103500	100.000	26351			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-36-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:56:05
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	102860	100.000	26141	2071	1.161	--
总计		102860	100.000	26141			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-37-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:59:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104917	100.000	23025	1506	1.180	--
总计		104917	100.000	23025			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-38-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:02:56
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104770	100.000	23043	1510	1.182	--
总计		104770	100.000	23043			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-39-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:06:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-40-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:09:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104077	100.000	22862	1510	1.182	--
总计		104077	100.000	22862			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-41-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:13:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104159	100.000	22837	1509	1.183	--
总计		104159	100.000	22837			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-42-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:16:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104043	100.000	22884	1511	1.182	--
总计		104043	100.000	22884			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-43-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:20:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104177	100.000	22901	1510	1.182	--
总计		104177	100.000	22901			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-44-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:23:38
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	104227	100.000	22976	1509	1.180	--
总计		104227	100.000	22976			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-45-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:27:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:44:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	52548	100.000	13284	2066	1.177	--
总计		52548	100.000	13284			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-46-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:30:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	52992	100.000	13417	2068	1.172	--
总计		52992	100.000	13417			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-47-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:33:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	49373	100.000	12519	2064	1.170	--
总计		49373	100.000	12519			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-48-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:37:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	51599	100.000	13047	2074	1.178	--
总计		51599	100.000	13047			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-49-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:40:48
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	53618	100.000	13611	2068	1.176	--
总计		53618	100.000	13611			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-50-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:44:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	50768	100.000	12903	2073	1.165	--
总计		50768	100.000	12903			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-51-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:47:42
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	95183	100.000	24195	2072	1.161	--
总计		95183	100.000	24195			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-52-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:51:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	99270	100.000	25253	2075	1.162	--
总计		99270	100.000	25253			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-53-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:54:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	93720	100.000	23817	2071	1.164	--
总计		93720	100.000	23817			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-54-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:58:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	91596	100.000	23285	2074	1.163	--
总计		91596	100.000	23285			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-55-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:01:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	94811	100.000	24104	2076	1.165	--
总计		94811	100.000	24104			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-56-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:04:52
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	91720	100.000	23347	2073	1.161	--
总计		91720	100.000	23347			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-57-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:08:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	103567	100.000	26348	2075	1.162	--
总计		103567	100.000	26348			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-58-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:11:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	105870	100.000	26885	2076	1.162	--
总计		105870	100.000	26885			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-59-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:15:12
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	103270	100.000	26216	2070	1.161	--
总计		103270	100.000	26216			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-60-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:18:38
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	101492	100.000	25765	2071	1.164	--
总计		101492	100.000	25765			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-61-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:22:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	103977	100.000	26414	2073	1.162	--
总计		103977	100.000	26414			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-62-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:25:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	100712	100.000	25646	2076	1.161	--
总计		100712	100.000	25646			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-63-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:28:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104020	100.000	26489	2078	1.160	--
总计		104020	100.000	26489			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-64-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:32:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	106783	100.000	27123	2072	1.161	--
总计		106783	100.000	27123			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-65-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:35:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	103818	100.000	26382	2071	1.161	--
总计		103818	100.000	26382			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-66-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:39:20
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	101713	100.000	25829	2072	1.161	--
总计		101713	100.000	25829			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-67-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:42:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104487	100.000	26535	2071	1.162	--
总计		104487	100.000	26535			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-68-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:46:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:45:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	101706	100.000	25849	2074	1.160	--
总计		101706	100.000	25849			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-69-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:49:41
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104051	100.000	26487	2074	1.161	--
总计		104051	100.000	26487			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-70-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:53:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	106454	100.000	27118	2077	1.160	--
总计		106454	100.000	27118			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-71-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:56:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	103867	100.000	26480	2077	1.160	--
总计		103867	100.000	26480			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-72-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:00:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	101576	100.000	25839	2076	1.163	--
总计		101576	100.000	25839			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-73-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:03:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	103989	100.000	26450	2074	1.158	--
总计		103989	100.000	26450			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-74-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:06:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	101586	100.000	25791	2073	1.163	--
总计		101586	100.000	25791			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-75-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:10:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104093	100.000	22925	1511	1.182	--
总计		104093	100.000	22925			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-76-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:13:49
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104244	100.000	22952	1508	1.183	--
总计		104244	100.000	22952			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-77-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:17:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-78-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:20:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104165	100.000	22914	1512	1.183	--
总计		104165	100.000	22914			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-79-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:24:05
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104187	100.000	22927	1512	1.183	--
总计		104187	100.000	22927			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-80-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:27:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104467	100.000	22914	1507	1.183	--
总计		104467	100.000	22914			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-81-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:30:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104164	100.000	22903	1512	1.184	--
总计		104164	100.000	22903			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-82-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:34:20
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104371	100.000	22894	1506	1.185	--
总计		104371	100.000	22894			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-83-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:37:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	50912	100.000	12697	1951	1.180	--
总计		50912	100.000	12697			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-84-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:41:10
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	43782	100.000	10947	1956	1.179	--
总计		43782	100.000	10947			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-85-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:44:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	47197	100.000	11753	1942	1.165	--
总计		47197	100.000	11753			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-86-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:48:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	51708	100.000	12871	1951	1.177	--
总计		51708	100.000	12871			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-87-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:51:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	60740	100.000	15074	1944	1.174	--
总计		60740	100.000	15074			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-88-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:54:49
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	54232	100.000	13481	1949	1.183	--
总计		54232	100.000	13481			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-89-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:58:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	95764	100.000	23831	1953	1.165	--
总计		95764	100.000	23831			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-90-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:01:39
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:46:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	96612	100.000	24026	1955	1.173	--
总计		96612	100.000	24026			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-91-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:05:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	95087	100.000	23653	1960	1.171	--
总计		95087	100.000	23653			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-92-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:08:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	94610	100.000	23431	1956	1.175	--
总计		94610	100.000	23431			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-93-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:11:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	98922	100.000	24547	1959	1.171	--
总计		98922	100.000	24547			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-94-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:15:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	94106	100.000	23377	1955	1.171	--
总计		94106	100.000	23377			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-95-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:18:42
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	102546	100.000	25452	1959	1.171	--
总计		102546	100.000	25452			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-96-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:22:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103876	100.000	25761	1956	1.170	--
总计		103876	100.000	25761			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-97-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:25:31
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103094	100.000	25620	1962	1.171	--
总计		103094	100.000	25620			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-98-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:28:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	101936	100.000	25261	1959	1.173	--
总计		101936	100.000	25261			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-99-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:32:20
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	105225	100.000	26103	1961	1.170	--
总计		105225	100.000	26103			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-100-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:35:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	100579	100.000	24939	1957	1.173	--
总计		100579	100.000	24939			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-101-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:39:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103464	100.000	25670	1959	1.169	--
总计		103464	100.000	25670			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-102-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:42:33
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	104476	100.000	25915	1958	1.170	--
总计		104476	100.000	25915			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-103-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:45:58
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	104095	100.000	25836	1961	1.169	--
总计		104095	100.000	25836			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-104-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:49:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	102695	100.000	25431	1956	1.170	--
总计		102695	100.000	25431			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-105-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:52:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	105565	100.000	26200	1959	1.171	--
总计		105565	100.000	26200			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-106-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:56:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	101147	100.000	25085	1952	1.170	--
总计		101147	100.000	25085			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-107-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:59:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103842	100.000	25813	1962	1.169	--
总计		103842	100.000	25813			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-108-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:03:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	104512	100.000	25932	1957	1.170	--
总计		104512	100.000	25932			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-109-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:06:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	104099	100.000	25845	1958	1.169	--
总计		104099	100.000	25845			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-110-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:09:48
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	102508	100.000	25460	1960	1.172	--
总计		102508	100.000	25460			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-111-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:13:12
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	105483	100.000	26220	1962	1.168	--
总计		105483	100.000	26220			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-112-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:16:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:47:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	101278	100.000	25115	1958	1.171	--
总计		101278	100.000	25115			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-113-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:20:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104540	100.000	23028	1510	1.184	--
总计		104540	100.000	23028			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-114-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:23:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104685	100.000	23033	1507	1.185	--
总计		104685	100.000	23033			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-115-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:26:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-116-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:30:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104357	100.000	23047	1515	1.182	--
总计		104357	100.000	23047			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-117-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:33:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104547	100.000	23054	1511	1.185	--
总计		104547	100.000	23054			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-118-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:37:13
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104534	100.000	23059	1512	1.181	--
总计		104534	100.000	23059			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-119-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:40:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104374	100.000	23064	1513	1.183	--
总计		104374	100.000	23064			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-120-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:44:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104452	100.000	23059	1516	1.182	--
总计		104452	100.000	23059			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-121-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:47:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	46278	100.000	11571	1961	1.183	--
总计		46278	100.000	11571			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-122-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:51:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	49728	100.000	12392	1954	1.182	--
总计		49728	100.000	12392			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-123-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:54:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	56223	100.000	14052	1962	1.173	--
总计		56223	100.000	14052			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-124-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:57:51
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	50066	100.000	12474	1957	1.185	--
总计		50066	100.000	12474			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-125-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:01:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	45894	100.000	11510	1968	1.176	--
总计		45894	100.000	11510			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-126-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:04:41
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	56391	100.000	14083	1963	1.176	--
总计		56391	100.000	14083			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-127-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:08:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	96027	100.000	23875	1963	1.170	--
总计		96027	100.000	23875			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-128-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:11:32
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	95087	100.000	23588	1963	1.173	--
总计		95087	100.000	23588			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-129-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:14:58
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	96686	100.000	23979	1964	1.173	--
总计		96686	100.000	23979			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-130-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:18:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	95493	100.000	23690	1962	1.175	--
总计		95493	100.000	23690			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-131-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:21:48
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	96193	100.000	23890	1965	1.172	--
总计		96193	100.000	23890			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-132-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:25:12
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	96553	100.000	24009	1969	1.175	--
总计		96553	100.000	24009			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-133-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:28:38
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	103405	100.000	25692	1966	1.171	--
总计		103405	100.000	25692			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-134-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:32:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:48:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	102754	100.000	25486	1963	1.172	--
总计		102754	100.000	25486			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-135-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:35:29
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	102495	100.000	25489	1968	1.172	--
总计		102495	100.000	25489			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-136-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:38:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	102404	100.000	25475	1967	1.171	--
总计		102404	100.000	25475			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-137-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:42:20
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	103334	100.000	25693	1966	1.171	--
总计		103334	100.000	25693			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-138-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:45:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	102750	100.000	25552	1969	1.170	--
总计		102750	100.000	25552			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-139-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:49:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	104359	100.000	25916	1966	1.171	--
总计		104359	100.000	25916			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-140-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:52:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	103612	100.000	25761	1968	1.170	--
总计		103612	100.000	25761			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-141-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:56:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	103361	100.000	25712	1967	1.170	--
总计		103361	100.000	25712			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-142-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:59:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103662	100.000	25782	1967	1.171	--
总计		103662	100.000	25782			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-143-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:02:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	104349	100.000	25944	1969	1.172	--
总计		104349	100.000	25944			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-144-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:06:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103264	100.000	25668	1966	1.170	--
总计		103264	100.000	25668			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-145-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:09:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	104521	100.000	25981	1968	1.171	--
总计		104521	100.000	25981			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-146-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:13:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103668	100.000	25827	1962	1.169	--
总计		103668	100.000	25827			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-147-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:16:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103583	100.000	25794	1962	1.171	--
总计		103583	100.000	25794			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-148-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:20:02
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103525	100.000	25750	1970	1.172	--
总计		103525	100.000	25750			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-149-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:23:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	104593	100.000	26002	1966	1.172	--
总计		104593	100.000	26002			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-150-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:26:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	103509	100.000	25728	1966	1.171	--
总计		103509	100.000	25728			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-151-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:30:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104228	100.000	23017	1518	1.185	--
总计		104228	100.000	23017			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-3/10-152-2 - cbzj-HM1191p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:33:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:49:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104435	100.000	23053	1519	1.183	--
总计		104435	100.000	23053			