




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-4/31-616-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 10:55:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:54:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-4/31-617-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 10:59:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:54:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	104622	100.000	22791	1478	1.177	--
总计		104622	100.000	22791			

图2 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-6/31-618-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:02:41
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	104810	100.000	22292	1420	1.204	--
总计		104810	100.000	22292			

图3 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-619-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:06:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	104110	100.000	22221	1426	1.203	--
总计		104110	100.000	22221			

图4 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-620-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:09:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	103457	100.000	22074	1425	1.200	--
总计		103457	100.000	22074			

图5 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-621-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:12:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	103404	100.000	22059	1426	1.201	--
总计		103404	100.000	22059			

图6 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-622-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:17:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	93648	100.000	23100	1964	1.179	--
总计		93648	100.000	23100			

图7 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-623-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:20:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	92324	100.000	22695	1962	1.186	--
总计		92324	100.000	22695			

图8 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-624-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:24:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	93059	100.000	22894	1961	1.184	--
总计		93059	100.000	22894			

图9 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-625-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:27:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	92890	100.000	22805	1958	1.184	--
总计		92890	100.000	22805			

图10 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-626-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:31:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	94530	100.000	23251	1964	1.184	--
总计		94530	100.000	23251			

图11 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-627-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:34:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	93521	100.000	23010	1966	1.187	--
总计		93521	100.000	23010			

图12 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-628-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:37:48
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	107104	100.000	26382	1981	1.173	--
总计		107104	100.000	26382			

图13 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-629-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:41:13
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:55:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	105971	100.000	26195	1972	1.174	--
总计		105971	100.000	26195			

图14 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-630-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:44:38
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	106275	100.000	26133	1961	1.179	--
总计		106275	100.000	26133			

图15 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-631-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:48:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	106299	100.000	26228	1969	1.177	--
总计		106299	100.000	26228			

图16 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-632-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:51:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	105977	100.000	26033	1963	1.176	--
总计		105977	100.000	26033			

图17 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-633-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:54:51
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	105503	100.000	26090	1982	1.178	--
总计		105503	100.000	26090			

图18 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-634-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:58:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	105964	100.000	26129	1967	1.179	--
总计		105964	100.000	26129			

图19 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-635-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:01:39
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	105869	100.000	26082	1966	1.176	--
总计		105869	100.000	26082			

图20 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-636-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:05:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	106358	100.000	26180	1937	1.178	--
总计		106358	100.000	26180			

图21 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-637-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:08:29
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	106346	100.000	26183	1961	1.177	--
总计		106346	100.000	26183			

图22 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-638-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:11:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	106233	100.000	25981	1952	1.179	--
总计		106233	100.000	25981			

图23 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-639-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:15:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	106610	100.000	26002	1952	1.176	--
总计		106610	100.000	26002			

图24 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-640-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:18:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	106109	100.000	26234	1962	1.174	--
总计		106109	100.000	26234			

图25 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-641-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:22:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	106393	100.000	26192	1961	1.175	--
总计		106393	100.000	26192			

图26 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-642-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:25:33
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	106037	100.000	26098	1965	1.177	--
总计		106037	100.000	26098			

图27 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-643-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:28:58
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	106326	100.000	26267	1971	1.174	--
总计		106326	100.000	26267			

图28 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-644-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:32:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	105800	100.000	26145	1953	1.174	--
总计		105800	100.000	26145			

图29 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-645-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:35:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	106701	100.000	26129	1956	1.176	--
总计		106701	100.000	26129			

图30 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-646-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:39:12
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	106689	100.000	26260	1969	1.172	--
总计		106689	100.000	26260			

图31 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-647-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:42:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105339	100.000	26054	1957	1.175	--
总计		105339	100.000	26054			

图32 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-648-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:46:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	104804	100.000	25986	1965	1.180	--
总计		104804	100.000	25986			

图33 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-649-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:49:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	105314	100.000	25930	1955	1.177	--
总计		105314	100.000	25930			

图34 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-650-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:52:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	104985	100.000	25852	1955	1.180	--
总计		104985	100.000	25852			

图35 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-651-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:56:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:56:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	105162	100.000	25973	1959	1.177	--
总计		105162	100.000	25973			

图36 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-652-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:59:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	104975	100.000	22966	1469	1.181	--
总计		104975	100.000	22966			

图37 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-653-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:03:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.149	104558	100.000	22752	1445	1.192	--
总计		104558	100.000	22752			

图38 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-654-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:06:33
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-655-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:10:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	105795	100.000	22645	1423	1.201	--
总计		105795	100.000	22645			

图40 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-656-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:13:27
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	105779	100.000	22604	1432	1.197	--
总计		105779	100.000	22604			

图41 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-657-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:16:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.149	104849	100.000	22584	1427	1.198	--
总计		104849	100.000	22584			

图42 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-658-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:20:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	104777	100.000	22481	1424	1.200	--
总计		104777	100.000	22481			

图43 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-659-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:23:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	104771	100.000	22512	1429	1.196	--
总计		104771	100.000	22512			

图44 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-660-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:27:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	94268	100.000	23186	1969	1.178	--
总计		94268	100.000	23186			

图45 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-661-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:30:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	90286	100.000	22568	2000	1.171	--
总计		90286	100.000	22568			

图46 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-662-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:34:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	90712	100.000	22482	1991	1.175	--
总计		90712	100.000	22482			

图47 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-663-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:37:27
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	88146	100.000	21585	1963	1.178	--
总计		88146	100.000	21585			

图48 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-664-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:40:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	95870	100.000	23829	1973	1.172	--
总计		95870	100.000	23829			

图49 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-665-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:44:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	92660	100.000	22866	1950	1.181	--
总计		92660	100.000	22866			

图50 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 0-20/31-666-3 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:47:45
处理时间 (V3) : 2025/01/11 09:25:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: sunwenxin

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	107889	100.000	26671	1949	1.171	--
总计		107889	100.000	26671			

图51 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-667-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:51:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	105209	100.000	26012	1956	1.174	--
总计		105209	100.000	26012			

图52 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-668-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:54:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	106372	100.000	26169	1958	1.177	--
总计		106372	100.000	26169			

图53 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-669-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:58:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	105085	100.000	25991	1966	1.177	--
总计		105085	100.000	25991			

图54 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-670-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:01:27
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	105842	100.000	26186	1975	1.178	--
总计		105842	100.000	26186			

图55 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-671-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:04:52
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	106007	100.000	26070	1949	1.177	--
总计		106007	100.000	26070			

图56 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-672-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:08:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106513	100.000	26325	1961	1.174	--
总计		106513	100.000	26325			

图57 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-673-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:11:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	104359	100.000	25739	1958	1.174	--
总计		104359	100.000	25739			

图58 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-674-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:15:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:57:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	106360	100.000	26367	1953	1.172	--
总计		106360	100.000	26367			

图59 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-675-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:18:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	106215	100.000	26257	1951	1.174	--
总计		106215	100.000	26257			

图60 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-676-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:22:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	106670	100.000	26311	1944	1.176	--
总计		106670	100.000	26311			

图61 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-677-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:25:27
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104976	100.000	26070	1968	1.177	--
总计		104976	100.000	26070			

图62 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-678-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:28:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	106478	100.000	26425	1964	1.175	--
总计		106478	100.000	26425			

图63 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-679-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:32:20
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105549	100.000	26037	1948	1.172	--
总计		105549	100.000	26037			

图64 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-680-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:35:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105305	100.000	26285	1983	1.167	--
总计		105305	100.000	26285			

图65 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-681-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:39:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105280	100.000	26078	1959	1.174	--
总计		105280	100.000	26078			

图66 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-682-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:42:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	106025	100.000	26325	1969	1.177	--
总计		106025	100.000	26325			

图67 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-683-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:46:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	105603	100.000	26180	1958	1.176	--
总计		105603	100.000	26180			

图68 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-684-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:49:29
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	107085	100.000	26562	1961	1.174	--
总计		107085	100.000	26562			

图69 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-685-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:52:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104660	100.000	26079	1976	1.170	--
总计		104660	100.000	26079			

图70 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-686-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:56:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105932	100.000	26265	1965	1.174	--
总计		105932	100.000	26265			

图71 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-687-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:59:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	105486	100.000	26208	1972	1.172	--
总计		105486	100.000	26208			

图72 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-688-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:03:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	105125	100.000	26309	1990	1.167	--
总计		105125	100.000	26309			

图73 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-689-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:06:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104210	100.000	26036	1992	1.169	--
总计		104210	100.000	26036			

图74 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-690-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:10:05
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	105497	100.000	23060	1472	1.177	--
总计		105497	100.000	23060			

图75 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-691-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:13:31
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	104487	100.000	22388	1425	1.201	--
总计		104487	100.000	22388			

图76 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120821批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-692-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:16:56
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-693-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:20:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	105180	100.000	23089	1476	1.180	--
总计		105180	100.000	23089			

图78 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-694-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:23:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	105135	100.000	22528	1430	1.200	--
总计		105135	100.000	22528			

图79 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-695-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:27:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104829	100.000	22440	1422	1.200	--
总计		104829	100.000	22440			

图80 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-696-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:30:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:58:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	104724	100.000	22448	1418	1.199	--
总计		104724	100.000	22448			

图81 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-697-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:34:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	103695	100.000	22242	1423	1.203	--
总计		103695	100.000	22242			

图82 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-698-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:37:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	98003	100.000	24397	1978	1.176	--
总计		98003	100.000	24397			

图83 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-699-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:40:51
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	91832	100.000	22674	1957	1.179	--
总计		91832	100.000	22674			

图84 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-700-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:44:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	95843	100.000	23763	1956	1.172	--
总计		95843	100.000	23763			

图85 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-701-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:47:39
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	94529	100.000	23545	1975	1.176	--
总计		94529	100.000	23545			

图86 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-702-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:51:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	95005	100.000	23494	1958	1.180	--
总计		95005	100.000	23494			

图87 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-703-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:54:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	91662	100.000	22701	1966	1.179	--
总计		91662	100.000	22701			

图88 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-704-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:57:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104479	100.000	25896	1965	1.171	--
总计		104479	100.000	25896			

图89 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-705-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:01:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	106287	100.000	26458	1975	1.174	--
总计		106287	100.000	26458			

图90 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-706-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:04:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	105158	100.000	26159	1992	1.173	--
总计		105158	100.000	26159			

图91 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-707-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:08:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	106952	100.000	26723	1987	1.169	--
总计		106952	100.000	26723			

图92 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-708-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:11:31
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	105419	100.000	26518	2017	1.166	--
总计		105419	100.000	26518			

图93 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-709-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:14:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	105753	100.000	26283	1995	1.169	--
总计		105753	100.000	26283			

图94 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-710-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:18:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	105093	100.000	25824	1953	1.175	--
总计		105093	100.000	25824			

图95 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-711-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:21:42
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	105805	100.000	26274	1988	1.170	--
总计		105805	100.000	26274			

图96 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-712-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:25:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	104966	100.000	26111	1991	1.165	--
总计		104966	100.000	26111			

图97 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-713-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:28:31
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	106649	100.000	26470	1985	1.171	--
总计		106649	100.000	26470			

图98 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-714-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:31:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105122	100.000	26171	1984	1.172	--
总计		105122	100.000	26171			

图99 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-715-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:35:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	107979	100.000	26713	1972	1.173	--
总计		107979	100.000	26713			

图100 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-716-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:38:42
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	105397	100.000	25995	1980	1.171	--
总计		105397	100.000	25995			

图101 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-717-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:42:05
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	106051	100.000	26592	2017	1.164	--
总计		106051	100.000	26592			

图102 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-718-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:45:29
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	105071	100.000	26135	1993	1.166	--
总计		105071	100.000	26135			

图103 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-719-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:48:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 08:59:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	107902	100.000	26767	1968	1.173	--
总计		107902	100.000	26767			

图104 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-720-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:52:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	104816	100.000	26393	2012	1.161	--
总计		104816	100.000	26393			

图105 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-721-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:55:42
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	107223	100.000	26845	2006	1.162	--
总计		107223	100.000	26845			

图106 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-722-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:59:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104494	100.000	25969	1976	1.172	--
总计		104494	100.000	25969			

图107 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-723-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:02:31
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	105896	100.000	26648	2011	1.161	--
总计		105896	100.000	26648			

图108 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-724-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:05:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105639	100.000	26206	1969	1.171	--
总计		105639	100.000	26206			

图109 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-725-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:09:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	106787	100.000	26636	1986	1.171	--
总计		106787	100.000	26636			

图110 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-726-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:12:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104965	100.000	26400	2011	1.163	--
总计		104965	100.000	26400			

图111 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-727-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:16:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	107055	100.000	26505	1992	1.173	--
总计		107055	100.000	26505			

图112 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-728-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:19:31
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	105435	100.000	23015	1480	1.179	--
总计		105435	100.000	23015			

图113 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-729-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:22:56
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	104664	100.000	22791	1465	1.188	--
总计		104664	100.000	22791			

图114 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-730-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:26:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-731-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:29:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	106701	100.000	23313	1472	1.179	--
总计		106701	100.000	23313			

图116 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-732-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:34:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	105821	100.000	22822	1449	1.192	--
总计		105821	100.000	22822			

图117 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-733-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:38:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	105259	100.000	22524	1428	1.202	--
总计		105259	100.000	22524			

图118 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-734-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:42:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	105357	100.000	22526	1424	1.200	--
总计		105357	100.000	22526			

图119 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-735-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:45:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	105772	100.000	22644	1418	1.198	--
总计		105772	100.000	22644			

图120 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-736-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:49:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	95361	100.000	23761	1985	1.180	--
总计		95361	100.000	23761			

图121 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-737-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:52:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	93690	100.000	23246	1967	1.176	--
总计		93690	100.000	23246			

图122 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-738-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:55:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	94985	100.000	23579	1973	1.175	--
总计		94985	100.000	23579			

图123 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-739-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:59:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	94811	100.000	23602	1975	1.172	--
总计		94811	100.000	23602			

图124 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-740-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:02:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	96550	100.000	24085	1980	1.175	--
总计		96550	100.000	24085			

图125 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-741-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:06:13
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:00:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	95266	100.000	23634	1960	1.176	--
总计		95266	100.000	23634			

图126 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-742-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:09:39
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	105108	100.000	26044	1969	1.170	--
总计		105108	100.000	26044			

图127 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-743-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:13:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106012	100.000	26360	1980	1.176	--
总计		106012	100.000	26360			

图128 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-744-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:16:29
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	105515	100.000	26336	1983	1.173	--
总计		105515	100.000	26336			

图129 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-745-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:19:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	106807	100.000	26504	1965	1.174	--
总计		106807	100.000	26504			

图130 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-746-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:23:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	107355	100.000	26622	1987	1.173	--
总计		107355	100.000	26622			

图131 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-747-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:26:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	106831	100.000	26626	1979	1.175	--
总计		106831	100.000	26626			

图132 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-748-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:30:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105680	100.000	26282	1974	1.174	--
总计		105680	100.000	26282			

图133 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-749-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:33:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106876	100.000	26498	1973	1.175	--
总计		106876	100.000	26498			

图134 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-750-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:36:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	106079	100.000	26036	1966	1.176	--
总计		106079	100.000	26036			

图135 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-751-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:40:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	107837	100.000	26704	1962	1.174	--
总计		107837	100.000	26704			

图136 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-752-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:43:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	107560	100.000	26752	1984	1.175	--
总计		107560	100.000	26752			

图137 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-753-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:47:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	107684	100.000	26819	1994	1.175	--
总计		107684	100.000	26819			

图138 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-754-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:50:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	105773	100.000	26314	1977	1.171	--
总计		105773	100.000	26314			

图139 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-755-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:54:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	106903	100.000	26653	1980	1.175	--
总计		106903	100.000	26653			

图140 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-756-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:57:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	105689	100.000	26291	1970	1.172	--
总计		105689	100.000	26291			

图141 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-757-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:00:56
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	107799	100.000	26884	1985	1.178	--
总计		107799	100.000	26884			

图142 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-758-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:04:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106840	100.000	26603	1983	1.170	--
总计		106840	100.000	26603			

图143 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-759-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:07:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	107190	100.000	26676	1980	1.172	--
总计		107190	100.000	26676			

图144 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-760-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:11:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	105591	100.000	26088	1971	1.173	--
总计		105591	100.000	26088			

图145 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-761-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:14:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106459	100.000	26425	1975	1.175	--
总计		106459	100.000	26425			

图146 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-762-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:18:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	105923	100.000	26201	1974	1.173	--
总计		105923	100.000	26201			

图147 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-763-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:21:29
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:01:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106132	100.000	26330	1974	1.173	--
总计		106132	100.000	26330			

图148 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-764-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:24:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106755	100.000	26531	1979	1.175	--
总计		106755	100.000	26531			

图149 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-765-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:28:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	106860	100.000	26617	1979	1.173	--
总计		106860	100.000	26617			

图150 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-766-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:31:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.149	105456	100.000	23240	1485	1.179	--
总计		105456	100.000	23240			

图151 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-767-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:35:12
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	105083	100.000	22614	1436	1.198	--
总计		105083	100.000	22614			

图152 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024120921批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-768-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:38:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-769-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:42:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	105356	100.000	22712	1446	1.193	--
总计		105356	100.000	22712			

图154 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-770-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:45:29
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	105636	100.000	22771	1443	1.191	--
总计		105636	100.000	22771			

图155 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-771-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:48:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	105418	100.000	22920	1453	1.191	--
总计		105418	100.000	22920			

图156 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-772-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:52:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	105345	100.000	22903	1458	1.194	--
总计		105345	100.000	22903			

图157 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-773-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:55:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	105431	100.000	22944	1457	1.191	--
总计		105431	100.000	22944			

图158 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-774-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:59:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	96331	100.000	23937	1972	1.177	--
总计		96331	100.000	23937			

图159 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-775-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:02:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	93809	100.000	23334	1969	1.177	--
总计		93809	100.000	23334			

图160 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-776-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:06:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	94590	100.000	23391	1976	1.172	--
总计		94590	100.000	23391			

图161 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-777-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:09:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	93882	100.000	23410	1975	1.176	--
总计		93882	100.000	23410			

图162 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-778-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:12:49
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	97324	100.000	24287	1977	1.172	--
总计		97324	100.000	24287			

图163 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-779-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:16:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	94352	100.000	23497	1983	1.178	--
总计		94352	100.000	23497			

图164 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-780-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:19:38
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	105069	100.000	26037	1969	1.174	--
总计		105069	100.000	26037			

图165 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-781-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:23:02
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	107236	100.000	26665	1976	1.175	--
总计		107236	100.000	26665			

图166 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-782-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:26:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104158	100.000	25958	1977	1.175	--
总计		104158	100.000	25958			

图167 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-783-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:29:51
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	107174	100.000	26518	1976	1.174	--
总计		107174	100.000	26518			

图168 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-784-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:33:16
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	106051	100.000	26175	1954	1.197	--
总计		106051	100.000	26175			

图169 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-785-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:36:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:02:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104484	100.000	25931	1968	1.177	--
总计		104484	100.000	25931			

图170 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-786-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:40:05
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	104876	100.000	26178	1984	1.174	--
总计		104876	100.000	26178			

图171 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-787-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:43:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	108705	100.000	27039	1981	1.170	--
总计		108705	100.000	27039			

图172 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-788-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:46:54
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	105576	100.000	26229	1965	1.171	--
总计		105576	100.000	26229			

图173 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-789-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:50:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	108592	100.000	26926	1960	1.176	--
总计		108592	100.000	26926			

图174 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-790-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:53:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	105241	100.000	26153	1966	1.176	--
总计		105241	100.000	26153			

图175 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-791-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:57:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	104820	100.000	26099	1979	1.177	--
总计		104820	100.000	26099			

图176 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-792-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:00:32
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	105164	100.000	26205	1975	1.174	--
总计		105164	100.000	26205			

图177 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-793-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:03:56
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	107694	100.000	26792	1975	1.177	--
总计		107694	100.000	26792			

图178 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-794-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:07:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104178	100.000	25904	1973	1.173	--
总计		104178	100.000	25904			

图179 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-795-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:10:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	107396	100.000	26744	1973	1.177	--
总计		107396	100.000	26744			

图180 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-796-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:14:10
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104941	100.000	26109	1973	1.175	--
总计		104941	100.000	26109			

图181 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-797-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:17:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104515	100.000	25909	1963	1.174	--
总计		104515	100.000	25909			

图182 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-798-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:20:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104755	100.000	26153	1983	1.173	--
总计		104755	100.000	26153			

图183 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-799-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:24:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	107364	100.000	26741	1978	1.174	--
总计		107364	100.000	26741			

图184 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-800-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:27:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104381	100.000	25891	1969	1.174	--
总计		104381	100.000	25891			

图185 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-801-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:31:10
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	107469	100.000	26652	1968	1.175	--
总计		107469	100.000	26652			

图186 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-802-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:34:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104689	100.000	26007	1971	1.176	--
总计		104689	100.000	26007			

图187 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-803-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:37:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	104185	100.000	25901	1972	1.176	--
总计		104185	100.000	25901			

图188 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-804-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:41:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	106153	100.000	23322	1484	1.177	--
总计		106153	100.000	23322			

图189 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-805-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:44:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	106147	100.000	22837	1433	1.198	--
总计		106147	100.000	22837			

图190 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-806-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:48:16
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图191 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-807-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:51:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:03:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	104989	100.000	22999	1482	1.180	--
总计		104989	100.000	22999			

图192 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-808-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:55:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	105439	100.000	22626	1435	1.199	--
总计		105439	100.000	22626			

图193 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-809-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:58:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	105114	100.000	22635	1437	1.199	--
总计		105114	100.000	22635			

图194 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-810-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:02:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	106375	100.000	22815	1449	1.196	--
总计		106375	100.000	22815			

图195 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-811-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:05:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	106257	100.000	22709	1436	1.202	--
总计		106257	100.000	22709			

图196 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-812-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:08:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	93823	100.000	23553	1995	1.169	--
总计		93823	100.000	23553			

图197 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-813-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:12:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	98767	100.000	24553	1962	1.174	--
总计		98767	100.000	24553			

图198 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-814-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:15:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	94401	100.000	23380	1968	1.180	--
总计		94401	100.000	23380			

图199 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-815-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:19:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	94626	100.000	23471	1980	1.174	--
总计		94626	100.000	23471			

图200 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-816-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:22:38
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	94895	100.000	23275	1977	1.179	--
总计		94895	100.000	23275			

图201 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-817-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:26:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	94457	100.000	23452	1973	1.180	--
总计		94457	100.000	23452			

图202 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-818-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:29:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	104483	100.000	26008	1999	1.174	--
总计		104483	100.000	26008			

图203 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-819-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:32:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	106811	100.000	26489	1967	1.179	--
总计		106811	100.000	26489			

图204 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-820-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:36:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	109279	100.000	26899	1988	1.180	--
总计		109279	100.000	26899			

图205 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-821-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:39:42
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	107351	100.000	26380	1976	1.174	--
总计		107351	100.000	26380			

图206 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-822-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:43:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104497	100.000	26014	1971	1.177	--
总计		104497	100.000	26014			

图207 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-823-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:46:33
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	104711	100.000	25970	1993	1.178	--
总计		104711	100.000	25970			

图208 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-824-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:49:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	103153	100.000	25708	1976	1.178	--
总计		103153	100.000	25708			

图209 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-825-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:53:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	106824	100.000	26646	1982	1.171	--
总计		106824	100.000	26646			

图210 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-826-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:56:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	109869	100.000	27071	1966	1.181	--
总计		109869	100.000	27071			

图211 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-827-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:00:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	108175	100.000	26627	1990	1.175	--
总计		108175	100.000	26627			

图212 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-828-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:03:41
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	106252	100.000	26430	1973	1.179	--
总计		106252	100.000	26430			

图213 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-829-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:07:05
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:04:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	104932	100.000	26031	1960	1.177	--
总计		104932	100.000	26031			

图214 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-830-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:10:32
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	103524	100.000	25806	1981	1.175	--
总计		103524	100.000	25806			

图215 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-831-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:13:57
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	107166	100.000	26740	1979	1.174	--
总计		107166	100.000	26740			

图216 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-832-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:17:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	109251	100.000	27101	1978	1.181	--
总计		109251	100.000	27101			

图217 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-833-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:20:48
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	106876	100.000	26703	1996	1.166	--
总计		106876	100.000	26703			

图218 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-834-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:24:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	105506	100.000	25902	1974	1.176	--
总计		105506	100.000	25902			

图219 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-835-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:27:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	104978	100.000	25864	1970	1.178	--
总计		104978	100.000	25864			

图220 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-836-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:31:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	103127	100.000	25699	1975	1.177	--
总计		103127	100.000	25699			

图221 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-837-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:34:33
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	106303	100.000	26242	1997	1.178	--
总计		106303	100.000	26242			

图222 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-838-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:37:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	108671	100.000	27043	1974	1.176	--
总计		108671	100.000	27043			

图223 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-839-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:41:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	107678	100.000	26741	1961	1.175	--
总计		107678	100.000	26741			

图224 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-840-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:44:51
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	105081	100.000	26137	1967	1.174	--
总计		105081	100.000	26137			

图225 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-841-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:48:16
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	104283	100.000	25958	1981	1.179	--
总计		104283	100.000	25958			

图226 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-842-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:51:42
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	105917	100.000	23354	1493	1.179	--
总计		105917	100.000	23354			

图227 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-5/31-843-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:55:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:05:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	105915	100.000	22896	1438	1.195	--
总计		105915	100.000	22896			

图228 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-22024121021批(150mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2