




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1115-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 10:56:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1116-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 10:59:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	105309	100.000	22541	1389	1.238	--
总计		105309	100.000	22541			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1117-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:02:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	105417	100.000	22421	1371	1.238	--
总计		105417	100.000	22421			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1118-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:06:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.129	105364	100.000	22562	1385	1.239	--
总计		105364	100.000	22562			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1119-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:09:39
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	104987	100.000	22462	1389	1.242	--
总计		104987	100.000	22462			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1120-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:13:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	105669	100.000	22591	1381	1.237	--
总计		105669	100.000	22591			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1121-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:17:29
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.144	89325	100.000	21615	1831	1.230	--
总计		89325	100.000	21615			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1122-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:20:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	85894	100.000	20725	1821	1.234	--
总计		85894	100.000	20725			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1123-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:24:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	90117	100.000	21669	1822	1.233	--
总计		90117	100.000	21669			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1124-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:27:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.144	87029	100.000	21008	1830	1.232	--
总计		87029	100.000	21008			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1125-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:31:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.144	82485	100.000	19847	1824	1.231	--
总计		82485	100.000	19847			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1126-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:34:33
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	87428	100.000	21078	1837	1.234	--
总计		87428	100.000	21078			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1127-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:37:58
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	103960	100.000	24834	1820	1.225	--
总计		103960	100.000	24834			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1128-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:41:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:08:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	104031	100.000	25043	1820	1.228	--
总计		104031	100.000	25043			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1129-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:44:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	102461	100.000	24875	1845	1.230	--
总计		102461	100.000	24875			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1130-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:48:12
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	104485	100.000	25469	1842	1.230	--
总计		104485	100.000	25469			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1131-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:51:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	105431	100.000	25386	1822	1.231	--
总计		105431	100.000	25386			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1132-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:55:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	104739	100.000	25209	1825	1.228	--
总计		104739	100.000	25209			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1133-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 11:58:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104448	100.000	25298	1808	1.223	--
总计		104448	100.000	25298			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1134-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:01:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	104666	100.000	25294	1822	1.229	--
总计		104666	100.000	25294			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1135-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:05:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	105857	100.000	25460	1826	1.227	--
总计		105857	100.000	25460			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1136-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:08:39
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	103516	100.000	25169	1840	1.231	--
总计		103516	100.000	25169			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1137-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:12:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	106978	100.000	25873	1819	1.225	--
总计		106978	100.000	25873			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1138-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:15:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105799	100.000	25620	1826	1.225	--
总计		105799	100.000	25620			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1139-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:18:52
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	104866	100.000	25381	1812	1.225	--
总计		104866	100.000	25381			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1140-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:22:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104659	100.000	25350	1809	1.223	--
总计		104659	100.000	25350			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1141-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:25:42
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	104273	100.000	25026	1799	1.225	--
总计		104273	100.000	25026			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1142-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:29:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105042	100.000	25541	1840	1.228	--
总计		105042	100.000	25541			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1143-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:32:31
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	105461	100.000	25580	1844	1.228	--
总计		105461	100.000	25580			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1144-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:35:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104737	100.000	25434	1818	1.226	--
总计		104737	100.000	25434			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1145-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:39:20
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	103809	100.000	25261	1832	1.227	--
总计		103809	100.000	25261			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1146-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:42:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104560	100.000	25330	1809	1.224	--
总计		104560	100.000	25330			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1147-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:46:10
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	104344	100.000	25253	1814	1.224	--
总计		104344	100.000	25253			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1148-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:49:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105264	100.000	25473	1811	1.228	--
总计		105264	100.000	25473			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1149-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:53:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	105991	100.000	25726	1819	1.222	--
总计		105991	100.000	25726			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1150-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:56:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104286	100.000	25397	1829	1.226	--
总计		104286	100.000	25397			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1151-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 12:59:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:09:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	104952	100.000	22597	1378	1.244	--
总计		104952	100.000	22597			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1152-2 - zzp-2024120821p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:03:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	105682	100.000	22667	1374	1.239	--
总计		105682	100.000	22667			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1153-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:06:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1154-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:10:10
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:10:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105674	100.000	22678	1373	1.241	--
总计		105674	100.000	22678			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1155-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:13:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	104762	100.000	22595	1394	1.242	--
总计		104762	100.000	22595			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1156-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:17:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:10:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	105751	100.000	22646	1384	1.240	--
总计		105751	100.000	22646			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1157-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:20:30
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:10:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	105740	100.000	22515	1377	1.243	--
总计		105740	100.000	22515			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1158-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:23:57
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105168	100.000	22656	1384	1.240	--
总计		105168	100.000	22656			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1159-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:27:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	89608	100.000	21672	1848	1.234	--
总计		89608	100.000	21672			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1160-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:30:49
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	90652	100.000	22002	1806	1.227	--
总计		90652	100.000	22002			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1161-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:34:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	77416	100.000	18838	1827	1.243	--
总计		77416	100.000	18838			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1162-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:37:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	90414	100.000	22156	1834	1.222	--
总计		90414	100.000	22156			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1163-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:41:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	81072	100.000	19775	1826	1.228	--
总计		81072	100.000	19775			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1164-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:44:32
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	88681	100.000	21567	1813	1.227	--
总计		88681	100.000	21567			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1165-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:47:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	102095	100.000	24587	1819	1.228	--
总计		102095	100.000	24587			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1166-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:51:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	102631	100.000	24716	1819	1.229	--
总计		102631	100.000	24716			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1167-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:54:52
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	102867	100.000	24644	1825	1.235	--
总计		102867	100.000	24644			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1168-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 13:58:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	105484	100.000	25503	1805	1.229	--
总计		105484	100.000	25503			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1169-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:01:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105368	100.000	25484	1809	1.234	--
总计		105368	100.000	25484			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1170-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:05:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	102360	100.000	24640	1816	1.232	--
总计		102360	100.000	24640			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1171-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:08:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	103191	100.000	25136	1833	1.227	--
总计		103191	100.000	25136			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1172-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:12:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	104598	100.000	25334	1812	1.228	--
总计		104598	100.000	25334			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1173-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:15:27
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	103109	100.000	25015	1823	1.238	--
总计		103109	100.000	25015			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1174-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:18:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105558	100.000	25551	1820	1.227	--
总计		105558	100.000	25551			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1175-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:22:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:10:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	105033	100.000	25500	1815	1.230	--
总计		105033	100.000	25500			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1176-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:25:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	103536	100.000	25013	1834	1.228	--
总计		103536	100.000	25013			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1177-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:29:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	103503	100.000	24902	1815	1.231	--
总计		103503	100.000	24902			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1178-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:32:38
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	103612	100.000	24941	1815	1.228	--
总计		103612	100.000	24941			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1179-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:36:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	103480	100.000	24947	1795	1.234	--
总计		103480	100.000	24947			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1180-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:39:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104456	100.000	25456	1829	1.231	--
总计		104456	100.000	25456			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1181-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:42:56
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	105250	100.000	25430	1822	1.230	--
总计		105250	100.000	25430			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1182-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:46:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	103234	100.000	25108	1830	1.228	--
总计		103234	100.000	25108			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1183-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:49:49
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	103186	100.000	25108	1831	1.229	--
总计		103186	100.000	25108			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1184-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:53:16
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	103451	100.000	24961	1824	1.230	--
总计		103451	100.000	24961			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1185-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 14:56:42
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:11:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	103082	100.000	24863	1820	1.232	--
总计		103082	100.000	24863			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1186-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:00:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	104443	100.000	25200	1820	1.230	--
总计		104443	100.000	25200			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1187-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:03:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	106367	100.000	25675	1802	1.226	--
总计		106367	100.000	25675			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1188-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:07:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	103434	100.000	25093	1809	1.229	--
总计		103434	100.000	25093			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1189-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:10:27
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105652	100.000	22715	1378	1.240	--
总计		105652	100.000	22715			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1190-2 - zzp-2024120821p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:13:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:11:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	105031	100.000	22639	1404	1.239	--
总计		105031	100.000	22639			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1191-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:17:19
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1192-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:20:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	104784	100.000	22633	1388	1.241	--
总计		104784	100.000	22633			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1193-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:24:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	104913	100.000	22648	1398	1.243	--
总计		104913	100.000	22648			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1194-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:27:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	104769	100.000	22510	1406	1.244	--
总计		104769	100.000	22510			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1195-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:30:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104773	100.000	22588	1384	1.242	--
总计		104773	100.000	22588			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1196-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:34:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104732	100.000	22585	1384	1.241	--
总计		104732	100.000	22585			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1197-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:37:48
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	89488	100.000	21902	1840	1.235	--
总计		89488	100.000	21902			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1198-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:41:13
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:11:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	93143	100.000	22636	1813	1.233	--
总计		93143	100.000	22636			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1199-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:44:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	90369	100.000	21992	1818	1.236	--
总计		90369	100.000	21992			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1200-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:48:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	93615	100.000	22686	1821	1.232	--
总计		93615	100.000	22686			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1201-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:51:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	92972	100.000	22643	1817	1.235	--
总计		92972	100.000	22643			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1202-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:54:51
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	95803	100.000	23428	1840	1.227	--
总计		95803	100.000	23428			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1203-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 15:58:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105102	100.000	25458	1813	1.226	--
总计		105102	100.000	25458			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1204-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:01:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105043	100.000	25443	1829	1.228	--
总计		105043	100.000	25443			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1205-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:05:04
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	104085	100.000	25275	1817	1.232	--
总计		104085	100.000	25275			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1206-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:08:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	104747	100.000	25459	1816	1.230	--
总计		104747	100.000	25459			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1207-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:11:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	104512	100.000	25387	1814	1.230	--
总计		104512	100.000	25387			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1208-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:15:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	106021	100.000	25856	1835	1.229	--
总计		106021	100.000	25856			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1209-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:18:41
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:12:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105635	100.000	25573	1814	1.232	--
总计		105635	100.000	25573			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1210-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:22:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	105300	100.000	25681	1835	1.231	--
总计		105300	100.000	25681			



JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1211-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/10 16:25:30

处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	105532	100.000	25550	1812	1.228	--
总计		105532	100.000	25550			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1212-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:28:57
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105311	100.000	25718	1841	1.229	--
总计		105311	100.000	25718			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1213-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:32:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	105856	100.000	25426	1803	1.227	--
总计		105856	100.000	25426			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1214-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:35:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	104842	100.000	25519	1820	1.228	--
总计		104842	100.000	25519			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1215-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:39:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	105894	100.000	25477	1806	1.226	--
总计		105894	100.000	25477			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1216-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:42:33
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	106064	100.000	25539	1805	1.225	--
总计		106064	100.000	25539			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1217-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:45:57
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	105062	100.000	25487	1814	1.231	--
总计		105062	100.000	25487			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1218-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:49:21
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105032	100.000	25569	1815	1.227	--
总计		105032	100.000	25569			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1219-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:52:45
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105029	100.000	25523	1812	1.230	--
总计		105029	100.000	25523			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1220-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:56:10
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	106062	100.000	25723	1813	1.226	--
总计		106062	100.000	25723			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1221-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 16:59:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:12:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104867	100.000	25564	1835	1.228	--
总计		104867	100.000	25564			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1222-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:02:58
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	106389	100.000	25475	1827	1.227	--
总计		106389	100.000	25475			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1223-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:06:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	105752	100.000	25536	1835	1.232	--
总计		105752	100.000	25536			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1224-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:09:46
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	105361	100.000	25471	1826	1.229	--
总计		105361	100.000	25471			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1225-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:13:10
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105190	100.000	25655	1820	1.228	--
总计		105190	100.000	25655			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1226-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:16:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	106509	100.000	25778	1798	1.229	--
总计		106509	100.000	25778			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1227-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:19:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:13:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104842	100.000	22585	1388	1.242	--
总计		104842	100.000	22585			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1228-2 - zzp-2024120921p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:23:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:13:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	104824	100.000	22564	1386	1.242	--
总计		104824	100.000	22564			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1229-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:26:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1230-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:30:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:13:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	104600	100.000	22537	1388	1.248	--
总计		104600	100.000	22537			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1231-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:33:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	104804	100.000	22554	1386	1.243	--
总计		104804	100.000	22554			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1232-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:37:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104795	100.000	22567	1385	1.244	--
总计		104795	100.000	22567			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1233-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:40:37
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:13:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	104766	100.000	22559	1387	1.244	--
总计		104766	100.000	22559			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1234-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:44:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:13:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	104818	100.000	22686	1392	1.241	--
总计		104818	100.000	22686			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1235-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:47:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	92482	100.000	22270	1835	1.242	--
总计		92482	100.000	22270			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1236-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:50:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	90429	100.000	21887	1816	1.235	--
总计		90429	100.000	21887			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1237-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:54:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	95491	100.000	23067	1828	1.235	--
总计		95491	100.000	23067			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1238-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 17:57:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	92296	100.000	22426	1826	1.234	--
总计		92296	100.000	22426			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1239-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:01:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	95738	100.000	23377	1830	1.230	--
总计		95738	100.000	23377			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1240-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:04:32
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	90760	100.000	22004	1825	1.235	--
总计		90760	100.000	22004			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1241-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:07:57
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	104466	100.000	25215	1838	1.231	--
总计		104466	100.000	25215			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1242-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:11:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	104650	100.000	25585	1848	1.233	--
总计		104650	100.000	25585			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1243-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:14:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104209	100.000	25440	1834	1.227	--
总计		104209	100.000	25440			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1244-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:18:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:13:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	106237	100.000	25591	1838	1.229	--
总计		106237	100.000	25591			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1245-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:21:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	106793	100.000	25968	1827	1.233	--
总计		106793	100.000	25968			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1246-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:25:01
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	105277	100.000	25375	1838	1.235	--
总计		105277	100.000	25375			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1247-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:28:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	104916	100.000	25486	1820	1.229	--
总计		104916	100.000	25486			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1248-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:31:52
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105291	100.000	25710	1824	1.231	--
总计		105291	100.000	25710			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1249-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:35:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105109	100.000	25560	1827	1.228	--
总计		105109	100.000	25560			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1250-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:38:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	106668	100.000	25663	1816	1.233	--
总计		106668	100.000	25663			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1251-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:42:09
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:14:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105992	100.000	25764	1826	1.230	--
总计		105992	100.000	25764			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1252-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:45:33
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:14:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	104599	100.000	25427	1829	1.232	--
总计		104599	100.000	25427			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1253-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:48:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	105701	100.000	25516	1815	1.230	--
总计		105701	100.000	25516			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1254-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:52:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105612	100.000	25812	1845	1.230	--
总计		105612	100.000	25812			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1255-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:55:49
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	105798	100.000	25589	1833	1.231	--
总计		105798	100.000	25589			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1256-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 18:59:16
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	106590	100.000	25849	1819	1.226	--
总计		106590	100.000	25849			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1257-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:02:41
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	105410	100.000	25544	1831	1.232	--
总计		105410	100.000	25544			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1258-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:06:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	104959	100.000	25571	1828	1.232	--
总计		104959	100.000	25571			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1259-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:09:32
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	104292	100.000	25495	1845	1.230	--
总计		104292	100.000	25495			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1260-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:12:58
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	106108	100.000	25779	1834	1.228	--
总计		106108	100.000	25779			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1261-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:16:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:14:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105260	100.000	25645	1824	1.231	--
总计		105260	100.000	25645			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1262-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:19:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105785	100.000	25791	1828	1.230	--
总计		105785	100.000	25791			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1263-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:23:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105846	100.000	25767	1826	1.233	--
总计		105846	100.000	25767			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1264-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:26:41
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	105923	100.000	25478	1839	1.234	--
总计		105923	100.000	25478			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1265-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:30:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	105807	100.000	22774	1398	1.244	--
总计		105807	100.000	22774			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1266-2 - zzp-2024120921p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:33:33
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.129	105898	100.000	22792	1398	1.245	--
总计		105898	100.000	22792			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1267-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:36:59
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:14:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1268-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:40:25
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:14:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	104700	100.000	22812	1405	1.239	--
总计		104700	100.000	22812			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1269-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:43:51
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:15:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	104851	100.000	22862	1404	1.238	--
总计		104851	100.000	22862			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1270-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:47:17
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	104902	100.000	22784	1398	1.238	--
总计		104902	100.000	22784			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1271-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:50:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	105047	100.000	22851	1400	1.240	--
总计		105047	100.000	22851			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1272-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:54:07
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	105099	100.000	22858	1397	1.238	--
总计		105099	100.000	22858			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1273-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 19:57:32
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	89907	100.000	22008	1842	1.233	--
总计		89907	100.000	22008			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1274-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:00:57
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	94178	100.000	22975	1839	1.230	--
总计		94178	100.000	22975			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1275-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:04:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	95542	100.000	23185	1833	1.236	--
总计		95542	100.000	23185			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1276-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:07:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	94400	100.000	22994	1826	1.233	--
总计		94400	100.000	22994			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1277-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:11:11
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:15:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	89619	100.000	21896	1828	1.234	--
总计		89619	100.000	21896			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1278-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:14:36
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	94537	100.000	22950	1834	1.234	--
总计		94537	100.000	22950			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1279-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:18:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:15:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	105002	100.000	25425	1829	1.228	--
总计		105002	100.000	25425			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1280-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:21:24
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	103940	100.000	25198	1836	1.233	--
总计		103940	100.000	25198			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1281-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:24:49
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	102307	100.000	24750	1828	1.237	--
总计		102307	100.000	24750			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1282-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:28:14
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	105269	100.000	25662	1829	1.229	--
总计		105269	100.000	25662			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1283-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:31:39
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	105715	100.000	25686	1842	1.229	--
总计		105715	100.000	25686			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1284-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:35:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	104963	100.000	25488	1840	1.229	--
总计		104963	100.000	25488			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1285-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:38:28
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	106610	100.000	25724	1815	1.232	--
总计		106610	100.000	25724			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1286-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:41:53
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	105024	100.000	25562	1835	1.232	--
总计		105024	100.000	25562			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1287-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:45:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	102684	100.000	24783	1828	1.236	--
总计		102684	100.000	24783			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1288-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:48:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	104870	100.000	25606	1826	1.234	--
总计		104870	100.000	25606			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1289-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:52:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	105571	100.000	25535	1834	1.232	--
总计		105571	100.000	25535			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1290-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:55:31
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	105124	100.000	25467	1828	1.230	--
总计		105124	100.000	25467			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1291-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 20:58:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:15:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	105172	100.000	25701	1845	1.230	--
总计		105172	100.000	25701			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1292-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:02:20
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	103940	100.000	25203	1832	1.233	--
总计		103940	100.000	25203			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1293-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:05:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	102493	100.000	24897	1831	1.233	--
总计		102493	100.000	24897			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1294-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:09:09
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	104642	100.000	25281	1826	1.229	--
总计		104642	100.000	25281			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1295-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:12:34
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	105363	100.000	25527	1834	1.231	--
总计		105363	100.000	25527			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1296-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:15:57
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	105043	100.000	25492	1821	1.228	--
总计		105043	100.000	25492			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1297-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:19:22
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	105408	100.000	25638	1819	1.229	--
总计		105408	100.000	25638			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1298-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:22:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	103748	100.000	25226	1827	1.237	--
总计		103748	100.000	25226			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1299-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:26:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	103292	100.000	25044	1835	1.232	--
总计		103292	100.000	25044			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1300-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:29:35
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	104986	100.000	25552	1836	1.230	--
总计		104986	100.000	25552			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1301-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:33:00
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	105354	100.000	25787	1848	1.228	--
总计		105354	100.000	25787			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1302-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:36:25
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	103878	100.000	25002	1843	1.231	--
总计		103878	100.000	25002			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1303-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:39:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	104770	100.000	22758	1398	1.240	--
总计		104770	100.000	22758			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1304-2 - zzp-22024121021p-rcqx-1-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:43:16
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104753	100.000	22659	1396	1.242	--
总计		104753	100.000	22659			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1305-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:46:43
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1306-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:50:09
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	104806	100.000	22720	1397	1.242	--
总计		104806	100.000	22720			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1307-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:53:35
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	104961	100.000	22815	1402	1.242	--
总计		104961	100.000	22815			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1308-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 21:57:02
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105010	100.000	22796	1403	1.245	--
总计		105010	100.000	22796			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1309-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:00:29
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105082	100.000	22815	1403	1.243	--
总计		105082	100.000	22815			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1310-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:03:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:16:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	105075	100.000	22790	1405	1.242	--
总计		105075	100.000	22790			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1311-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:07:22
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	90018	100.000	21982	1837	1.236	--
总计		90018	100.000	21982			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1312-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:10:47
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	90130	100.000	21914	1834	1.234	--
总计		90130	100.000	21914			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1313-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:14:12
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:16:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	94758	100.000	23007	1834	1.238	--
总计		94758	100.000	23007			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1314-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:17:39
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	93720	100.000	22913	1837	1.232	--
总计		93720	100.000	22913			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1315-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:21:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:17:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	94725	100.000	22928	1830	1.240	--
总计		94725	100.000	22928			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1316-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:24:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	89609	100.000	21841	1837	1.232	--
总计		89609	100.000	21841			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1317-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:27:56
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	105007	100.000	25717	1845	1.229	--
总计		105007	100.000	25717			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1318-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:31:22
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:17:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	104884	100.000	25315	1825	1.235	--
总计		104884	100.000	25315			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1319-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:34:48
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	103355	100.000	24826	1839	1.237	--
总计		103355	100.000	24826			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1320-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:38:15
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	106916	100.000	25882	1834	1.232	--
总计		106916	100.000	25882			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1321-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:41:40
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	102069	100.000	24899	1847	1.234	--
总计		102069	100.000	24899			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1322-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:45:06
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	104776	100.000	25647	1845	1.231	--
总计		104776	100.000	25647			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1323-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:48:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:17:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	106741	100.000	25690	1842	1.232	--
总计		106741	100.000	25690			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1324-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:51:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:17:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	105666	100.000	25697	1829	1.230	--
总计		105666	100.000	25697			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1325-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:55:23
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	103572	100.000	24849	1835	1.236	--
总计		103572	100.000	24849			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1326-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 22:58:50
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	107217	100.000	25990	1825	1.232	--
总计		107217	100.000	25990			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1327-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:02:16
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	103447	100.000	25136	1829	1.231	--
总计		103447	100.000	25136			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1328-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:05:41
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105956	100.000	25807	1837	1.229	--
总计		105956	100.000	25807			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1329-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:09:08
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	105659	100.000	25801	1847	1.232	--
总计		105659	100.000	25801			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1330-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:12:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:17:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	104834	100.000	25558	1825	1.231	--
总计		104834	100.000	25558			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1331-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:16:00
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	103443	100.000	25186	1830	1.231	--
总计		103443	100.000	25186			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1332-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:19:26
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	106500	100.000	25894	1823	1.232	--
总计		106500	100.000	25894			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1333-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:22:52
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.133	102404	100.000	24779	1822	1.234	--
总计		102404	100.000	24779			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1334-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:26:18
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	105624	100.000	25697	1819	1.231	--
总计		105624	100.000	25697			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1335-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:29:44
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	106662	100.000	25934	1822	1.230	--
总计		106662	100.000	25934			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1336-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:33:11
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:17:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	105540	100.000	25643	1827	1.231	--
总计		105540	100.000	25643			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1337-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:36:37
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:18:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	102836	100.000	24958	1831	1.231	--
总计		102836	100.000	24958			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1338-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:40:03
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:18:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	107127	100.000	26034	1825	1.232	--
总计		107127	100.000	26034			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1339-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:43:30
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:18:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	103144	100.000	25071	1825	1.231	--
总计		103144	100.000	25071			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1340-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:46:55
处理时间 (V2) : 2025/01/11 09:18:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	106195	100.000	25512	1806	1.233	--
总计		106195	100.000	25512			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1341-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:50:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:18:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.129	105668	100.000	22855	1409	1.242	--
总计		105668	100.000	22855			




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 10-7/28-1342-2 - zzp-22024121021p-rcqx-2-150mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rc-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250110-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/10 23:53:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 09:18:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	104890	100.000	22792	1414	1.244	--
总计		104890	100.000	22792			