



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

流速: 1.2ml/min

柱温:30°C

波长: 214nm

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-793-2 - zzp-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 100 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/13 11:17:21

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:28

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm) 流速: 1.2ml/min
柱温:30°C 波长: 214nm
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-794-2 - zzp-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:22:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	240515	100.000	25036	3849	1.294	--
总计		240515	100.000	25036			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-795-2 - zzp-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:28:19

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	237396	100.000	24503	3818	1.304	--
总计		237396	100.000	24503			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-796-2 - zzp-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:33:48

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.830	236886	100.000	24496	3817	1.299	--
总计		236886	100.000	24496			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-797-2 - zzp-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:39:17

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	238387	100.000	24608	3854	1.311	--
总计		238387	100.000	24608			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-798-2 - zzp-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:44:46

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.831	237935	100.000	24649	3845	1.304	--
总计		237935	100.000	24649			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-799-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:50:14

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	237269	100.000	24336	3734	1.305	--
总计		237269	100.000	24336			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-800-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:55:42

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	236986	100.000	24328	3753	1.304	--
总计		236986	100.000	24328			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-801-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:01:10

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	224995	100.000	23021	3746	1.297	--
总计		224995	100.000	23021			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-802-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:06:39

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	224976	100.000	22967	3727	1.301	--
总计		224976	100.000	22967			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-803-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:12:07

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	229137	100.000	23508	3771	1.299	--
总计		229137	100.000	23508			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-804-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:17:35

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:24:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	230281	100.000	23624	3738	1.301	--
总计		230281	100.000	23624			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-805-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:23:03

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	238175	100.000	24531	3760	1.307	--
总计		238175	100.000	24531			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-806-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:28:31

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.819	238830	100.000	24520	3740	1.308	--
总计		238830	100.000	24520			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-807-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:34:00

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.822	240798	100.000	24676	3726	1.307	--
总计		240798	100.000	24676			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-808-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:39:28

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	240422	100.000	24646	3742	1.309	--
总计		240422	100.000	24646			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-809-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:44:56

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.830	230169	100.000	23632	3760	1.299	--
总计		230169	100.000	23632			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-810-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:50:24

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	229872	100.000	23556	3754	1.302	--
总计		229872	100.000	23556			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-811-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:55:52

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	250214	100.000	25540	3722	1.314	--
总计		250214	100.000	25540			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-812-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:01:21

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	250632	100.000	25644	3729	1.318	--
总计		250632	100.000	25644			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-813-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:06:49

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	249013	100.000	25497	3742	1.314	--
总计		249013	100.000	25497			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-814-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:12:17

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	249406	100.000	25464	3717	1.316	--
总计		249406	100.000	25464			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-815-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:19:39

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.828	248398	100.000	25472	3747	1.313	--
总计		248398	100.000	25472			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-816-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:25:07

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	248307	100.000	25494	3749	1.316	--
总计		248307	100.000	25494			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-817-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:30:35

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	248157	100.000	25384	3733	1.310	--
总计		248157	100.000	25384			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-818-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:36:03

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	247794	100.000	25376	3737	1.310	--
总计		247794	100.000	25376			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-819-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:41:31

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.830	237940	100.000	24432	3754	1.302	--
总计		237940	100.000	24432			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-820-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:46:59

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.831	239276	100.000	24579	3758	1.301	--
总计		239276	100.000	24579			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-821-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:52:27

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	246758	100.000	25275	3746	1.308	--
总计		246758	100.000	25275			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-822-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:57:55

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.832	246759	100.000	25258	3747	1.310	--
总计		246759	100.000	25258			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-823-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:03:23

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.834	236167	100.000	24172	3765	1.305	--
总计		236167	100.000	24172			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-824-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:08:51

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.834	235424	100.000	24146	3769	1.302	--
总计		235424	100.000	24146			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-825-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:14:20

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.831	248732	100.000	25476	3740	1.312	--
总计		248732	100.000	25476			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-826-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:19:48

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.832	248299	100.000	25438	3747	1.310	--
总计		248299	100.000	25438			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-827-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:25:16

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.832	246538	100.000	25253	3754	1.307	--
总计		246538	100.000	25253			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-828-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:30:45

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	246197	100.000	25254	3763	1.308	--
总计		246197	100.000	25254			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-829-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:36:13

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:25:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.832	248541	100.000	25452	3748	1.310	--
总计		248541	100.000	25452			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-830-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:41:41

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.832	248739	100.000	25450	3749	1.309	--
总计		248739	100.000	25450			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-831-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:47:09

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.831	249771	100.000	25620	3754	1.310	--
总计		249771	100.000	25620			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-832-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:52:37

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	250092	100.000	25627	3742	1.311	--
总计		250092	100.000	25627			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-833-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:58:04

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.834	235313	100.000	24074	3754	1.303	--
总计		235313	100.000	24074			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-834-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:03:31

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	235304	100.000	24133	3753	1.301	--
总计		235304	100.000	24133			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-835-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:08:59

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.822	243860	100.000	24987	3724	1.307	--
总计		243860	100.000	24987			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-836-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:14:27

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.827	243594	100.000	24964	3747	1.309	--
总计		243594	100.000	24964			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-837-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:19:56

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.836	221101	100.000	22723	3782	1.290	--
总计		221101	100.000	22723			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-838-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:25:24

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.836	221299	100.000	22743	3781	1.291	--
总计		221299	100.000	22743			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-839-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:30:52

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	244807	100.000	25045	3756	1.306	--
总计		244807	100.000	25045			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-840-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:36:19

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	244312	100.000	25043	3759	1.306	--
总计		244312	100.000	25043			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-841-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:41:47

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	242430	100.000	24809	3757	1.307	--
总计		242430	100.000	24809			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-842-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:47:15

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	242070	100.000	24811	3754	1.303	--
总计		242070	100.000	24811			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-843-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:52:43

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	240752	100.000	24711	3777	1.304	--
总计		240752	100.000	24711			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-844-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:58:11

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	240742	100.000	24728	3767	1.303	--
总计		240742	100.000	24728			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-845-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:03:39

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.832	244010	100.000	25012	3767	1.304	--
总计		244010	100.000	25012			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-846-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:09:08

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	243226	100.000	24943	3753	1.303	--
总计		243226	100.000	24943			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-847-2 - zzp-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:14:37

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.831	242882	100.000	25294	3876	1.296	--
总计		242882	100.000	25294			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-848-2 - zzp-js3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:20:06

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.838	241704	100.000	25044	3849	1.301	--
总计		241704	100.000	25044			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

流速: 1.2ml/min

柱温:30°C

波长: 214nm

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-849-2 - zzp-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 100 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/13 16:25:36

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:47

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-850-2 - zzp-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:31:06

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.835	243422	100.000	25226	3847	1.298	--
总计		243422	100.000	25226			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-851-2 - zzp-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:36:36

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	242632	100.000	25185	3866	1.298	--
总计		242632	100.000	25185			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-852-2 - zzp-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:42:06

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.836	243122	100.000	25215	3864	1.300	--
总计		243122	100.000	25215			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-853-2 - zzp-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:47:36

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:26:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.837	243807	100.000	25199	3841	1.298	--
总计		243807	100.000	25199			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-854-2 - zzp-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:53:06

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.838	241823	100.000	25182	3882	1.299	--
总计		241823	100.000	25182			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-855-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:58:35

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.835	238848	100.000	24560	3790	1.296	--
总计		238848	100.000	24560			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-856-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:04:04

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.833	239007	100.000	24579	3787	1.298	--
总计		239007	100.000	24579			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-857-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:09:33

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	230306	100.000	23750	3804	1.290	--
总计		230306	100.000	23750			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-858-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:15:02

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	229348	100.000	23675	3790	1.294	--
总计		229348	100.000	23675			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-859-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:20:31

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.827	234839	100.000	24193	3786	1.295	--
总计		234839	100.000	24193			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-860-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:26:00

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.828	234186	100.000	24170	3790	1.297	--
总计		234186	100.000	24170			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-861-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:31:29

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	235789	100.000	24264	3780	1.300	--
总计		235789	100.000	24264			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-862-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:36:59

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.820	236212	100.000	24305	3759	1.301	--
总计		236212	100.000	24305			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-863-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:42:31

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	228933	100.000	23572	3786	1.297	--
总计		228933	100.000	23572			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-864-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:48:00

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	228436	100.000	23528	3792	1.297	--
总计		228436	100.000	23528			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-865-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:53:29

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	236743	100.000	24506	3804	1.295	--
总计		236743	100.000	24506			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-866-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:58:58

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.828	235720	100.000	24254	3783	1.302	--
总计		235720	100.000	24254			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-867-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:04:27

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.828	235706	100.000	24299	3797	1.299	--
总计		235706	100.000	24299			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-868-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:09:56

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.828	235858	100.000	24306	3788	1.298	--
总计		235858	100.000	24306			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-869-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:15:25

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	251165	100.000	25783	3770	1.313	--
总计		251165	100.000	25783			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-870-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:20:55

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.826	251470	100.000	25804	3762	1.312	--
总计		251470	100.000	25804			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-871-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:26:24

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	236806	100.000	24516	3809	1.300	--
总计		236806	100.000	24516			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-872-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:31:54

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	235908	100.000	24296	3777	1.298	--
总计		235908	100.000	24296			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-873-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:37:23

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	243312	100.000	25048	3761	1.306	--
总计		243312	100.000	25048			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-874-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:42:52

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	242649	100.000	25023	3774	1.304	--
总计		242649	100.000	25023			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-875-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:48:21

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.822	245449	100.000	25304	3771	1.307	--
总计		245449	100.000	25304			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-876-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:53:51

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	244932	100.000	25312	3789	1.307	--
总计		244932	100.000	25312			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-877-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:59:18

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	243736	100.000	25089	3776	1.306	--
总计		243736	100.000	25089			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-878-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:04:47

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:27:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	243404	100.000	25028	3782	1.307	--
总计		243404	100.000	25028			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-879-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:10:16

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	246765	100.000	25367	3759	1.310	--
总计		246765	100.000	25367			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-880-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:15:46

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	246611	100.000	25361	3753	1.309	--
总计		246611	100.000	25361			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-881-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:21:15

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	240351	100.000	24762	3762	1.305	--
总计		240351	100.000	24762			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-882-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:26:44

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	240309	100.000	24759	3772	1.304	--
总计		240309	100.000	24759			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-883-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:32:32

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.820	241637	100.000	24908	3763	1.302	--
总计		241637	100.000	24908			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-884-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:38:01

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	242311	100.000	24955	3765	1.304	--
总计		242311	100.000	24955			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-885-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:43:30

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	233735	100.000	24075	3772	1.303	--
总计		233735	100.000	24075			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-886-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:49:00

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	233150	100.000	24039	3779	1.299	--
总计		233150	100.000	24039			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-887-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:54:29

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	244418	100.000	25128	3775	1.307	--
总计		244418	100.000	25128			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-888-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:59:58

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	244882	100.000	25176	3764	1.308	--
总计		244882	100.000	25176			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-889-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:05:27

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	238836	100.000	24547	3768	1.305	--
总计		238836	100.000	24547			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-890-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:10:57

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	238856	100.000	24574	3774	1.302	--
总计		238856	100.000	24574			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-891-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:16:26

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.822	234005	100.000	24133	3780	1.300	--
总计		234005	100.000	24133			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-892-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:21:56

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.822	233579	100.000	24133	3795	1.303	--
总计		233579	100.000	24133			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-893-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:27:26

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.822	236148	100.000	24388	3779	1.298	--
总计		236148	100.000	24388			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-894-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:32:56

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	236728	100.000	24366	3769	1.305	--
总计		236728	100.000	24366			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-895-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:38:25

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	239131	100.000	24593	3772	1.306	--
总计		239131	100.000	24593			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-896-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:43:54

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	238787	100.000	24582	3767	1.305	--
总计		238787	100.000	24582			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-897-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:49:24

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	237808	100.000	24471	3771	1.305	--
总计		237808	100.000	24471			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-898-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:54:53

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.823	237678	100.000	24519	3779	1.304	--
总计		237678	100.000	24519			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-899-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:00:22

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	239681	100.000	24690	3775	1.306	--
总计		239681	100.000	24690			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-900-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:05:51

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.819	239321	100.000	24657	3764	1.305	--
总计		239321	100.000	24657			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-901-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:11:21

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:28:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.816	243995	100.000	25261	3797	1.303	--
总计		243995	100.000	25261			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-902-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:16:50

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:29:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.819	244495	100.000	25174	3772	1.311	--
总计		244495	100.000	25174			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-903-2 - zzp-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:22:20

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:29:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.815	243377	100.000	25411	3858	1.304	--
总计		243377	100.000	25411			



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-110/31-904-2 - zzp-cq3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:27:51

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:29:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	243709	100.000	25338	3845	1.309	--
总计		243709	100.000	25338			