




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30°C
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-905-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:33:19
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:31:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH6.6介质-浆法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-906-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:38:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:31:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.819	243237	100.000	25301	3860	1.304	--
总计		243237	100.000	25301			

图2 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH6.6介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-907-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:44:16
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:31:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.825	239817	100.000	24940	3854	1.307	--
总计		239817	100.000	24940			

图3 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH6.6介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-908-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μ l

进样时间: 2025/01/13 21:49:44

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.824	239762	100.000	24917	3850	1.307	--
总计		239762	100.000	24917			

图4 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH6.6介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-909-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:55:12
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.819	240143	100.000	24956	3853	1.311	--
总计		240143	100.000	24956			

图5 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH6.6介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-910-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:00:40
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.821	240897	100.000	25034	3844	1.310	--
总计		240897	100.000	25034			

图6 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH6.6介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-911-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:06:08
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.816	237632	100.000	24483	3769	1.310	--
总计		237632	100.000	24483			

图7 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-912-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:11:36
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.815	237991	100.000	24501	3753	1.311	--
总计		237991	100.000	24501			

图8 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-913-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:17:04
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	241718	100.000	24926	3758	1.316	--
总计		241718	100.000	24926			

图9 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-浆法-50转-片2
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-914-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:22:32
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	241340	100.000	24945	3778	1.312	--
总计		241340	100.000	24945			

图10 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-915-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:28:00
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	223760	100.000	23078	3765	1.302	--
总计		223760	100.000	23078			

图11 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-浆法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-916-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:33:28
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	223145	100.000	23074	3786	1.303	--
总计		223145	100.000	23074			

图12 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-浆法-50转-片3
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-917-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:38:56
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	233041	100.000	24062	3759	1.307	--
总计		233041	100.000	24062			

图13 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-918-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:44:23
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	233820	100.000	24053	3754	1.310	--
总计		233820	100.000	24053			

图14 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-浆法-50转-片4
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-919-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:49:50
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	233075	100.000	24068	3765	1.312	--
总计		233075	100.000	24068			

图15 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-920-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:55:18

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.816	233764	100.000	24058	3764	1.310	--
总计		233764	100.000	24058			

图16 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-921-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 23:00:46
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.818	224403	100.000	23150	3777	1.301	--
总计		224403	100.000	23150			

图17 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-922-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 23:06:14
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.816	224302	100.000	23175	3779	1.302	--
总计		224302	100.000	23175			

图18 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH6.6介质-浆法-50转-片6
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-923-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 23:11:42
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	243005	100.000	25355	3850	1.304	--
总计		243005	100.000	25355			

图19 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH6.6介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-924-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 23:17:10
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:32:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.819	239929	100.000	24953	3861	1.312	--
总计		239929	100.000	24953			

图20 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH6.6介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2