




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-678-2 - zzp-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:31:09
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
溶剂




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-679-2 - zzp-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:36:38
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	973401	100.000	169536	3146	1.399	--
总计		973401	100.000	169536			

图2 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-680-2 - zzp-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:42:08
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	972862	100.000	169415	3149	1.398	--
总计		972862	100.000	169415			

图3 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30°C
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-681-2 - zzp-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:47:36
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	973038	100.000	169317	3149	1.399	--
总计		973038	100.000	169317			

图4 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30°C
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-682-2 - zzp-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:53:06
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	972300	100.000	169294	3152	1.398	--
总计		972300	100.000	169294			

图5 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-683-2 - zzp-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:58:34
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	972542	100.000	169276	3148	1.398	--
总计		972542	100.000	169276			

图6 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-684-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:04:01

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	841824	100.000	144641	2965	1.408	--
总计		841824	100.000	144641			

图7 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30°C
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-685-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:09:30
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	842254	100.000	145372	2991	1.405	--
总计		842254	100.000	145372			

图8 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-686-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:14:57
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	786744	100.000	135541	2967	1.403	--
总计		786744	100.000	135541			

图9 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-687-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:20:25
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	787997	100.000	135673	2969	1.404	--
总计		787997	100.000	135673			

图10 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30°C
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-688-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:25:53
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	899532	100.000	154608	2964	1.406	--
总计		899532	100.000	154608			

图11 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-689-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:31:21

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	898033	100.000	154571	2969	1.405	--
总计		898033	100.000	154571			

图12 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-690-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:36:50
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	840839	100.000	144919	2975	1.403	--
总计		840839	100.000	144919			

图13 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-691-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:42:17
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	842390	100.000	144972	2971	1.404	--
总计		842390	100.000	144972			

图14 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-692-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:47:45
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	900997	100.000	154910	2969	1.406	--
总计		900997	100.000	154910			

图15 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-693-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:53:14
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	901087	100.000	155062	2974	1.405	--
总计		901087	100.000	155062			

图16 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30°C
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-694-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 22:58:43
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	854566	100.000	146556	2976	1.435	--
总计		854566	100.000	146556			

图17 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30°C
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-695-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 23:04:12
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:44:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	854106	100.000	146555	2977	1.435	--
总计		854106	100.000	146555			

图18 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-696-2 - zzp-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 23:09:41
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	970402	100.000	169316	3160	1.398	--
总计		970402	100.000	169316			

图19 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-113/28-697-2 - zzp-zjtj3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 23:15:10
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:45:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	971035	100.000	169171	3152	1.397	--
总计		971035	100.000	169171			

图20 贝派度酸依折麦布片溶出度测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2