



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-431-3 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 11:17:12
处理时间(V3): 2025/01/14 08:53:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-432-3 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 11:25:48
处理时间(V3): 2025/01/14 08:54:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	75414	100.000	22369	16681	1.208	--
总计		75414	100.000	22369			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-433-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 11:33:15
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	75467	100.000	22301	16655	1.205	--
总计		75467	100.000	22301			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-434-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 11:40:42
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	75275	100.000	22504	16644	1.199	--
总计		75275	100.000	22504			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-435-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 11:48:08
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	75308	100.000	22674	16642	1.198	--
总计		75308	100.000	22674			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-436-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:55:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	75250	100.000	22192	16627	1.207	--
总计		75250	100.000	22192			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-437-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 12:02:59
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	57202	100.000	17194	16488	1.197	--
总计		57202	100.000	17194			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-438-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 12:10:25
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	61213	100.000	18238	16538	1.200	--
总计		61213	100.000	18238			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-439-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 12:17:49
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	63183	100.000	18983	16475	1.195	--
总计		63183	100.000	18983			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-440-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 12:25:15
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	62337	100.000	18583	16424	1.198	--
总计		62337	100.000	18583			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-441-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 12:32:40
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	61827	100.000	18329	16429	1.202	--
总计		61827	100.000	18329			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-442-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 12:40:05
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	60412	100.000	17880	16380	1.197	--
总计		60412	100.000	17880			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-443-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 12:47:30
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	69435	100.000	20737	16292	1.195	--
总计		69435	100.000	20737			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-444-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:54:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	72060	100.000	21184	16366	1.201	--
总计		72060	100.000	21184			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-445-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 13:02:20
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	75705	100.000	22403	16301	1.200	--
总计		75705	100.000	22403			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-446-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:09:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	76317	100.000	22700	16199	1.194	--
总计		76317	100.000	22700			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-447-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 13:18:15
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	69099	100.000	20593	16221	1.194	--
总计		69099	100.000	20593			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-448-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 13:25:41
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	74562	100.000	22122	16290	1.194	--
总计		74562	100.000	22122			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-449-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:33:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.795	75037	100.000	22247	16151	1.194	--
总计		75037	100.000	22247			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-450-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 13:40:31
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	74297	100.000	22104	16276	1.191	--
总计		74297	100.000	22104			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-451-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 13:47:56
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	82340	100.000	24292	16212	1.193	--
总计		82340	100.000	24292			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-452-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:55:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	77601	100.000	22924	16183	1.193	--
总计		77601	100.000	22924			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-453-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 14:02:45
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	77950	100.000	22769	16177	1.192	--
总计		77950	100.000	22769			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-454-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 14:10:10
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	75091	100.000	22082	16179	1.195	--
总计		75091	100.000	22082			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-455-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 14:17:35
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	77521	100.000	23039	16086	1.190	--
总计		77521	100.000	23039			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-456-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:25:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	76478	100.000	22499	16033	1.197	--
总计		76478	100.000	22499			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-457-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 14:32:26
处理时间(V2): 2025/01/14 08:54:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	76633	100.000	22765	16062	1.191	--
总计		76633	100.000	22765			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-458-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:39:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	76078	100.000	22525	15992	1.188	--
总计		76078	100.000	22525			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-459-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 14:47:15
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	79967	100.000	23648	16075	1.192	--
总计		79967	100.000	23648			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-460-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 14:54:40
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	76299	100.000	22550	15988	1.184	--
总计		76299	100.000	22550			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-461-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 15:02:06
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	68242	100.000	19909	15956	1.194	--
总计		68242	100.000	19909			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-462-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 15:09:31
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	74148	100.000	21888	15984	1.190	--
总计		74148	100.000	21888			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-463-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:16:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	78424	100.000	23155	16000	1.188	--
总计		78424	100.000	23155			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-464-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 15:24:22
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	77903	100.000	22870	15958	1.193	--
总计		77903	100.000	22870			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-465-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 15:31:47
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	74572	100.000	21697	15899	1.192	--
总计		74572	100.000	21697			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-466-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 15:39:12
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	77020	100.000	22534	15811	1.190	--
总计		77020	100.000	22534			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-467-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 15:46:38
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.798	74803	100.000	21996	15794	1.190	--
总计		74803	100.000	21996			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-468-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:54:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	72829	100.000	21391	15882	1.191	--
总计		72829	100.000	21391			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-469-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:01:30
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	74379	100.000	21919	15844	1.186	--
总计		74379	100.000	21919			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-470-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:08:55
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	76762	100.000	22576	15833	1.183	--
总计		76762	100.000	22576			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-471-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:16:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	73494	100.000	21197	15774	1.193	--
总计		73494	100.000	21197			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-472-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:23:46
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	75168	100.000	22163	15904	1.188	--
总计		75168	100.000	22163			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-473-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:31:11
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.798	74401	100.000	21858	15737	1.193	--
总计		74401	100.000	21858			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-474-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:38:36
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	71333	100.000	20515	15652	1.191	--
总计		71333	100.000	20515			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-475-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:46:03
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	74590	100.000	21888	15735	1.185	--
总计		74590	100.000	21888			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-476-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:53:28
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	77210	100.000	22573	15670	1.190	--
总计		77210	100.000	22573			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-477-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:00:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	74042	100.000	21391	15642	1.192	--
总计		74042	100.000	21391			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-124/10-478-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:08:18
处理时间(V2): 2025/01/14 08:55:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	73910	100.000	21551	15624	1.189	--
总计		73910	100.000	21551			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-125/10-479-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:15:43
处理时间(V2): 2025/01/14 08:59:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	75981	100.000	22293	15704	1.178	--
总计		75981	100.000	22293			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-125/10-480-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:23:10
处理时间(V2): 2025/01/14 08:59:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	76097	100.000	22098	15583	1.174	--
总计		76097	100.000	22098			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-481-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:30:36
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-482-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:38:04
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.811	77751	100.000	22388	15449	1.184	--
总计		77751	100.000	22388			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-483-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:45:32
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	77514	100.000	22403	15372	1.183	--
总计		77514	100.000	22403			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-484-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:53:00
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	77379	100.000	22190	15359	1.191	--
总计		77379	100.000	22190			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-485-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 18:00:27
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	77375	100.000	22319	15408	1.183	--
总计		77375	100.000	22319			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-486-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:07:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	76979	100.000	22252	15394	1.184	--
总计		76979	100.000	22252			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-487-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 18:15:22
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.809	39685	100.000	11292	15358	1.185	--
总计		39685	100.000	11292			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-488-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:22:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	39492	100.000	11206	15332	1.189	--
总计		39492	100.000	11206			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-489-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 18:30:16
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	40214	100.000	11530	15197	1.184	--
总计		40214	100.000	11530			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-490-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:37:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.816	38225	100.000	10995	15344	1.187	--
总计		38225	100.000	10995			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-491-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:45:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	37475	100.000	10794	15257	1.175	--
总计		37475	100.000	10794			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-492-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 18:52:34
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.813	39867	100.000	11455	15202	1.186	--
总计		39867	100.000	11455			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-493-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:00:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	38032	100.000	10935	15236	1.179	--
总计		38032	100.000	10935			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-494-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 19:07:27
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.810	38308	100.000	10946	15166	1.185	--
总计		38308	100.000	10946			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-495-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 19:14:53
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	40035	100.000	11391	15210	1.179	--
总计		40035	100.000	11391			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-496-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:22:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	39146	100.000	11194	15089	1.177	--
总计		39146	100.000	11194			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-497-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 19:29:45
处理时间(V2): 2025/01/14 09:02:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.814	38773	100.000	11165	15146	1.178	--
总计		38773	100.000	11165			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-498-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 19:37:11
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.813	40210	100.000	11510	15096	1.187	--
总计		40210	100.000	11510			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-499-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:44:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.816	38084	100.000	10806	15028	1.185	--
总计		38084	100.000	10806			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-500-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:52:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.816	40653	100.000	11548	15018	1.182	--
总计		40653	100.000	11548			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-501-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:59:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.810	39150	100.000	11112	15006	1.183	--
总计		39150	100.000	11112			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-502-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 20:06:56
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	38642	100.000	11023	15099	1.186	--
总计		38642	100.000	11023			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-503-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:14:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	36575	100.000	10346	15041	1.187	--
总计		36575	100.000	10346			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-504-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:21:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.814	39286	100.000	11243	15033	1.184	--
总计		39286	100.000	11243			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-505-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:29:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.816	37519	100.000	10655	15016	1.187	--
总计		37519	100.000	10655			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-506-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 20:36:41
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	38108	100.000	10868	15024	1.185	--
总计		38108	100.000	10868			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-507-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:44:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.813	38168	100.000	10906	14935	1.180	--
总计		38168	100.000	10906			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-508-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:51:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	37127	100.000	10585	15008	1.190	--
总计		37127	100.000	10585			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-509-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:59:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	36340	100.000	10272	15045	1.182	--
总计		36340	100.000	10272			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-510-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:06:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	39174	100.000	11124	14956	1.195	--
总计		39174	100.000	11124			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-511-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:13:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	35635	100.000	10134	14880	1.179	--
总计		35635	100.000	10134			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-512-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:21:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	37577	100.000	10585	14933	1.184	--
总计		37577	100.000	10585			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-513-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 21:28:47
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	38223	100.000	10639	14795	1.186	--
总计		38223	100.000	10639			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-514-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:36:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	37417	100.000	10612	14883	1.173	--
总计		37417	100.000	10612			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-515-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:43:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	37388	100.000	10444	14811	1.174	--
总计		37388	100.000	10444			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-516-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:51:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	37176	100.000	10536	14812	1.180	--
总计		37176	100.000	10536			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-517-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 21:58:35
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	35086	100.000	9960	14915	1.180	--
总计		35086	100.000	9960			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-518-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:06:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	36832	100.000	10304	14726	1.180	--
总计		36832	100.000	10304			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-519-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:13:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	38276	100.000	10697	14744	1.182	--
总计		38276	100.000	10697			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-520-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:20:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	38647	100.000	10877	14736	1.181	--
总计		38647	100.000	10877			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-521-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 22:28:22
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	36246	100.000	10157	14805	1.184	--
总计		36246	100.000	10157			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-522-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 22:35:48
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	38778	100.000	10898	14745	1.182	--
总计		38778	100.000	10898			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-523-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:43:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:03:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	37648	100.000	10572	14629	1.187	--
总计		37648	100.000	10572			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-524-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:50:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.834	36338	100.000	10049	14689	1.182	--
总计		36338	100.000	10049			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-525-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:58:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	35936	100.000	10099	14718	1.180	--
总计		35936	100.000	10099			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-526-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:05:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	38253	100.000	10762	14658	1.178	--
总计		38253	100.000	10762			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-527-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:13:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	35563	100.000	9837	14608	1.188	--
总计		35563	100.000	9837			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-528-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 23:20:29
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.834	35039	100.000	9734	14730	1.184	--
总计		35039	100.000	9734			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-529-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:27:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	36084	100.000	10090	14633	1.188	--
总计		36084	100.000	10090			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-530-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 23:35:22
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	36169	100.000	10045	14515	1.182	--
总计		36169	100.000	10045			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-531-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:42:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	35757	100.000	9993	14636	1.185	--
总计		35757	100.000	9993			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-532-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:50:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	38579	100.000	10757	14594	1.181	--
总计		38579	100.000	10757			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-533-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 23:57:43
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	36056	100.000	10078	14498	1.184	--
总计		36056	100.000	10078			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-534-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:05:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	37192	100.000	10256	14385	1.184	--
总计		37192	100.000	10256			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-535-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 00:12:37
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	37224	100.000	10412	14530	1.181	--
总计		37224	100.000	10412			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-536-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 00:20:03
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	35050	100.000	9730	14563	1.182	--
总计		35050	100.000	9730			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-537-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:27:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	36282	100.000	9988	14451	1.192	--
总计		36282	100.000	9988			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-538-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:34:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	34859	100.000	9720	14411	1.180	--
总计		34859	100.000	9720			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-539-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:42:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	34643	100.000	9537	14467	1.188	--
总计		34643	100.000	9537			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-540-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:49:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	36054	100.000	9877	14379	1.196	--
总计		36054	100.000	9877			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-541-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 00:57:09
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	77771	100.000	21560	14341	1.186	--
总计		77771	100.000	21560			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-542-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:04:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	77745	100.000	21568	14285	1.191	--
总计		77745	100.000	21568			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-126/10-543-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:12:01
处理时间(V2): 2025/01/14 09:04:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-127/10-544-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:19:26
处理时间(V2): 2025/01/14 09:06:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	78654	100.000	22381	14423	1.189	--
总计		78654	100.000	22381			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-127/10-545-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:26:51
处理时间(V2): 2025/01/14 09:06:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	78756	100.000	22398	14466	1.189	--
总计		78756	100.000	22398			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-127/10-546-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:34:16
处理时间(V2): 2025/01/14 09:06:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	78740	100.000	22402	14528	1.189	--
总计		78740	100.000	22402			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-127/10-547-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:41:41
处理时间(V2): 2025/01/14 09:06:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	78476	100.000	22327	14432	1.190	--
总计		78476	100.000	22327			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-127/10-548-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:49:05
处理时间(V2): 2025/01/14 09:06:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	78736	100.000	22326	14352	1.191	--
总计		78736	100.000	22326			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-549-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:56:30
处理时间(V2): 2025/01/14 09:07:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	37668	100.000	10301	14005	1.183	--
总计		37668	100.000	10301			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-550-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:03:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:07:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	38222	100.000	10557	14070	1.183	--
总计		38222	100.000	10557			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-551-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:11:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:07:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	39955	100.000	10975	13994	1.177	--
总计		39955	100.000	10975			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-552-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 02:18:43
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	38927	100.000	10696	13938	1.191	--
总计		38927	100.000	10696			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-553-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:26:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	38948	100.000	10706	13943	1.189	--
总计		38948	100.000	10706			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-554-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:33:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	36345	100.000	9973	13844	1.188	--
总计		36345	100.000	9973			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-555-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:40:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	38193	100.000	10278	13716	1.198	--
总计		38193	100.000	10278			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-556-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:48:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	43426	100.000	11803	13734	1.194	--
总计		43426	100.000	11803			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-557-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:55:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	40823	100.000	11039	13707	1.197	--
总计		40823	100.000	11039			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-558-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:03:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	39859	100.000	10793	13661	1.185	--
总计		39859	100.000	10793			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-559-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 03:10:34
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	40967	100.000	11049	13627	1.200	--
总计		40967	100.000	11049			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-560-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:17:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	39866	100.000	10659	13488	1.191	--
总计		39866	100.000	10659			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-561-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:25:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	41897	100.000	11328	13588	1.191	--
总计		41897	100.000	11328			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-562-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:32:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	39432	100.000	10599	13448	1.190	--
总计		39432	100.000	10599			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-563-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:40:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	43830	100.000	11757	13482	1.189	--
总计		43830	100.000	11757			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-564-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:47:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	39222	100.000	10503	13408	1.193	--
总计		39222	100.000	10503			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-565-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:55:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	40365	100.000	10766	13413	1.186	--
总计		40365	100.000	10766			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-566-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:02:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	40209	100.000	10825	13402	1.183	--
总计		40209	100.000	10825			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-567-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:09:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	38483	100.000	10342	13363	1.198	--
总计		38483	100.000	10342			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-568-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:17:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	41841	100.000	11240	13313	1.194	--
总计		41841	100.000	11240			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-569-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:24:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	41398	100.000	11032	13235	1.205	--
总计		41398	100.000	11032			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-570-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:32:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	39573	100.000	10536	13290	1.197	--
总计		39573	100.000	10536			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-571-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:39:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	39081	100.000	10486	13340	1.197	--
总计		39081	100.000	10486			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-572-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 04:46:56
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	37532	100.000	9978	13281	1.192	--
总计		37532	100.000	9978			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-573-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:54:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	38831	100.000	10322	13205	1.198	--
总计		38831	100.000	10322			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-574-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:01:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	39028	100.000	10354	13078	1.201	--
总计		39028	100.000	10354			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-575-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:09:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	40880	100.000	10805	12994	1.206	--
总计		40880	100.000	10805			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-576-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 05:16:34
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	39165	100.000	10405	13111	1.200	--
总计		39165	100.000	10405			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-577-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:23:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:08:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	39822	100.000	10482	12931	1.211	--
总计		39822	100.000	10482			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-578-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:31:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	39162	100.000	10453	13048	1.198	--
总计		39162	100.000	10453			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-579-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:38:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	36186	100.000	9466	12881	1.201	--
总计		36186	100.000	9466			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-580-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 05:46:12
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	39506	100.000	10469	12963	1.203	--
总计		39506	100.000	10469			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-581-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:53:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.834	40794	100.000	10711	12988	1.199	--
总计		40794	100.000	10711			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-582-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:01:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	39518	100.000	10459	12902	1.204	--
总计		39518	100.000	10459			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-583-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:08:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	37521	100.000	9911	12927	1.199	--
总计		37521	100.000	9911			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-584-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 06:15:49
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	40425	100.000	10698	12913	1.206	--
总计		40425	100.000	10698			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-585-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:23:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	35940	100.000	9490	12856	1.203	--
总计		35940	100.000	9490			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-586-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:30:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	38426	100.000	10121	12841	1.192	--
总计		38426	100.000	10121			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-587-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:38:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	39410	100.000	10335	12742	1.204	--
总计		39410	100.000	10335			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-588-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:45:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	37230	100.000	9801	12803	1.197	--
总计		37230	100.000	9801			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-589-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:52:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	38024	100.000	9908	12732	1.197	--
总计		38024	100.000	9908			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-590-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:00:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	35055	100.000	9188	12830	1.203	--
总计		35055	100.000	9188			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-591-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:07:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	37445	100.000	9763	12708	1.207	--
总计		37445	100.000	9763			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-592-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:15:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	39042	100.000	10205	12838	1.204	--
总计		39042	100.000	10205			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-593-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:22:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	40914	100.000	10731	12709	1.203	--
总计		40914	100.000	10731			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-594-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:29:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	36402	100.000	9589	12769	1.204	--
总计		36402	100.000	9589			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-595-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 07:37:17
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	38173	100.000	9957	12662	1.206	--
总计		38173	100.000	9957			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-596-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:44:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	35471	100.000	9300	12771	1.197	--
总计		35471	100.000	9300			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-597-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 07:52:07
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	35078	100.000	9214	12722	1.196	--
总计		35078	100.000	9214			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-598-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:59:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	37501	100.000	9759	12749	1.204	--
总计		37501	100.000	9759			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-599-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 08:06:58
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	38289	100.000	9986	12731	1.197	--
总计		38289	100.000	9986			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-600-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 08:14:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	36557	100.000	9580	12756	1.196	--
总计		36557	100.000	9580			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-601-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 08:21:50
处理时间(V2): 2025/01/14 09:09:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	37049	100.000	9666	12737	1.203	--
总计		37049	100.000	9666			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-128/10-602-2 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 08:29:15
处理时间 (V2): 2025/01/14 09:09:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	36194	100.000	9467	12655	1.195	--
总计		36194	100.000	9467			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-130/10-603-3 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 08:36:41
处理时间(V3): 2025/01/14 09:14:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	77144	100.000	20130	12644	1.205	--
总计		77144	100.000	20130			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-130/10-604-3 - cbzj-8153342p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX259-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 08:44:07
处理时间(V3): 2025/01/14 09:14:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	76923	100.000	20041	12630	1.202	--
总计		76923	100.000	20041			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							