



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1238-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 11:17:18
处理时间(V2): 2025/01/14 09:15:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1239-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 11:27:08
处理时间(V2): 2025/01/14 09:15:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	76182	100.000	23183	17329	1.311	--
总计		76182	100.000	23183			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1240-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:34:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:15:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	76120	100.000	23285	17359	1.307	--
总计		76120	100.000	23285			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1241-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 11:41:59
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	76018	100.000	23437	17362	1.306	--
总计		76018	100.000	23437			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1242-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:49:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.801	75543	100.000	22827	17327	1.309	--
总计		75543	100.000	22827			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1243-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:56:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	75952	100.000	23317	17379	1.312	--
总计		75952	100.000	23317			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1244-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:04:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	63232	100.000	19371	17252	1.314	--
总计		63232	100.000	19371			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1245-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:11:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	59577	100.000	18217	17294	1.304	--
总计		59577	100.000	18217			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1246-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:19:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	61161	100.000	18787	17350	1.311	--
总计		61161	100.000	18787			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1247-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:26:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	61847	100.000	18921	17288	1.307	--
总计		61847	100.000	18921			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1248-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:33:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	63376	100.000	19233	17172	1.314	--
总计		63376	100.000	19233			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1249-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 12:41:17
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	60617	100.000	18316	17196	1.312	--
总计		60617	100.000	18316			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1250-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:48:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	71456	100.000	22012	17256	1.305	--
总计		71456	100.000	22012			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1251-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:56:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	74918	100.000	22958	17163	1.316	--
总计		74918	100.000	22958			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1252-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:03:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	77559	100.000	23800	17166	1.311	--
总计		77559	100.000	23800			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1253-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:10:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	74014	100.000	22461	17215	1.310	--
总计		74014	100.000	22461			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1254-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:18:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	75240	100.000	22949	17178	1.309	--
总计		75240	100.000	22949			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1255-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:25:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	72883	100.000	22237	17171	1.318	--
总计		72883	100.000	22237			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1256-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:33:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	76374	100.000	23375	17216	1.307	--
总计		76374	100.000	23375			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1257-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:40:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	76670	100.000	23409	17260	1.311	--
总计		76670	100.000	23409			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1258-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:48:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	79374	100.000	24319	17233	1.306	--
总计		79374	100.000	24319			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1259-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:55:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	80653	100.000	24416	17172	1.318	--
总计		80653	100.000	24416			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1260-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:02:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	79524	100.000	24362	17224	1.311	--
总计		79524	100.000	24362			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1261-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:10:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	82978	100.000	25289	17174	1.309	--
总计		82978	100.000	25289			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1262-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:17:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	74769	100.000	22869	17183	1.312	--
总计		74769	100.000	22869			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1263-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:25:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	76464	100.000	23154	17162	1.316	--
总计		76464	100.000	23154			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1264-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:32:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	80929	100.000	24516	17236	1.318	--
总计		80929	100.000	24516			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1265-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:39:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:16:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	80091	100.000	24326	17213	1.317	--
总计		80091	100.000	24326			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1266-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:47:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	82908	100.000	25378	17186	1.314	--
总计		82908	100.000	25378			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1267-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:54:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	78639	100.000	23914	17164	1.308	--
总计		78639	100.000	23914			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1268-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:02:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	75798	100.000	23192	17224	1.313	--
总计		75798	100.000	23192			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1269-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 15:09:33
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	74983	100.000	22766	17264	1.318	--
总计		74983	100.000	22766			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1270-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:16:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	74433	100.000	22851	17238	1.308	--
总计		74433	100.000	22851			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1271-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:24:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	77275	100.000	23372	17131	1.314	--
总计		77275	100.000	23372			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1272-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:31:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	77844	100.000	23583	17252	1.316	--
总计		77844	100.000	23583			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1273-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:39:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	76348	100.000	23227	17228	1.307	--
总计		76348	100.000	23227			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1274-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:46:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	72282	100.000	21817	17122	1.321	--
总计		72282	100.000	21817			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1275-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:54:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	76361	100.000	23339	17142	1.313	--
总计		76361	100.000	23339			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1276-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:01:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	74566	100.000	22789	17175	1.308	--
总计		74566	100.000	22789			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1277-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:08:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.809	77419	100.000	23392	17239	1.323	--
总计		77419	100.000	23392			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1278-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:16:16
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	78320	100.000	23768	17135	1.312	--
总计		78320	100.000	23768			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1279-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 16:23:41
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	76682	100.000	23212	17122	1.318	--
总计		76682	100.000	23212			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1280-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:31:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	78657	100.000	24060	17191	1.316	--
总计		78657	100.000	24060			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1281-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:38:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.798	75084	100.000	22935	17120	1.307	--
总计		75084	100.000	22935			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1282-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:45:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	76921	100.000	23545	17197	1.312	--
总计		76921	100.000	23545			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1283-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:53:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	77905	100.000	23459	17112	1.320	--
总计		77905	100.000	23459			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1284-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:00:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	80170	100.000	24538	17081	1.313	--
总计		80170	100.000	24538			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1285-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:08:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	78424	100.000	23913	17108	1.308	--
总计		78424	100.000	23913			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1286-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:15:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	75915	100.000	23171	17049	1.313	--
总计		75915	100.000	23171			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1287-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:23:00
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.797	75894	100.000	23167	16947	1.308	--
总计		75894	100.000	23167			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1288-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:30:27
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1289-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:37:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	76256	100.000	23221	16953	1.307	--
总计		76256	100.000	23221			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1290-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:45:19
处理时间(V2): 2025/01/14 09:17:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	75951	100.000	23131	16966	1.310	--
总计		75951	100.000	23131			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1291-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/13 17:52:46
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	76320	100.000	23047	16972	1.317	--
总计		76320	100.000	23047			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1292-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:00:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.799	76144	100.000	22978	16901	1.316	--
总计		76144	100.000	22978			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1293-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:07:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.800	76085	100.000	22968	16876	1.316	--
总计		76085	100.000	22968			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1294-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:15:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	39527	100.000	11964	16919	1.307	--
总计		39527	100.000	11964			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1295-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:22:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	40428	100.000	12203	16981	1.305	--
总计		40428	100.000	12203			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1296-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:29:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	41584	100.000	12472	16936	1.319	--
总计		41584	100.000	12472			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1297-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:37:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.809	41467	100.000	12345	16928	1.319	--
总计		41467	100.000	12345			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1298-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:44:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.804	42453	100.000	12874	16835	1.304	--
总计		42453	100.000	12874			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1299-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:52:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	41526	100.000	12525	16933	1.313	--
总计		41526	100.000	12525			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1300-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:59:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.803	37550	100.000	11373	16861	1.308	--
总计		37550	100.000	11373			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1301-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:07:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.809	41119	100.000	12257	16866	1.325	--
总计		41119	100.000	12257			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1302-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:14:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.809	40468	100.000	12026	16819	1.319	--
总计		40468	100.000	12026			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1303-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:22:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	39423	100.000	11848	16814	1.307	--
总计		39423	100.000	11848			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1304-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:29:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.813	40132	100.000	12177	16903	1.308	--
总计		40132	100.000	12177			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1305-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:36:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.814	42314	100.000	12797	16780	1.312	--
总计		42314	100.000	12797			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1306-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:44:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	38339	100.000	11538	16739	1.312	--
总计		38339	100.000	11538			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1307-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:51:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.810	39706	100.000	11844	16763	1.312	--
总计		39706	100.000	11844			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1308-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:59:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	38290	100.000	11507	16723	1.318	--
总计		38290	100.000	11507			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1309-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:06:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	40014	100.000	12054	16771	1.313	--
总计		40014	100.000	12054			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1310-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:14:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.814	40675	100.000	12278	16746	1.298	--
总计		40675	100.000	12278			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1311-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:21:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.817	40301	100.000	11956	16897	1.312	--
总计		40301	100.000	11956			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1312-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:28:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.813	38921	100.000	11764	16758	1.302	--
总计		38921	100.000	11764			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1313-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:36:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	38231	100.000	11544	16796	1.303	--
总计		38231	100.000	11544			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1314-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:43:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	39846	100.000	11987	16740	1.317	--
总计		39846	100.000	11987			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1315-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:51:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:18:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.809	37147	100.000	11040	16630	1.309	--
总计		37147	100.000	11040			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1316-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:58:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.818	37179	100.000	11096	16797	1.310	--
总计		37179	100.000	11096			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1317-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:06:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	40622	100.000	12201	16901	1.312	--
总计		40622	100.000	12201			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1318-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:13:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	36915	100.000	10921	16765	1.314	--
总计		36915	100.000	10921			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1319-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:21:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	36998	100.000	10983	16742	1.307	--
总计		36998	100.000	10983			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1320-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:28:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	37409	100.000	11249	16691	1.301	--
总计		37409	100.000	11249			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1321-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:35:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	40343	100.000	12077	16740	1.300	--
总计		40343	100.000	12077			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1322-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:43:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	38388	100.000	11500	16562	1.310	--
总计		38388	100.000	11500			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1323-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:50:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	39595	100.000	11814	16680	1.316	--
总计		39595	100.000	11814			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1324-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:58:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	36422	100.000	10858	16763	1.307	--
总计		36422	100.000	10858			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1325-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:05:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	38042	100.000	11254	16697	1.314	--
总计		38042	100.000	11254			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1326-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:13:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	38308	100.000	11243	16524	1.314	--
总计		38308	100.000	11243			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1327-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:20:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	37363	100.000	10957	16622	1.319	--
总计		37363	100.000	10957			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1328-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:28:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	38923	100.000	11582	16652	1.315	--
总计		38923	100.000	11582			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1329-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:35:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	38204	100.000	11466	16723	1.308	--
总计		38204	100.000	11466			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1330-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:42:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	37775	100.000	11132	16649	1.319	--
总计		37775	100.000	11132			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1331-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:50:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	35611	100.000	10662	16667	1.299	--
总计		35611	100.000	10662			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1332-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:57:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	35150	100.000	10557	16613	1.299	--
总计		35150	100.000	10557			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1333-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:05:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	36177	100.000	10726	16539	1.314	--
总计		36177	100.000	10726			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1334-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:12:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	37153	100.000	11012	16614	1.309	--
总计		37153	100.000	11012			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1335-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:20:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	39202	100.000	11586	16566	1.322	--
总计		39202	100.000	11586			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1336-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:27:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.834	34325	100.000	10119	16635	1.309	--
总计		34325	100.000	10119			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1337-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:35:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	35778	100.000	10571	16500	1.313	--
总计		35778	100.000	10571			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1338-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:42:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	37446	100.000	11096	16621	1.309	--
总计		37446	100.000	11096			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1339-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:49:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	36003	100.000	10749	16600	1.299	--
总计		36003	100.000	10749			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1340-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:57:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:19:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	33284	100.000	9795	16666	1.308	--
总计		33284	100.000	9795			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1341-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:04:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	37771	100.000	11264	16622	1.304	--
总计		37771	100.000	11264			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1342-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:12:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	36635	100.000	10910	16573	1.300	--
总计		36635	100.000	10910			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1343-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:19:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	36011	100.000	10477	16358	1.318	--
总计		36011	100.000	10477			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1344-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:27:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	37106	100.000	11067	16620	1.297	--
总计		37106	100.000	11067			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1345-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:34:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	36632	100.000	10830	16560	1.307	--
总计		36632	100.000	10830			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1346-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:41:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.834	36985	100.000	10892	16641	1.316	--
总计		36985	100.000	10892			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1347-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:49:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	34902	100.000	10415	16629	1.313	--
总计		34902	100.000	10415			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1348-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 00:56:48
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	75578	100.000	22401	16616	1.315	--
总计		75578	100.000	22401			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1349-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:04:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	75891	100.000	22367	16591	1.308	--
总计		75891	100.000	22367			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1350-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:11:40
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1351-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:19:05
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	75381	100.000	22333	16478	1.304	--
总计		75381	100.000	22333			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1352-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:26:30
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	75392	100.000	22426	16480	1.308	--
总计		75392	100.000	22426			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1353-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 01:33:56
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	75246	100.000	22397	16547	1.308	--
总计		75246	100.000	22397			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1354-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:41:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	75216	100.000	22435	16525	1.303	--
总计		75216	100.000	22435			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1355-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:48:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	75143	100.000	22251	16526	1.304	--
总计		75143	100.000	22251			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1356-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:56:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	40954	100.000	12003	16515	1.309	--
总计		40954	100.000	12003			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1357-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 02:03:35
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	39230	100.000	11593	16581	1.305	--
总计		39230	100.000	11593			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1358-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:10:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	39237	100.000	11611	16524	1.300	--
总计		39237	100.000	11611			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1359-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:18:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	41143	100.000	12136	16557	1.307	--
总计		41143	100.000	12136			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1360-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:25:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	39550	100.000	11711	16541	1.308	--
总计		39550	100.000	11711			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1361-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:33:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	39007	100.000	11611	16477	1.304	--
总计		39007	100.000	11611			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1362-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:40:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	41905	100.000	12392	16524	1.310	--
总计		41905	100.000	12392			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1363-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:48:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	39728	100.000	11754	16495	1.304	--
总计		39728	100.000	11754			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1364-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:55:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	41297	100.000	12244	16520	1.308	--
总计		41297	100.000	12244			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1365-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:02:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:20:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	43048	100.000	12753	16521	1.309	--
总计		43048	100.000	12753			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1366-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:10:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	40587	100.000	12014	16460	1.309	--
总计		40587	100.000	12014			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1367-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:17:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	40485	100.000	12046	16553	1.301	--
总计		40485	100.000	12046			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1368-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:25:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	39288	100.000	11713	16529	1.306	--
总计		39288	100.000	11713			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1369-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:32:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	40345	100.000	11897	16540	1.311	--
总计		40345	100.000	11897			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1370-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:39:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	40860	100.000	12104	16550	1.300	--
总计		40860	100.000	12104			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1371-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:47:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	42631	100.000	12696	16465	1.300	--
总计		42631	100.000	12696			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1372-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 03:54:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.834	39843	100.000	11594	16445	1.313	--
总计		39843	100.000	11594			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1373-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:02:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	41846	100.000	12321	16571	1.305	--
总计		41846	100.000	12321			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1374-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:09:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	41302	100.000	12219	16357	1.303	--
总计		41302	100.000	12219			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1375-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:16:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	40859	100.000	12150	16411	1.300	--
总计		40859	100.000	12150			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1376-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:24:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	40336	100.000	11958	16556	1.304	--
总计		40336	100.000	11958			

检测器A Ch2 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1377-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:31:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	41990	100.000	12555	16496	1.299	--
总计		41990	100.000	12555			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1378-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:39:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	39974	100.000	11913	16587	1.300	--
总计		39974	100.000	11913			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1379-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:46:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.834	41149	100.000	12064	16514	1.314	--
总计		41149	100.000	12064			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1380-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 04:53:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	40479	100.000	11956	16455	1.313	--
总计		40479	100.000	11956			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1381-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:01:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	39449	100.000	11769	16593	1.310	--
总计		39449	100.000	11769			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1382-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:08:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	39780	100.000	11795	16428	1.306	--
总计		39780	100.000	11795			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1383-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:16:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	40471	100.000	11916	16504	1.310	--
总计		40471	100.000	11916			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1384-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:23:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	39008	100.000	11574	16464	1.301	--
总计		39008	100.000	11574			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1385-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:31:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	40563	100.000	11976	16415	1.312	--
总计		40563	100.000	11976			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1386-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:38:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	38829	100.000	11510	16438	1.302	--
总计		38829	100.000	11510			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1387-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:45:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	39064	100.000	11625	16441	1.304	--
总计		39064	100.000	11625			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1388-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 05:53:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	41788	100.000	12441	16378	1.301	--
总计		41788	100.000	12441			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1389-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:00:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.830	40682	100.000	12107	16462	1.305	--
总计		40682	100.000	12107			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1390-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:08:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.835	36690	100.000	10750	16515	1.309	--
总计		36690	100.000	10750			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1391-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:15:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:21:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.831	38465	100.000	11442	16450	1.299	--
总计		38465	100.000	11442			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1392-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:22:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	40178	100.000	11855	16504	1.317	--
总计		40178	100.000	11855			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1393-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:30:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	39332	100.000	11684	16494	1.303	--
总计		39332	100.000	11684			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1394-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 06:37:37
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	38899	100.000	11420	16513	1.313	--
总计		38899	100.000	11420			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1395-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:45:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	39801	100.000	11792	16450	1.315	--
总计		39801	100.000	11792			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1396-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:52:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	38140	100.000	11291	16525	1.301	--
总计		38140	100.000	11291			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1397-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 06:59:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	38287	100.000	11343	16408	1.303	--
总计		38287	100.000	11343			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1398-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:07:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	38228	100.000	11358	16554	1.300	--
总计		38228	100.000	11358			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1399-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:14:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	36801	100.000	10925	16497	1.309	--
总计		36801	100.000	10925			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1400-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:22:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	38746	100.000	11453	16371	1.305	--
总计		38746	100.000	11453			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1401-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:29:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	39822	100.000	11771	16495	1.310	--
总计		39822	100.000	11771			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1402-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:36:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	38741	100.000	11536	16545	1.299	--
总计		38741	100.000	11536			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1403-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:44:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	37705	100.000	11192	16606	1.303	--
总计		37705	100.000	11192			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1404-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:51:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	36722	100.000	10925	16523	1.303	--
总计		36722	100.000	10925			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1405-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 07:59:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	38313	100.000	11405	16481	1.302	--
总计		38313	100.000	11405			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1406-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 08:06:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	36719	100.000	10946	16547	1.303	--
总计		36719	100.000	10946			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1407-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 08:13:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.832	37635	100.000	11174	16426	1.304	--
总计		37635	100.000	11174			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1408-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 08:21:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.833	36773	100.000	10863	16390	1.309	--
总计		36773	100.000	10863			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1409-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 08:28:43
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	38039	100.000	11260	16483	1.307	--
总计		38039	100.000	11260			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1410-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 08:36:08
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.829	76294	100.000	22666	16533	1.312	--
总计		76294	100.000	22666			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-131/7-1411-2 - cbzj-8153342p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RCD-FX256-梯度AC.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250113-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/14 08:43:33
处理时间(V2): 2025/01/14 09:22:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min
波长:360/283nm


版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	76159	100.000	22654	16451	1.308	--
总计		76159	100.000	22654			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							