




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-75/27-893-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:03:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:24:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-75/27-894-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:06:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:24:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	194195	100.000	44598	1708	1.162	--
总计		194195	100.000	44598			

图2 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-75/27-895-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 17:09:33
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:24:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	193966	100.000	44582	1710	1.163	--
总计		193966	100.000	44582			

图3 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-75/27-896-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 17:12:26
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:24:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	193588	100.000	44516	1706	1.163	--
总计		193588	100.000	44516			

图4 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-75/27-897-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:15:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:24:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	194530	100.000	44609	1706	1.162	--
总计		194530	100.000	44609			

图5 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-75/27-898-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:18:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:24:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	194199	100.000	44629	1711	1.162	--
总计		194199	100.000	44629			

图6 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-75/27-899-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:21:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:24:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图7 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-76/27-900-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:23:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:25:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	2597	100.000	645	2153	1.218	--
总计		2597	100.000	645			

图8 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-77/27-901-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:26:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:26:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图9 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-77/27-902-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 17:29:38
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:26:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图10 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-77/27-903-4 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:32:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V4) : 2025/01/13 15:26:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图11 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-78/27-904-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 17:35:20
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:27:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	2201	100.000	539	2129	1.257	--
总计		2201	100.000	539			

图12 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-78/27-905-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 17:38:12
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:27:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1527	100.000	380	2141	1.235	--
总计		1527	100.000	380			

图13 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-78/27-906-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:41:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:27:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1620	100.000	398	2099	1.233	--
总计		1620	100.000	398			

图14 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-78/27-907-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 17:43:54
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:27:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	2170	100.000	543	2141	1.185	--
总计		2170	100.000	543			

图15 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-78/27-908-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:46:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:27:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	2114	100.000	526	2179	1.213	--
总计		2114	100.000	526			

图16 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-79/27-909-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 17:49:37
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:27:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图17 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-910-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 17:52:28
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	1530	100.000	378	2119	1.204	--
总计		1530	100.000	378			

图18 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-911-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:55:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1329	100.000	331	2145	1.185	--
总计		1329	100.000	331			

图19 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-912-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 17:58:11

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1470	100.000	362	2109	1.221	--
总计		1470	100.000	362			

图20 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-913-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:01:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1674	100.000	420	2125	1.191	--
总计		1674	100.000	420			

图21 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-914-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:03:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	3010	100.000	745	2137	1.243	--
总计		3010	100.000	745			

图22 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-915-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:06:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	3254	100.000	804	2145	1.219	--
总计		3254	100.000	804			

图23 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-916-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 18:09:38
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	1444	100.000	352	2085	1.249	--
总计		1444	100.000	352			

图24 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-917-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:12:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1227	100.000	310	2166	1.221	--
总计		1227	100.000	310			

图25 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-918-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 18:15:20
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1329	100.000	336	2178	1.221	--
总计		1329	100.000	336			

图26 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-919-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 18:18:12

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1523	100.000	375	2098	1.285	--
总计		1523	100.000	375			

图27 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-920-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 18:21:03

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1360	100.000	333	2052	1.241	--
总计		1360	100.000	333			

图28 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-921-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:23:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	1395	100.000	341	2062	1.211	--
总计		1395	100.000	341			

图29 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-922-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 18:26:45
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1340	100.000	334	2175	1.170	--
总计		1340	100.000	334			

图30 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-923-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 18:29:36
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1236	100.000	305	2107	1.251	--
总计		1236	100.000	305			

图31 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-924-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 18:32:27

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1193	100.000	299	2151	1.230	--
总计		1193	100.000	299			

图32 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-925-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 18:35:18

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1414	100.000	350	2165	1.211	--
总计		1414	100.000	350			

图33 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-926-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 18:38:08

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1262	100.000	310	2078	1.224	--
总计		1262	100.000	310			

图34 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-927-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:41:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1258	100.000	306	2076	1.225	--
总计		1258	100.000	306			

图35 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-928-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:43:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1225	100.000	304	2143	1.166	--
总计		1225	100.000	304			

图36 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-929-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:46:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1098	100.000	276	2204	1.175	--
总计		1098	100.000	276			

图37 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-930-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 18:49:34

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1060	100.000	262	2136	1.245	--
总计		1060	100.000	262			

图38 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-931-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 18:52:25

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:29:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1268	100.000	316	2174	1.268	--
总计		1268	100.000	316			

图39 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-932-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 18:55:16

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1097	100.000	275	2160	1.217	--
总计		1097	100.000	275			

图40 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-933-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 18:58:07
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1163	100.000	289	2136	1.169	--
总计		1163	100.000	289			

图41 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-934-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:00:57
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1141	100.000	286	2192	1.236	--
总计		1141	100.000	286			

图42 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-935-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 19:03:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1052	100.000	262	2091	1.177	--
总计		1052	100.000	262			

图43 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-936-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:06:40
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	3089	100.000	763	2167	1.253	--
总计		3089	100.000	763			

图44 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-937-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:09:31
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1185	100.000	295	2062	1.208	--
总计		1185	100.000	295			

图45 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-938-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 19:12:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	979	100.000	247	2165	1.229	--
总计		979	100.000	247			

图46 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-939-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:15:12
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1088	100.000	269	2128	1.166	--
总计		1088	100.000	269			

图47 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-940-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:18:03
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1057	100.000	259	2093	1.200	--
总计		1057	100.000	259			

图48 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-941-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:20:55
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	932	100.000	236	2181	1.148	--
总计		932	100.000	236			

图49 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-942-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:23:46
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1007	100.000	248	2077	1.271	--
总计		1007	100.000	248			

图50 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-943-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:26:37
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1182	100.000	286	2059	1.221	--
总计		1182	100.000	286			

图51 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-944-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:29:29
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	955	100.000	238	2146	1.240	--
总计		955	100.000	238			

图52 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-945-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:32:21
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1076	100.000	268	2151	1.203	--
总计		1076	100.000	268			

图53 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-946-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:35:13
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	4740	100.000	1165	2115	1.248	--
总计		4740	100.000	1165			

图54 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-947-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 19:38:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	194560	100.000	44798	1711	1.163	--
总计		194560	100.000	44798			

图55 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-948-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 19:40:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	194890	100.000	44891	1714	1.162	--
总计		194890	100.000	44891			

图56 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-949-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 19:43:51

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-950-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 19:46:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	195382	100.000	45031	1715	1.162	--
总计		195382	100.000	45031			

图58 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-951-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 19:49:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	195736	100.000	45058	1716	1.163	--
总计		195736	100.000	45058			

图59 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-952-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 19:52:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	195392	100.000	45002	1714	1.163	--
总计		195392	100.000	45002			

图60 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-953-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 19:55:23
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:30:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	195114	100.000	44874	1715	1.163	--
总计		195114	100.000	44874			

图61 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-954-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 19:58:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:31:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	195036	100.000	44979	1716	1.162	--
总计		195036	100.000	44979			

图62 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-955-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:01:09
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:31:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1939	100.000	485	2170	1.199	--
总计		1939	100.000	485			

图63 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-80/27-956-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:04:01
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:31:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	3040	100.000	745	2119	1.249	--
总计		3040	100.000	745			

图64 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-81/27-957-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 20:06:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:34:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图65 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-81/27-958-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 20:09:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:34:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图66 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-81/27-959-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 20:12:36

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:35:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图67 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-82/27-960-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:15:28
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:35:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	2353	100.000	585	2147	1.247	--
总计		2353	100.000	585			

图68 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-82/27-961-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:18:26
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:35:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1540	100.000	381	2156	1.243	--
总计		1540	100.000	381			

图69 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-82/27-962-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:21:18
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:35:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1618	100.000	402	2124	1.212	--
总计		1618	100.000	402			

图70 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-83/27-963-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 20:24:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:36:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图71 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-964-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 20:27:02

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:36:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	2022	100.000	499	2142	1.221	--
总计		2022	100.000	499			

图72 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-965-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 20:29:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:36:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	2373	100.000	588	2175	1.268	--
总计		2373	100.000	588			

图73 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-966-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 20:32:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:36:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	1478	100.000	368	2141	1.228	--
总计		1478	100.000	368			

图74 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-967-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:35:37
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:36:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	1804	100.000	446	2118	1.214	--
总计		1804	100.000	446			

图75 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-968-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 20:38:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:36:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1361	100.000	336	2104	1.220	--
总计		1361	100.000	336			

图76 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-969-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 20:41:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1455	100.000	362	2141	1.251	--
总计		1455	100.000	362			

图77 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-970-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 20:44:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1695	100.000	422	2154	1.197	--
总计		1695	100.000	422			

图78 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-971-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:47:06
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	8903	100.000	2204	2162	1.240	--
总计		8903	100.000	2204			

图79 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-972-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:49:58
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1391	100.000	351	2136	1.188	--
总计		1391	100.000	351			

图80 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-973-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:52:51
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1339	100.000	333	2096	1.182	--
总计		1339	100.000	333			

图81 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-974-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:55:43
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	1251	100.000	315	2206	1.236	--
总计		1251	100.000	315			

图82 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-975-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 20:58:35
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1356	100.000	337	2182	1.269	--
总计		1356	100.000	337			

图83 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-976-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:01:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1479	100.000	364	2123	1.256	--
总计		1479	100.000	364			

图84 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-977-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 21:04:20
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1623	100.000	404	2150	1.224	--
总计		1623	100.000	404			

图85 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-978-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:07:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1392	100.000	345	2137	1.207	--
总计		1392	100.000	345			

图86 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-979-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:10:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	1187	100.000	293	2140	1.235	--
总计		1187	100.000	293			

图87 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-980-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:12:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1151	100.000	284	2134	1.227	--
总计		1151	100.000	284			

图88 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-981-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:15:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1244	100.000	309	2114	1.226	--
总计		1244	100.000	309			

图89 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-982-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:18:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1401	100.000	348	2181	1.247	--
总计		1401	100.000	348			

图90 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-983-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:21:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1405	100.000	348	2136	1.252	--
总计		1405	100.000	348			

图91 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-984-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 21:24:25
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1271	100.000	317	2167	1.231	--
总计		1271	100.000	317			

图92 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-985-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:27:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1106	100.000	278	2162	1.190	--
总计		1106	100.000	278			

图93 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-986-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 21:30:10
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1042	100.000	264	2125	1.210	--
总计		1042	100.000	264			

图94 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-987-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 21:33:03

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1165	100.000	285	2100	1.271	--
总计		1165	100.000	285			

图95 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-988-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:35:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1325	100.000	326	2088	1.256	--
总计		1325	100.000	326			

图96 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-989-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:38:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:37:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1284	100.000	321	2215	1.206	--
总计		1284	100.000	321			

图97 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-990-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 21:41:42

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1187	100.000	293	2102	1.224	--
总计		1187	100.000	293			

图98 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-991-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 21:44:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1041	100.000	264	2187	1.175	--
总计		1041	100.000	264			

图99 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-992-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 21:47:28
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1027	100.000	251	2050	1.248	--
总计		1027	100.000	251			

图100 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-993-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 21:50:22
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1101	100.000	272	2116	1.222	--
总计		1101	100.000	272			

图101 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-994-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 21:53:15
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1180	100.000	293	2114	1.207	--
总计		1180	100.000	293			

图102 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-995-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 21:56:08
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1212	100.000	301	2152	1.210	--
总计		1212	100.000	301			

图103 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-996-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/10 21:59:00
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1072	100.000	269	2209	1.209	--
总计		1072	100.000	269			

图104 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-997-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 22:01:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1575	100.000	396	2186	1.242	--
总计		1575	100.000	396			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-998-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 22:04:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1016	100.000	245	2065	1.342	--
总计		1016	100.000	245			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-999-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 22:07:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	1063	100.000	268	2244	1.202	--
总计		1063	100.000	268			

图107 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-1000-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 22:10:33

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1079	100.000	278	2241	1.200	--
总计		1079	100.000	278			

图108 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-1001-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 22:13:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	1260	100.000	314	2160	1.197	--
总计		1260	100.000	314			

图109 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-1002-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/10 22:16:18

处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	1061	100.000	263	2150	1.231	--
总计		1061	100.000	263			

图110 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-1003-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 22:19:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	194210	100.000	44662	1717	1.163	--
总计		194210	100.000	44662			

图111 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-84/27-1004-3 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX276-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 22:22:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/13 15:38:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	195646	100.000	45000	1716	1.162	--
总计		195646	100.000	45000			

图112 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010302批-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2