




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-623-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:36:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:58:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-624-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:39:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:58:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	196610	100.000	42756	1715	1.177	--
总计		196610	100.000	42756			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-625-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:42:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:58:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	196875	100.000	42796	1714	1.180	--
总计		196875	100.000	42796			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-626-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:45:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:58:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	196748	100.000	42797	1716	1.177	--
总计		196748	100.000	42797			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-627-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:48:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:58:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	196735	100.000	42816	1718	1.177	--
总计		196735	100.000	42816			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-628-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:50:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:58:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	196568	100.000	42777	1718	1.178	--
总计		196568	100.000	42777			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-629-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:53:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:58:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	90728	100.000	20529	1868	1.210	--
总计		90728	100.000	20529			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-630-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:56:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:58:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	81054	100.000	18317	1870	1.214	--
总计		81054	100.000	18317			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-631-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 13:59:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	81979	100.000	18529	1869	1.212	--
总计		81979	100.000	18529			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-632-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:02:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	83873	100.000	18959	1869	1.213	--
总计		83873	100.000	18959			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-633-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:05:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	90925	100.000	20593	1871	1.205	--
总计		90925	100.000	20593			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-634-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:08:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	90714	100.000	20509	1864	1.209	--
总计		90714	100.000	20509			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-635-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:10:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	124586	100.000	28310	1880	1.195	--
总计		124586	100.000	28310			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-636-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:13:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	115967	100.000	26354	1878	1.199	--
总计		115967	100.000	26354			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-637-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:16:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	115304	100.000	26145	1880	1.201	--
总计		115304	100.000	26145			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-638-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:19:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	117309	100.000	26623	1881	1.202	--
总计		117309	100.000	26623			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-639-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:22:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	125032	100.000	28356	1882	1.198	--
总计		125032	100.000	28356			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-640-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:25:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	123561	100.000	28041	1881	1.196	--
总计		123561	100.000	28041			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-641-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:28:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	144904	100.000	32914	1885	1.190	--
总计		144904	100.000	32914			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-642-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:31:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	137618	100.000	31266	1888	1.193	--
总计		137618	100.000	31266			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-643-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:33:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	134935	100.000	30604	1883	1.193	--
总计		134935	100.000	30604			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-644-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:36:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	140346	100.000	31864	1886	1.190	--
总计		140346	100.000	31864			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-645-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:39:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	144412	100.000	32715	1883	1.190	--
总计		144412	100.000	32715			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-646-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:42:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	142115	100.000	32215	1886	1.192	--
总计		142115	100.000	32215			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-647-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:45:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	157012	100.000	35537	1889	1.183	--
总计		157012	100.000	35537			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-648-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:48:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	151100	100.000	34240	1891	1.187	--
总计		151100	100.000	34240			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-649-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:51:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	147543	100.000	33302	1887	1.188	--
总计		147543	100.000	33302			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-650-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:53:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	150328	100.000	34123	1893	1.186	--
总计		150328	100.000	34123			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-651-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:56:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	156001	100.000	35306	1890	1.186	--
总计		156001	100.000	35306			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-652-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 14:59:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 10:59:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	154968	100.000	35089	1890	1.185	--
总计		154968	100.000	35089			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-653-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:02:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	170047	100.000	38472	1889	1.182	--
总计		170047	100.000	38472			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-654-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:05:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	166974	100.000	37686	1891	1.180	--
总计		166974	100.000	37686			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-655-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:08:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	162687	100.000	36774	1892	1.183	--
总计		162687	100.000	36774			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-656-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:11:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	166037	100.000	37470	1893	1.183	--
总计		166037	100.000	37470			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-657-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:14:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	169678	100.000	38261	1895	1.181	--
总计		169678	100.000	38261			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-658-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:16:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	168778	100.000	38085	1897	1.181	--
总计		168778	100.000	38085			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-659-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:19:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	179718	100.000	40434	1896	1.177	--
总计		179718	100.000	40434			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-660-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:22:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	178767	100.000	40310	1896	1.176	--
总计		178767	100.000	40310			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-661-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:25:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	175948	100.000	39591	1897	1.179	--
总计		175948	100.000	39591			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-662-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:28:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	178715	100.000	40409	1891	1.177	--
总计		178715	100.000	40409			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-663-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:31:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	180724	100.000	40644	1895	1.178	--
总计		180724	100.000	40644			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-664-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:34:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	177654	100.000	39987	1895	1.178	--
总计		177654	100.000	39987			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-665-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:36:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	186111	100.000	42016	1893	1.174	--
总计		186111	100.000	42016			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-666-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:39:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	185844	100.000	41931	1893	1.173	--
总计		185844	100.000	41931			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-667-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:42:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	182604	100.000	41275	1892	1.175	--
总计		182604	100.000	41275			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-668-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:45:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	185965	100.000	41969	1892	1.176	--
总计		185965	100.000	41969			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-669-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:48:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	186206	100.000	41888	1896	1.172	--
总计		186206	100.000	41888			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-670-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:51:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	185985	100.000	41817	1894	1.174	--
总计		185985	100.000	41817			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-671-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:54:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	190648	100.000	42930	1895	1.170	--
总计		190648	100.000	42930			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-672-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:57:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	191052	100.000	43116	1896	1.172	--
总计		191052	100.000	43116			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-673-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 15:59:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	188529	100.000	42389	1898	1.174	--
总计		188529	100.000	42389			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-674-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:02:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:00:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	191599	100.000	42994	1893	1.172	--
总计		191599	100.000	42994			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-675-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:05:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	191068	100.000	42993	1893	1.172	--
总计		191068	100.000	42993			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-676-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:08:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	191829	100.000	43114	1894	1.171	--
总计		191829	100.000	43114			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-677-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:11:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	197315	100.000	42974	1722	1.171	--
总计		197315	100.000	42974			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-678-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:14:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	197270	100.000	43005	1725	1.172	--
总计		197270	100.000	43005			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-679-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:17:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-680-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:20:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	196563	100.000	42884	1724	1.171	--
总计		196563	100.000	42884			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-681-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:23:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	196464	100.000	42865	1723	1.169	--
总计		196464	100.000	42865			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-682-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:25:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	196657	100.000	42897	1725	1.172	--
总计		196657	100.000	42897			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-683-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:28:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	196380	100.000	42786	1722	1.171	--
总计		196380	100.000	42786			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-684-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:31:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	195992	100.000	42712	1724	1.171	--
总计		195992	100.000	42712			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-685-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:34:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	87297	100.000	19728	1868	1.206	--
总计		87297	100.000	19728			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-686-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:37:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	93675	100.000	21200	1868	1.201	--
总计		93675	100.000	21200			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-687-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:40:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	93725	100.000	21202	1869	1.202	--
总计		93725	100.000	21202			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-688-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:43:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	89354	100.000	20230	1869	1.206	--
总计		89354	100.000	20230			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-689-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:46:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	98117	100.000	22229	1871	1.201	--
总计		98117	100.000	22229			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-690-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:49:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	95520	100.000	21654	1870	1.204	--
总计		95520	100.000	21654			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-691-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:51:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	121276	100.000	27500	1880	1.194	--
总计		121276	100.000	27500			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-692-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:54:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	127448	100.000	28918	1881	1.194	--
总计		127448	100.000	28918			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-693-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 16:57:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	126707	100.000	28726	1879	1.194	--
总计		126707	100.000	28726			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-694-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:00:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	121399	100.000	27481	1877	1.196	--
总计		121399	100.000	27481			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-695-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:03:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	131414	100.000	29773	1881	1.190	--
总计		131414	100.000	29773			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-696-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:06:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:01:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	129039	100.000	29190	1879	1.193	--
总计		129039	100.000	29190			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-697-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:09:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	142870	100.000	32293	1883	1.187	--
总计		142870	100.000	32293			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-698-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:12:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	145779	100.000	33046	1882	1.188	--
总计		145779	100.000	33046			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-699-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:15:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	147238	100.000	33276	1886	1.186	--
总计		147238	100.000	33276			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-700-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:17:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	140588	100.000	31772	1885	1.185	--
总计		140588	100.000	31772			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-701-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:20:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	150011	100.000	33878	1882	1.184	--
总计		150011	100.000	33878			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-702-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:23:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	148176	100.000	33463	1880	1.185	--
总计		148176	100.000	33463			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-703-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:26:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	154806	100.000	34972	1884	1.183	--
总计		154806	100.000	34972			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-704-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:29:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	158043	100.000	35794	1884	1.182	--
总计		158043	100.000	35794			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-705-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:32:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	159219	100.000	36074	1887	1.180	--
总计		159219	100.000	36074			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-706-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:35:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	153915	100.000	34741	1885	1.182	--
总计		153915	100.000	34741			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-707-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:38:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	161049	100.000	36284	1885	1.182	--
总计		161049	100.000	36284			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-708-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:41:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	146505	100.000	33088	1881	1.185	--
总计		146505	100.000	33088			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-709-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:43:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	169757	100.000	38243	1891	1.179	--
总计		169757	100.000	38243			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-710-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:46:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	171583	100.000	38611	1889	1.178	--
总计		171583	100.000	38611			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-711-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:49:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	172846	100.000	38877	1889	1.176	--
总计		172846	100.000	38877			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-712-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:52:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	168243	100.000	37855	1890	1.177	--
总计		168243	100.000	37855			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-713-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:55:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	173554	100.000	39130	1885	1.174	--
总计		173554	100.000	39130			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-714-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 17:58:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	172570	100.000	38811	1886	1.177	--
总计		172570	100.000	38811			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-715-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:01:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	180489	100.000	40601	1891	1.173	--
总计		180489	100.000	40601			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-716-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:04:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	182406	100.000	41069	1892	1.174	--
总计		182406	100.000	41069			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-717-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:07:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	184144	100.000	41393	1890	1.173	--
总计		184144	100.000	41393			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-718-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:09:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:02:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	179465	100.000	40468	1894	1.171	--
总计		179465	100.000	40468			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-719-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:12:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	184965	100.000	41566	1891	1.172	--
总计		184965	100.000	41566			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-720-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:15:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	183076	100.000	41188	1890	1.172	--
总计		183076	100.000	41188			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-721-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:18:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	186745	100.000	41971	1890	1.172	--
总计		186745	100.000	41971			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-722-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:21:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	186844	100.000	41974	1890	1.170	--
总计		186844	100.000	41974			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-723-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:24:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	189397	100.000	42553	1895	1.169	--
总计		189397	100.000	42553			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-724-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:27:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	187149	100.000	42040	1896	1.167	--
总计		187149	100.000	42040			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-725-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:30:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	189115	100.000	42527	1894	1.169	--
总计		189115	100.000	42527			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-726-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:33:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	188181	100.000	42308	1891	1.167	--
总计		188181	100.000	42308			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-727-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:36:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	191024	100.000	42999	1893	1.167	--
总计		191024	100.000	42999			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-728-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:38:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	193050	100.000	43460	1893	1.166	--
总计		193050	100.000	43460			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-729-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:41:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	193517	100.000	43553	1891	1.164	--
总计		193517	100.000	43553			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-730-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:44:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	190792	100.000	42948	1893	1.165	--
总计		190792	100.000	42948			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-731-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:47:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	193425	100.000	43606	1894	1.165	--
总计		193425	100.000	43606			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-732-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:50:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	192724	100.000	43394	1895	1.165	--
总计		192724	100.000	43394			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-733-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:53:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	197033	100.000	42907	1724	1.166	--
总计		197033	100.000	42907			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-70/29-734-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH4.0jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/10 18:56:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 11:03:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	196852	100.000	42885	1722	1.166	--
总计		196852	100.000	42885			