




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-884-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 11:41:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:49:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-885-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 11:44:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:49:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	198181	100.000	45582	1707	1.163	--
总计		198181	100.000	45582			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-886-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 11:47:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:49:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197151	100.000	45604	1711	1.164	--
总计		197151	100.000	45604			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-887-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 11:50:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197164	100.000	45648	1719	1.163	--
总计		197164	100.000	45648			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-888-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 11:53:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197171	100.000	45655	1718	1.163	--
总计		197171	100.000	45655			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-889-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 11:56:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197500	100.000	45673	1714	1.163	--
总计		197500	100.000	45673			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-890-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 11:59:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	103245	100.000	24135	1772	1.221	--
总计		103245	100.000	24135			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-891-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:01:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	99848	100.000	23384	1770	1.223	--
总计		99848	100.000	23384			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-892-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:04:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	104638	100.000	24548	1772	1.220	--
总计		104638	100.000	24548			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-893-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:07:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	109227	100.000	25586	1775	1.219	--
总计		109227	100.000	25586			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-894-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:10:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	95525	100.000	22360	1773	1.227	--
总计		95525	100.000	22360			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-895-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:13:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	111596	100.000	26156	1771	1.216	--
总计		111596	100.000	26156			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-896-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:16:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	145298	100.000	34214	1792	1.202	--
总计		145298	100.000	34214			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-897-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:19:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	143118	100.000	33631	1781	1.205	--
总计		143118	100.000	33631			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-898-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:22:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	145476	100.000	34258	1790	1.201	--
总计		145476	100.000	34258			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-899-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:24:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	146266	100.000	34488	1799	1.202	--
总计		146266	100.000	34488			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-900-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:27:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	137931	100.000	32340	1780	1.208	--
总计		137931	100.000	32340			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-901-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:30:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	147580	100.000	34652	1786	1.205	--
总计		147580	100.000	34652			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-902-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:33:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	164878	100.000	38771	1789	1.195	--
总计		164878	100.000	38771			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-903-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:36:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	165626	100.000	38752	1795	1.196	--
总计		165626	100.000	38752			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-904-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:39:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	168020	100.000	39453	1791	1.194	--
总计		168020	100.000	39453			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-905-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:42:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	168590	100.000	39769	1804	1.193	--
总计		168590	100.000	39769			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-906-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:44:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	163339	100.000	38373	1790	1.198	--
总计		163339	100.000	38373			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-907-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:47:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:50:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	168692	100.000	39584	1790	1.194	--
总计		168692	100.000	39584			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-908-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:50:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	176578	100.000	41445	1794	1.191	--
总计		176578	100.000	41445			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-909-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:53:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	178328	100.000	41897	1791	1.191	--
总计		178328	100.000	41897			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-910-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:56:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	177931	100.000	41580	1796	1.191	--
总计		177931	100.000	41580			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-911-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 12:59:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	178787	100.000	41936	1801	1.191	--
总计		178787	100.000	41936			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-912-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:02:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	175494	100.000	41251	1796	1.191	--
总计		175494	100.000	41251			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-913-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:05:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	180249	100.000	42384	1800	1.188	--
总计		180249	100.000	42384			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-914-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:07:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	187148	100.000	43867	1801	1.189	--
总计		187148	100.000	43867			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-915-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:10:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	189042	100.000	44610	1806	1.185	--
总计		189042	100.000	44610			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-916-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:13:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	189135	100.000	44468	1795	1.184	--
总计		189135	100.000	44468			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-917-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:16:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	189985	100.000	44720	1798	1.185	--
总计		189985	100.000	44720			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-918-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:19:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	188074	100.000	44081	1786	1.186	--
总计		188074	100.000	44081			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-919-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:22:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	189828	100.000	44573	1804	1.186	--
总计		189828	100.000	44573			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-920-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:25:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	193420	100.000	45571	1811	1.181	--
总计		193420	100.000	45571			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-921-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:27:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	195371	100.000	45812	1814	1.184	--
总计		195371	100.000	45812			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-922-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:30:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	196245	100.000	45902	1801	1.183	--
总计		196245	100.000	45902			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-923-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:33:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	196119	100.000	45825	1804	1.184	--
总计		196119	100.000	45825			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-924-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:36:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	194064	100.000	45630	1814	1.181	--
总计		194064	100.000	45630			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-925-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:39:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	196149	100.000	45800	1803	1.184	--
总计		196149	100.000	45800			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-926-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:42:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	195940	100.000	46048	1817	1.182	--
总计		195940	100.000	46048			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-927-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:45:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	197752	100.000	46194	1800	1.183	--
总计		197752	100.000	46194			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-928-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:48:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:51:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	199325	100.000	46566	1800	1.182	--
总计		199325	100.000	46566			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-929-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:50:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	198908	100.000	46803	1815	1.180	--
总计		198908	100.000	46803			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-930-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:53:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	199476	100.000	46820	1807	1.179	--
总计		199476	100.000	46820			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-931-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:56:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	198334	100.000	46574	1809	1.180	--
总计		198334	100.000	46574			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-932-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 13:59:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	206572	100.000	48289	1808	1.179	--
总计		206572	100.000	48289			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-933-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:02:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	200378	100.000	46817	1804	1.181	--
总计		200378	100.000	46817			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-934-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:05:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	200989	100.000	46899	1799	1.182	--
总计		200989	100.000	46899			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-935-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:08:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	200962	100.000	46958	1809	1.181	--
总计		200962	100.000	46958			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-936-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:10:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	200846	100.000	46826	1803	1.181	--
总计		200846	100.000	46826			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-937-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:13:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	200195	100.000	46629	1801	1.182	--
总计		200195	100.000	46629			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-938-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:16:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197463	100.000	45673	1715	1.162	--
总计		197463	100.000	45673			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-939-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:19:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	196876	100.000	45639	1719	1.163	--
总计		196876	100.000	45639			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-940-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:22:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-941-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:25:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197016	100.000	45603	1719	1.162	--
总计		197016	100.000	45603			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-942-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:28:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197403	100.000	45631	1712	1.163	--
总计		197403	100.000	45631			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-943-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:31:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	197465	100.000	45365	1720	1.164	--
总计		197465	100.000	45365			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-944-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:34:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197124	100.000	45728	1720	1.163	--
总计		197124	100.000	45728			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-945-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:37:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	198468	100.000	45404	1714	1.161	--
总计		198468	100.000	45404			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-946-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:39:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	106922	100.000	25059	1778	1.221	--
总计		106922	100.000	25059			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-947-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:42:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	113065	100.000	26658	1788	1.213	--
总计		113065	100.000	26658			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-948-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:45:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	102787	100.000	24071	1773	1.223	--
总计		102787	100.000	24071			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-949-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:48:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	105249	100.000	24710	1774	1.219	--
总计		105249	100.000	24710			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-950-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:51:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:52:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	100111	100.000	23491	1776	1.219	--
总计		100111	100.000	23491			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-951-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:54:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	105116	100.000	24765	1795	1.215	--
总计		105116	100.000	24765			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-952-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 14:57:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	147079	100.000	34652	1798	1.202	--
总计		147079	100.000	34652			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-953-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:00:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	151652	100.000	35662	1792	1.200	--
总计		151652	100.000	35662			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-954-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:02:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	145325	100.000	34190	1787	1.202	--
总计		145325	100.000	34190			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-955-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:05:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	144938	100.000	34115	1791	1.201	--
总计		144938	100.000	34115			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-956-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:08:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	142134	100.000	33095	1790	1.204	--
总计		142134	100.000	33095			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-957-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:11:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	143758	100.000	33961	1806	1.202	--
总计		143758	100.000	33961			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-958-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:14:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	169293	100.000	39768	1797	1.192	--
总计		169293	100.000	39768			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-959-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:17:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	168331	100.000	39605	1810	1.192	--
总计		168331	100.000	39605			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-960-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:20:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	167136	100.000	39463	1808	1.190	--
总计		167136	100.000	39463			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-961-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:23:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	168253	100.000	39483	1792	1.192	--
总计		168253	100.000	39483			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-962-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:26:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	165470	100.000	39129	1804	1.192	--
总计		165470	100.000	39129			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-963-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:28:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	165056	100.000	38877	1791	1.190	--
总计		165056	100.000	38877			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-964-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:31:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	180088	100.000	42375	1800	1.189	--
总计		180088	100.000	42375			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-965-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:34:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	177983	100.000	42195	1814	1.188	--
总计		177983	100.000	42195			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-966-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:37:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	178781	100.000	42011	1795	1.189	--
总计		178781	100.000	42011			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-967-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:40:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	180031	100.000	42328	1795	1.189	--
总计		180031	100.000	42328			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-968-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:43:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	179167	100.000	42141	1796	1.188	--
总计		179167	100.000	42141			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-969-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:46:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	176286	100.000	41672	1805	1.190	--
总计		176286	100.000	41672			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-970-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:49:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	190698	100.000	45019	1802	1.183	--
总计		190698	100.000	45019			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-971-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:52:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	188255	100.000	44172	1805	1.183	--
总计		188255	100.000	44172			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-972-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:54:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:53:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	189201	100.000	44519	1815	1.185	--
总计		189201	100.000	44519			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-973-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 15:57:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	189965	100.000	44607	1805	1.187	--
总计		189965	100.000	44607			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-974-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:00:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	190273	100.000	44606	1805	1.185	--
总计		190273	100.000	44606			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-975-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:03:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	187421	100.000	44114	1811	1.184	--
总计		187421	100.000	44114			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-976-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:06:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	197027	100.000	46415	1803	1.182	--
总计		197027	100.000	46415			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-977-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:09:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	195250	100.000	45827	1802	1.182	--
总计		195250	100.000	45827			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-978-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:12:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	197812	100.000	46766	1817	1.179	--
总计		197812	100.000	46766			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-979-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:15:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	194924	100.000	45915	1810	1.179	--
总计		194924	100.000	45915			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-980-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:18:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	196325	100.000	46038	1797	1.182	--
总计		196325	100.000	46038			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-981-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:20:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	194742	100.000	45876	1811	1.182	--
总计		194742	100.000	45876			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-982-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:23:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	199926	100.000	46839	1803	1.181	--
总计		199926	100.000	46839			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-983-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:26:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	196650	100.000	46518	1814	1.180	--
总计		196650	100.000	46518			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-984-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:29:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	198001	100.000	46870	1817	1.180	--
总计		198001	100.000	46870			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-985-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:32:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	198674	100.000	46637	1803	1.182	--
总计		198674	100.000	46637			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-986-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:35:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	199659	100.000	46856	1803	1.182	--
总计		199659	100.000	46856			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-987-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:38:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	198092	100.000	46416	1799	1.181	--
总计		198092	100.000	46416			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-988-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:41:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	200676	100.000	47418	1812	1.180	--
总计		200676	100.000	47418			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-989-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:44:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	199010	100.000	46661	1799	1.181	--
总计		199010	100.000	46661			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-990-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:46:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	201024	100.000	47076	1800	1.182	--
总计		201024	100.000	47076			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-991-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:49:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	200051	100.000	47340	1813	1.179	--
总计		200051	100.000	47340			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-992-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:52:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	200152	100.000	47234	1814	1.180	--
总计		200152	100.000	47234			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-993-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:55:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	199622	100.000	46796	1800	1.182	--
总计		199622	100.000	46796			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-994-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 16:58:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:54:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	197678	100.000	45863	1723	1.162	--
总计		197678	100.000	45863			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-995-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:01:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	197402	100.000	45793	1721	1.162	--
总计		197402	100.000	45793			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-996-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:04:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-997-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:07:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	198222	100.000	45725	1714	1.160	--
总计		198222	100.000	45725			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-998-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:10:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	196840	100.000	45707	1716	1.160	--
总计		196840	100.000	45707			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-999-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:12:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	196643	100.000	45519	1716	1.163	--
总计		196643	100.000	45519			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1000-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:15:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197254	100.000	45698	1718	1.160	--
总计		197254	100.000	45698			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1001-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:18:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	197434	100.000	45717	1718	1.160	--
总计		197434	100.000	45717			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1002-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:21:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	63256	100.000	15066	2104	1.208	--
总计		63256	100.000	15066			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1003-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:24:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	67075	100.000	15953	2096	1.210	--
总计		67075	100.000	15953			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1004-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:27:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	65995	100.000	15685	2103	1.210	--
总计		65995	100.000	15685			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1005-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:30:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	64681	100.000	15437	2110	1.210	--
总计		64681	100.000	15437			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1006-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:34:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	65808	100.000	15696	2109	1.212	--
总计		65808	100.000	15696			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1007-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:37:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	63519	100.000	15127	2107	1.214	--
总计		63519	100.000	15127			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1008-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:40:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	100501	100.000	23949	2104	1.201	--
总计		100501	100.000	23949			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1009-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:43:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	104339	100.000	24848	2103	1.201	--
总计		104339	100.000	24848			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1010-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:46:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	101245	100.000	24145	2108	1.201	--
总计		101245	100.000	24145			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1011-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:49:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	100611	100.000	23934	2110	1.199	--
总计		100611	100.000	23934			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1012-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:52:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	102130	100.000	24168	2114	1.202	--
总计		102130	100.000	24168			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1013-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:55:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	97448	100.000	23131	2108	1.202	--
总计		97448	100.000	23131			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1014-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 17:57:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	122684	100.000	29006	2111	1.197	--
总计		122684	100.000	29006			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1015-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:00:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:55:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	127253	100.000	30270	2109	1.193	--
总计		127253	100.000	30270			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1016-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:03:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	123765	100.000	29359	2109	1.198	--
总计		123765	100.000	29359			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1017-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:06:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	123426	100.000	29360	2104	1.195	--
总计		123426	100.000	29360			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1018-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:09:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	124772	100.000	29485	2109	1.194	--
总计		124772	100.000	29485			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1019-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:12:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	119824	100.000	28312	2114	1.197	--
总计		119824	100.000	28312			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1020-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:15:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	137442	100.000	32572	2112	1.191	--
总计		137442	100.000	32572			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1021-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:17:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	143475	100.000	34040	2112	1.190	--
总计		143475	100.000	34040			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1022-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:20:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	138609	100.000	32983	2106	1.190	--
总计		138609	100.000	32983			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1023-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:23:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	139649	100.000	33158	2102	1.193	--
总计		139649	100.000	33158			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1024-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:26:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	140820	100.000	33158	2112	1.191	--
总计		140820	100.000	33158			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1025-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:29:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	135458	100.000	31988	2116	1.194	--
总计		135458	100.000	31988			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1026-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:32:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	157351	100.000	37100	2111	1.185	--
总计		157351	100.000	37100			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1027-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:35:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	163936	100.000	38870	2108	1.183	--
总计		163936	100.000	38870			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1028-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:37:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	158828	100.000	37538	2115	1.187	--
总计		158828	100.000	37538			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1029-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:40:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	160614	100.000	37904	2116	1.185	--
总计		160614	100.000	37904			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1030-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:43:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	161669	100.000	38062	2108	1.186	--
总计		161669	100.000	38062			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1031-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:46:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	155951	100.000	36774	2115	1.188	--
总计		155951	100.000	36774			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1032-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:49:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	174749	100.000	41239	2109	1.179	--
总计		174749	100.000	41239			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1033-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:52:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	181769	100.000	42927	2115	1.175	--
总计		181769	100.000	42927			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1034-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:55:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	176379	100.000	41568	2103	1.180	--
总计		176379	100.000	41568			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1035-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 18:57:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	178315	100.000	42095	2119	1.180	--
总计		178315	100.000	42095			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1036-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:00:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	179161	100.000	42184	2111	1.178	--
总计		179161	100.000	42184			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1037-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:03:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:56:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	174231	100.000	41171	2109	1.180	--
总计		174231	100.000	41171			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1038-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:06:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	185372	100.000	43694	2110	1.175	--
总计		185372	100.000	43694			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1039-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:09:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	191070	100.000	45298	2118	1.175	--
总计		191070	100.000	45298			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1040-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:12:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	187025	100.000	43974	2106	1.177	--
总计		187025	100.000	43974			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1041-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:15:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	188540	100.000	44604	2114	1.174	--
总计		188540	100.000	44604			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1042-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:17:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	189529	100.000	44666	2110	1.176	--
总计		189529	100.000	44666			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1043-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:20:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	185103	100.000	43513	2110	1.178	--
总计		185103	100.000	43513			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1044-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:23:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	192732	100.000	45563	2115	1.173	--
总计		192732	100.000	45563			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1045-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:26:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	197929	100.000	46743	2114	1.170	--
总计		197929	100.000	46743			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1046-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:29:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	193262	100.000	45648	2113	1.173	--
总计		193262	100.000	45648			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1047-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:32:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	195750	100.000	46355	2112	1.171	--
总计		195750	100.000	46355			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1048-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:35:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	195897	100.000	46271	2113	1.173	--
总计		195897	100.000	46271			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1049-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:37:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	192190	100.000	45222	2113	1.176	--
总计		192190	100.000	45222			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1050-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:40:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	197437	100.000	45174	1722	1.160	--
总计		197437	100.000	45174			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1051-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:43:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	197515	100.000	45298	1723	1.160	--
总计		197515	100.000	45298			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1052-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:46:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1053-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:49:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	197412	100.000	45382	1726	1.161	--
总计		197412	100.000	45382			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1054-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:52:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	197532	100.000	45550	1734	1.159	--
总计		197532	100.000	45550			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1055-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:55:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	197218	100.000	45232	1728	1.159	--
总计		197218	100.000	45232			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1056-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 19:58:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	197342	100.000	45363	1721	1.162	--
总计		197342	100.000	45363			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1057-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:01:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	197110	100.000	45315	1728	1.163	--
总计		197110	100.000	45315			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1058-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:03:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	57773	100.000	13742	2111	1.214	--
总计		57773	100.000	13742			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1059-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:06:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:57:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	58243	100.000	13871	2119	1.213	--
总计		58243	100.000	13871			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1060-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:09:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	63328	100.000	15057	2109	1.215	--
总计		63328	100.000	15057			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1061-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:12:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	68823	100.000	16375	2111	1.211	--
总计		68823	100.000	16375			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1062-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:15:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	61390	100.000	14635	2117	1.211	--
总计		61390	100.000	14635			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1063-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:18:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	61103	100.000	14546	2106	1.209	--
总计		61103	100.000	14546			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1064-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:21:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	93797	100.000	22198	2117	1.205	--
总计		93797	100.000	22198			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1065-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:24:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	95295	100.000	22626	2114	1.206	--
总计		95295	100.000	22626			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1066-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:26:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	99830	100.000	23601	2112	1.202	--
总计		99830	100.000	23601			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1067-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:29:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	103241	100.000	24439	2114	1.202	--
总计		103241	100.000	24439			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1068-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:32:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	99074	100.000	23468	2106	1.204	--
总计		99074	100.000	23468			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1069-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:35:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	98502	100.000	23347	2115	1.201	--
总计		98502	100.000	23347			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1070-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:38:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	116715	100.000	27451	2118	1.198	--
总计		116715	100.000	27451			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1071-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:41:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	118893	100.000	28111	2114	1.196	--
总计		118893	100.000	28111			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1072-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:44:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	122068	100.000	28785	2113	1.197	--
总计		122068	100.000	28785			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1073-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:46:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	123878	100.000	29372	2117	1.193	--
总计		123878	100.000	29372			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1074-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:49:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	122030	100.000	28907	2114	1.195	--
总计		122030	100.000	28907			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1075-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:52:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	121423	100.000	28691	2113	1.195	--
总计		121423	100.000	28691			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1076-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:55:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	133220	100.000	31341	2118	1.194	--
总计		133220	100.000	31341			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1077-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 20:58:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	135361	100.000	31918	2113	1.191	--
总计		135361	100.000	31918			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1078-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:01:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	138090	100.000	32611	2116	1.192	--
总计		138090	100.000	32611			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1079-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:04:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	139202	100.000	32775	2113	1.193	--
总计		139202	100.000	32775			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1080-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:07:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	138755	100.000	32692	2115	1.192	--
总计		138755	100.000	32692			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1081-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:10:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:58:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	137436	100.000	32293	2115	1.191	--
总计		137436	100.000	32293			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1082-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:12:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	154115	100.000	36281	2116	1.187	--
总计		154115	100.000	36281			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1083-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:15:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	156018	100.000	36810	2112	1.186	--
总计		156018	100.000	36810			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1084-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:18:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	159005	100.000	37612	2120	1.183	--
总计		159005	100.000	37612			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1085-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:21:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	158975	100.000	37622	2115	1.184	--
总计		158975	100.000	37622			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1086-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:24:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	159578	100.000	37602	2115	1.185	--
总计		159578	100.000	37602			




JSS-222

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1087-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:27:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	157735	100.000	37167	2115	1.184	--
总计		157735	100.000	37167			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1088-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:30:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	172833	100.000	40842	2115	1.180	--
总计		172833	100.000	40842			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1089-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:33:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	175303	100.000	41321	2115	1.180	--
总计		175303	100.000	41321			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1090-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:35:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	177027	100.000	41893	2111	1.177	--
总计		177027	100.000	41893			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1091-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:38:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	176523	100.000	41679	2112	1.179	--
总计		176523	100.000	41679			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1092-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:41:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	178562	100.000	42303	2115	1.176	--
总计		178562	100.000	42303			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1093-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:44:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	176241	100.000	41721	2113	1.179	--
总计		176241	100.000	41721			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1094-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:47:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	183489	100.000	43493	2113	1.176	--
总计		183489	100.000	43493			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1095-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:50:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	186120	100.000	44070	2110	1.174	--
总计		186120	100.000	44070			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1096-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:53:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	186458	100.000	44032	2115	1.176	--
总计		186458	100.000	44032			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1097-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:56:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	187777	100.000	44562	2115	1.174	--
总计		187777	100.000	44562			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1098-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 21:59:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	191375	100.000	45464	2116	1.173	--
总计		191375	100.000	45464			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1099-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 22:01:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	187183	100.000	44378	2113	1.175	--
总计		187183	100.000	44378			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1100-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:04:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	190001	100.000	44926	2114	1.173	--
总计		190001	100.000	44926			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1101-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 22:07:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	193428	100.000	45941	2121	1.173	--
总计		193428	100.000	45941			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1102-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 22:10:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	193472	100.000	45890	2117	1.172	--
总计		193472	100.000	45890			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1103-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 22:13:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 08:59:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	193519	100.000	45898	2116	1.174	--
总计		193519	100.000	45898			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1104-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 22:16:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 09:00:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	196135	100.000	46646	2123	1.172	--
总计		196135	100.000	46646			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1105-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 22:19:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 09:00:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	193681	100.000	46003	2117	1.172	--
总计		193681	100.000	46003			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1106-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 22:22:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 09:00:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	197612	100.000	45540	1731	1.159	--
总计		197612	100.000	45540			




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-69/30-1107-2 - zzp-25010302p-rcqx-jf50z-pH6.8+0.1SDSjz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250110-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/10 22:24:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/13 09:00:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	197422	100.000	45514	1733	1.158	--
总计		197422	100.000	45514			