SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-250-3 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-rj.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 11:40:45 实验者: jiangjinwei
处理时间（V3） : 2025/01/13 11:56:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-251-3 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 11:45:38 实验者: jiangjinwei
处理时间（V3） : 2025/01/13 11:56:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.719	4046559	100.000	382742	3012	0.931	--
总计		4046559	100.000	382742			

图2 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-252-3 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:02:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V3） : 2025/01/13 11:56:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.709	4050188	100.000	373422	2883	0.972	--
总计		4050188	100.000	373422			

图3 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-253-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:07:08 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.701	4054484	100.000	370647	2825	0.983	--
总计		4054484	100.000	370647			

图4 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-254-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:12:01 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.694	4052731	100.000	370091	2800	0.993	--
总计		4052731	100.000	370091			

图5 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-255-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:16:54 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.689	4051102	100.000	370885	2796	0.999	--
总计		4051102	100.000	370885			

图6 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-256-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:21:46 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.694	350311	100.000	32537	2812	1.001	--
总计		350311	100.000	32537			

图7 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-257-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:26:39 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.690	332236	100.000	30883	2811	1.004	--
总计		332236	100.000	30883			

图8 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-258-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:31:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.687	336689	100.000	31410	2819	1.005	--
总计		336689	100.000	31410			

图9 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-259-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:36:24 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.683	357080	100.000	33367	2817	1.011	--
总计		357080	100.000	33367			

图10 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-260-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:41:16 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.681	256802	100.000	24143	2826	1.015	--
总计		256802	100.000	24143			

图11 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-261-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:46:08 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.678	277850	100.000	26074	2826	1.018	--
总计		277850	100.000	26074			

图12 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-262-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:51:00 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.676	807215	100.000	75503	2829	1.016	--
总计		807215	100.000	75503			

图13 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-263-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 12:55:52 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.674	846004	100.000	79314	2830	1.018	--
总计		846004	100.000	79314			

图14 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-264-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:00:44 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	820180	100.000	77004	2827	1.020	--
总计		820180	100.000	77004			

图15 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-265-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:05:37 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:56:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.672	863559	100.000	80980	2824	1.022	--
总计		863559	100.000	80980			

图16 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-266-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:10:30 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.671	786170	100.000	73841	2826	1.024	--
总计		786170	100.000	73841			

图17 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-267-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:15:22 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.669	816573	100.000	76775	2828	1.025	--
总计		816573	100.000	76775			

图18 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-268-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:20:14 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.667	1183475	100.000	111205	2834	1.027	--
总计		1183475	100.000	111205			

图19 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-269-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:25:06 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	1183412	100.000	111547	2835	1.029	--
总计		1183412	100.000	111547			

图20 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-270-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:29:58 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	1180540	100.000	111495	2843	1.028	--
总计		1180540	100.000	111495			

图21 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-271-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:34:51 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	1250022	100.000	117752	2830	1.030	--
总计		1250022	100.000	117752			

图22 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-272-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:41:25 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.663	1173556	100.000	110584	2826	1.031	--
总计		1173556	100.000	110584			

图23 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-273-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:46:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	1140978	100.000	107353	2819	1.033	--
总计		1140978	100.000	107353			

图24 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-274-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:51:08 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	1461027	100.000	137352	2815	1.036	--
总计		1461027	100.000	137352			

图25 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-275-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 13:56:00 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	1448343	100.000	135995	2809	1.037	--
总计		1448343	100.000	135995			

图26 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-276-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:00:52 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	1481518	100.000	138914	2801	1.038	--
总计		1481518	100.000	138914			

图27 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-277-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:05:44 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	1566240	100.000	146653	2794	1.041	--
总计		1566240	100.000	146653			

图28 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-278-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:10:36 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.660	1446573	100.000	135253	2781	1.043	--
总计		1446573	100.000	135253			

图29 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-279-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:15:27 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.658	1434604	100.000	134411	2782	1.044	--
总计		1434604	100.000	134411			

图30 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-280-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:20:20 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.655	1757828	100.000	164852	2782	1.046	--
总计		1757828	100.000	164852			

图31 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-281-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:25:13 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.654	1778187	100.000	166475	2775	1.048	--
总计		1778187	100.000	166475			

图32 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-282-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:30:04 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.652	1811423	100.000	169400	2764	1.052	--
总计		1811423	100.000	169400			

图33 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-283-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:34:56 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.652	1956033	100.000	182821	2762	1.055	--
总计		1956033	100.000	182821			

图34 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-284-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:39:49 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.651	1813646	100.000	169523	2755	1.057	--
总计		1813646	100.000	169523			

图35 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-285-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:44:40 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.650	1737256	100.000	162306	2745	1.058	--
总计		1737256	100.000	162306			

图36 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-286-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:49:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.650	1997653	100.000	186362	2742	1.061	--
总计		1997653	100.000	186362			

图37 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-287-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:54:24 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:57:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.650	1964589	100.000	182990	2728	1.063	--
总计		1964589	100.000	182990			

图38 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-288-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 14:59:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.649	2002885	100.000	186805	2727	1.065	--
总计		2002885	100.000	186805			

图39 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-289-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:04:09 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.648	2203081	100.000	205211	2722	1.067	--
总计		2203081	100.000	205211			

图40 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-290-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:09:01 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.648	2058479	100.000	191713	2715	1.068	--
总计		2058479	100.000	191713			

图41 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-291-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:13:53 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.648	1948309	100.000	181303	2706	1.069	--
总计		1948309	100.000	181303			

图42 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-292-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:18:44 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.647	2078283	100.000	193387	2703	1.071	--
总计		2078283	100.000	193387			

图43 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-293-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:23:36 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.645	2042483	100.000	189805	2692	1.072	--
总计		2042483	100.000	189805			

图44 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-294-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:28:28 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.645	2071335	100.000	192390	2686	1.074	--
总计		2071335	100.000	192390			

图45 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-295-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:33:21 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.644	2287742	100.000	212176	2680	1.077	--
总计		2287742	100.000	212176			

图46 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-296-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:38:12 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.644	2124149	100.000	197048	2675	1.078	--
总计		2124149	100.000	197048			

图47 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-297-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:43:05 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.644	2072695	100.000	192468	2680	1.077	--
总计		2072695	100.000	192468			

图48 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-298-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:47:58 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.643	2080276	100.000	192729	2670	1.079	--
总计		2080276	100.000	192729			

图49 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-299-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:52:51 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.642	2075994	100.000	192008	2657	1.080	--
总计		2075994	100.000	192008			

图50 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-300-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 15:57:44 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.642	2062217	100.000	190745	2654	1.081	--
总计		2062217	100.000	190745			

图51 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-301-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:02:36 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.642	2334868	100.000	215249	2640	1.084	--
总计		2334868	100.000	215249			

图52 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-302-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:07:30 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.642	2171017	100.000	200247	2638	1.084	--
总计		2171017	100.000	200247			

图53 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-303-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:12:22 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.642	2082436	100.000	192046	2634	1.084	--
总计		2082436	100.000	192046			

图54 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-304-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:17:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.638	4033528	100.000	369207	2621	1.092	--
总计		4033528	100.000	369207			

图55 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-305-2 - zzp-25010201p-rcqx-SHUljz-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:22:09 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.638	4032793	100.000	368547	2615	1.091	--
总计		4032793	100.000	368547			

图56 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-水介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-306-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-rj.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:27:03 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-307-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:31:56 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.637	4039200	100.000	368041	2595	1.094	--
总计		4039200	100.000	368041			

图58 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-308-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:36:50 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.636	4039595	100.000	367058	2582	1.096	--
总计		4039595	100.000	367058			

图59 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-309-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:41:45 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.636	4041244	100.000	366777	2576	1.097	--
总计		4041244	100.000	366777			

图60 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-310-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:46:39 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:58:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.636	4040354	100.000	366397	2573	1.098	--
总计		4040354	100.000	366397			

图61 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-311-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:51:33 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.636	4043461	100.000	366195	2564	1.100	--
总计		4043461	100.000	366195			

图62 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-312-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 16:56:27 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.645	374139	100.000	34396	2559	1.089	--
总计		374139	100.000	34396			

图63 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-313-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:01:20 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.645	328575	100.000	30135	2543	1.090	--
总计		328575	100.000	30135			

图64 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-314-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:06:13 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.645	324901	100.000	29787	2540	1.090	--
总计		324901	100.000	29787			

图65 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-315-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:11:05 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.645	395934	100.000	36243	2535	1.093	--
总计		395934	100.000	36243			

图66 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-316-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:15:57 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.643	286091	100.000	26224	2536	1.093	--
总计		286091	100.000	26224			

图67 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-317-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:20:49 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.642	342285	100.000	31320	2527	1.094	--
总计		342285	100.000	31320			

图68 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-318-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:25:43 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.641	554282	100.000	50760	2533	1.094	--
总计		554282	100.000	50760			

图69 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-319-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:30:36 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.638	815183	100.000	74649	2528	1.095	--
总计		815183	100.000	74649			

图70 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-320-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:35:29 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.636	816550	100.000	74833	2528	1.096	--
总计		816550	100.000	74833			

图71 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-321-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:40:23 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.634	870633	100.000	79644	2522	1.098	--
总计		870633	100.000	79644			

图72 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-322-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:45:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.632	782186	100.000	71745	2520	1.099	--
总计		782186	100.000	71745			

图73 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-323-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:50:09 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.631	851653	100.000	78195	2525	1.098	--
总计		851653	100.000	78195			

图74 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-324-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:55:02 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.629	1184023	100.000	108548	2520	1.101	--
总计		1184023	100.000	108548			

图75 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-325-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 17:59:56 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.628	1201076	100.000	110096	2513	1.103	--
总计		1201076	100.000	110096			

图76 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-326-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:04:49 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.627	1167388	100.000	107000	2509	1.104	--
总计		1167388	100.000	107000			

图77 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-327-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:09:42 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.625	1228925	100.000	112687	2510	1.106	--
总计		1228925	100.000	112687			

图78 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-328-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:14:35 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.624	1166921	100.000	107055	2506	1.106	--
总计		1166921	100.000	107055			

图79 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-329-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:19:28 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.623	1232404	100.000	113062	2501	1.107	--
总计		1232404	100.000	113062			

图80 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-330-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:24:21 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.621	1439934	100.000	132245	2505	1.108	--
总计		1439934	100.000	132245			

图81 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-331-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:29:14 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.619	1445324	100.000	132406	2489	1.111	--
总计		1445324	100.000	132406			

图82 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-332-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:34:07 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.619	1455680	100.000	133249	2482	1.113	--
总计		1455680	100.000	133249			

图83 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-333-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:39:01 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 11:59:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.619	1517862	100.000	139029	2483	1.114	--
总计		1517862	100.000	139029			

图84 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-334-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:43:54 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.619	1452928	100.000	132926	2476	1.115	--
总计		1452928	100.000	132926			

图85 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-335-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:48:48 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.618	1507589	100.000	137863	2474	1.116	--
总计		1507589	100.000	137863			

图86 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-336-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:53:41 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.618	1792987	100.000	163530	2466	1.119	--
总计		1792987	100.000	163530			

图87 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-337-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 18:58:34 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.617	1849231	100.000	168773	2466	1.120	--
总计		1849231	100.000	168773			

图88 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-338-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:03:28 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.616	1814296	100.000	165548	2456	1.121	--
总计		1814296	100.000	165548			

图89 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-339-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:08:21 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.616	1792599	100.000	163635	2454	1.122	--
总计		1792599	100.000	163635			

图90 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-340-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:13:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.615	1762882	100.000	160916	2451	1.123	--
总计		1762882	100.000	160916			

图91 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-341-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:18:08 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.614	1843451	100.000	168242	2444	1.123	--
总计		1843451	100.000	168242			

图92 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-342-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:23:02 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	2026272	100.000	184680	2440	1.126	--
总计		2026272	100.000	184680			

图93 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-343-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:27:56 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	2061975	100.000	187898	2434	1.127	--
总计		2061975	100.000	187898			

图94 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-344-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:32:50 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	2054755	100.000	187057	2425	1.128	--
总计		2054755	100.000	187057			

图95 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-345-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:37:44 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	2006618	100.000	182588	2419	1.129	--
总计		2006618	100.000	182588			

图96 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-346-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:42:38 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	2074213	100.000	188675	2418	1.130	--
总计		2074213	100.000	188675			

图97 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-347-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:47:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.612	2092358	100.000	190271	2412	1.131	--
总计		2092358	100.000	190271			

图98 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-348-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:52:26 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.611	2100847	100.000	190570	2401	1.133	--
总计		2100847	100.000	190570			

图99 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-349-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 19:57:20 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	2113400	100.000	191845	2400	1.134	--
总计		2113400	100.000	191845			

图100 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-350-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:02:14 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.612	2104977	100.000	191037	2395	1.134	--
总计		2104977	100.000	191037			

图101 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-351-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:07:08 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.612	2054954	100.000	186364	2388	1.136	--
总计		2054954	100.000	186364			

图102 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-352-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:12:02 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	2131472	100.000	192874	2379	1.138	--
总计		2131472	100.000	192874			

图103 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-353-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:16:56 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.611	2148712	100.000	194473	2376	1.139	--
总计		2148712	100.000	194473			

图104 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-354-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:21:51 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.611	2135043	100.000	193113	2371	1.140	--
总计		2135043	100.000	193113			

图105 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-355-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:26:45 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:00:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.609	2080351	100.000	187849	2361	1.141	--
总计		2080351	100.000	187849			

图106 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-356-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:31:39 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.609	2043007	100.000	184430	2355	1.142	--
总计		2043007	100.000	184430			

图107 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-357-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:36:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.609	2084811	100.000	187931	2345	1.144	--
总计		2084811	100.000	187931			

图108 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-358-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:41:27 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.608	2174260	100.000	196218	2345	1.144	--
总计		2174260	100.000	196218			

图109 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-359-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:46:22 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.608	2175860	100.000	195871	2333	1.147	--
总计		2175860	100.000	195871			

图110 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-360-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:51:16 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.604	4041465	100.000	361404	2329	1.158	--
总计		4041465	100.000	361404			

图111 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-361-2 - zzp-25010202p-rcqx-SHUljz-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 20:56:10 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.604	4039265	100.000	361065	2325	1.160	--
总计		4039265	100.000	361065			

图112 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010202批-水介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-362-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-rj.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:01:03 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-363-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:05:55 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	4032669	100.000	360051	2320	1.161	--
总计		4032669	100.000	360051			

图114 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-364-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:10:48 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	4032136	100.000	359956	2318	1.161	--
总计		4032136	100.000	359956			

图115 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-365-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:15:40 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	4033275	100.000	359574	2312	1.163	--
总计		4033275	100.000	359574			

图116 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-366-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:20:33 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	4032337	100.000	359144	2307	1.164	--
总计		4032337	100.000	359144			

图117 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-367-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:25:26 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	4034570	100.000	359399	2305	1.165	--
总计		4034570	100.000	359399			

图118 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-368-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:30:18 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.612	399965	100.000	36159	2291	1.145	--
总计		399965	100.000	36159			

图119 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-369-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:35:10 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.612	343255	100.000	31047	2290	1.146	--
总计		343255	100.000	31047			

图120 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-370-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:40:02 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.612	316237	100.000	28603	2286	1.146	--
总计		316237	100.000	28603			

图121 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-371-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:44:54 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.611	315510	100.000	28525	2279	1.150	--
总计		315510	100.000	28525			

图122 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-372-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:49:46 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.611	280133	100.000	25322	2271	1.150	--
总计		280133	100.000	25322			

图123 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-373-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:54:38 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.609	317018	100.000	28599	2269	1.153	--
总计		317018	100.000	28599			

图124 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-374-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 21:59:30 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.604	866103	100.000	78255	2279	1.151	--
总计		866103	100.000	78255			

图125 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-375-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:04:22 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.604	834744	100.000	75321	2270	1.151	--
总计		834744	100.000	75321			

图126 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-376-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:09:13 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.604	812577	100.000	73353	2272	1.151	--
总计		812577	100.000	73353			

图127 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-377-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:14:04 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.603	767916	100.000	69353	2267	1.152	--
总计		767916	100.000	69353			

图128 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-378-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:18:56 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:01:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	753813	100.000	68036	2262	1.153	--
总计		753813	100.000	68036			

图129 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-379-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:23:48 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	815510	100.000	73572	2264	1.155	--
总计		815510	100.000	73572			

图130 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-380-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:28:39 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	1254662	100.000	113003	2262	1.158	--
总计		1254662	100.000	113003			

图131 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-381-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:33:31 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	1244017	100.000	111899	2253	1.159	--
总计		1244017	100.000	111899			

图132 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-382-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:38:24 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	1250706	100.000	112571	2252	1.160	--
总计		1250706	100.000	112571			

图133 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-383-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:43:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	1196951	100.000	107710	2249	1.159	--
总计		1196951	100.000	107710			

图134 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-384-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:48:07 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	1125555	100.000	101224	2241	1.161	--
总计		1125555	100.000	101224			

图135 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-385-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:52:59 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	1213954	100.000	109071	2228	1.163	--
总计		1213954	100.000	109071			

图136 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-386-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 22:57:50 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.598	1520754	100.000	136514	2229	1.165	--
总计		1520754	100.000	136514			

图137 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-387-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:02:42 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.598	1514193	100.000	135939	2227	1.166	--
总计		1514193	100.000	135939			

图138 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-388-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:07:33 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	1484349	100.000	133163	2215	1.167	--
总计		1484349	100.000	133163			

图139 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-389-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:12:25 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.598	1464102	100.000	131352	2212	1.167	--
总计		1464102	100.000	131352			

图140 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-390-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:17:16 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	1393749	100.000	124944	2210	1.168	--
总计		1393749	100.000	124944			

图141 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-391-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:22:07 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	1484750	100.000	133023	2204	1.169	--
总计		1484750	100.000	133023			

图142 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-392-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:26:58 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	1853441	100.000	165782	2202	1.172	--
总计		1853441	100.000	165782			

图143 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-393-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:31:50 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	1864950	100.000	166642	2194	1.173	--
总计		1864950	100.000	166642			

图144 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-394-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:36:41 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	1864341	100.000	166655	2192	1.174	--
总计		1864341	100.000	166655			

图145 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-395-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:41:31 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	1849237	100.000	165014	2180	1.175	--
总计		1849237	100.000	165014			

图146 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-396-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:46:22 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	1843029	100.000	164490	2179	1.176	--
总计		1843029	100.000	164490			

图147 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-397-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:51:13 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	1843651	100.000	164546	2173	1.177	--
总计		1843651	100.000	164546			

图148 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-398-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/10 23:56:04 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	2081243	100.000	185447	2168	1.180	--
总计		2081243	100.000	185447			

图149 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-399-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:00:56 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	2074354	100.000	184688	2164	1.180	--
总计		2074354	100.000	184688			

图150 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-400-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:05:47 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:02:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.595	2123823	100.000	188945	2159	1.181	--
总计		2123823	100.000	188945			

图151 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-401-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:10:39 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.595	2095773	100.000	186168	2151	1.182	--
总计		2095773	100.000	186168			

图152 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-402-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:15:31 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	2050166	100.000	181993	1975	1.184	--
总计		2050166	100.000	181993			

图153 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-403-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:20:23 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	2078010	100.000	184164	1972	1.186	--
总计		2078010	100.000	184164			

图154 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-404-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:25:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	2077997	100.000	183729	1964	1.187	--
总计		2077997	100.000	183729			

图155 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-405-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:30:07 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.836	2181147	100.000	193393	2248	1.194	--
总计		2181147	100.000	193393			

图156 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-406-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:34:59 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	2171772	100.000	192248	1971	1.189	--
总计		2171772	100.000	192248			

图157 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-407-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:39:50 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	2158059	100.000	191113	1976	1.190	--
总计		2158059	100.000	191113			

图158 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-408-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:44:41 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	2160583	100.000	191224	1975	1.190	--
总计		2160583	100.000	191224			

图159 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-409-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:49:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	2117369	100.000	187559	1983	1.190	--
总计		2117369	100.000	187559			

图160 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-410-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:54:24 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	2071782	100.000	183183	1979	1.191	--
总计		2071782	100.000	183183			

图161 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-411-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 00:59:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.595	2159508	100.000	190595	1974	1.193	--
总计		2159508	100.000	190595			

图162 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-412-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 01:04:09 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.595	2171669	100.000	191842	1980	1.194	--
总计		2171669	100.000	191842			

图163 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-413-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 01:09:01 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	2216218	100.000	195580	1978	1.196	--
总计		2216218	100.000	195580			

图164 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-414-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 01:13:53 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	2195933	100.000	193583	1979	1.196	--
总计		2195933	100.000	193583			

图165 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-415-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 01:18:45 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	2127071	100.000	187378	1980	1.197	--
总计		2127071	100.000	187378			

图166 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-416-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 01:23:37 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4044222	100.000	353960	1890	1.210	--
总计		4044222	100.000	353960			

图167 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:278nm
数据文件名 : RC$Y09 - 0-149/18-417-2 - zzp-25010203p-rcqx-SHUljz-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$Y09 - Y09-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名 : RC$Y09 - Y09-20250110-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10μL 版本号:6.115
进样时间 : 2025/01/11 01:28:30 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2025/01/13 12:03:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4043106	100.000	353839	2075	1.212	--
总计		4043106	100.000	353839			

图168 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010203批-水介质
对照品溶液-2-2