




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-757-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 14:22:56
处理时间(V2)：2025/01/14 11:08:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-758-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 14:26:22 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/01/14 11:08:51 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	97148	100.000	21604	4258	1.106	--
总计		97148	100.000	21604			

图2 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-759-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 14:29:49
处理时间(V2)：2025/01/14 11:08:54
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	97317	100.000	21609	4255	1.106	--
总计		97317	100.000	21609			

图3 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-760-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 14:33:15

处理时间(V2)：2025/01/14 11:08:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	97374	100.000	21665	4255	1.106	--
总计		97374	100.000	21665			

图4 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-761-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 14:36:41
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	97227	100.000	21606	4248	1.108	--
总计		97227	100.000	21606			

图5 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-762-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 14:40:07
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	97032	100.000	21610	4263	1.107	--
总计		97032	100.000	21610			

图6 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-763-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 14:43:32
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	7335	100.000	1648	4520	1.154	--
总计		7335	100.000	1648			

图7 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-764-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 14:46:57
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	7965	100.000	1794	4526	1.155	--
总计		7965	100.000	1794			

图8 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-765-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 14:50:22

处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	8835	100.000	1986	4535	1.159	--
总计		8835	100.000	1986			

图9 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-766-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 14:53:48

处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	8560	100.000	1952	4599	1.147	--
总计		8560	100.000	1952			

图10 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-767-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 14:57:12

处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	9862	100.000	2237	4574	1.141	--
总计		9862	100.000	2237			

图11 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-768-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:00:36
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	8259	100.000	1881	4594	1.141	--
总计		8259	100.000	1881			

图12 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-769-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 15:04:01

处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	17788	100.000	4102	4684	1.119	--
总计		17788	100.000	4102			

图13 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-770-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:07:25
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	19337	100.000	4445	4647	1.115	--
总计		19337	100.000	4445			

图14 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-771-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:10:49
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	20513	100.000	4726	4666	1.119	--
总计		20513	100.000	4726			

图15 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-772-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:14:14
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	19767	100.000	4560	4686	1.116	--
总计		19767	100.000	4560			

图16 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-773-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 15:17:39

处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	21001	100.000	4845	4676	1.118	--
总计		21001	100.000	4845			

图17 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-774-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:21:03
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	19854	100.000	4578	4672	1.120	--
总计		19854	100.000	4578			

图18 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-775-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:24:27
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	27706	100.000	6377	4676	1.115	--
总计		27706	100.000	6377			

图19 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-776-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-12 版本号：6.115
进样体积：50 μl 实验者：jiangjinwei
进样时间：2025/01/13 15:27:51 处理者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	28753	100.000	6623	4688	1.113	--
总计		28753	100.000	6623			

图20 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-777-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:31:16
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	30408	100.000	7001	4692	1.115	--
总计		30408	100.000	7001			

图21 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-778-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:34:41
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	29081	100.000	6739	4707	1.111	--
总计		29081	100.000	6739			

图22 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-779-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 15:38:07
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:49
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	30056	100.000	7020	4765	1.113	--
总计		30056	100.000	7020			

图23 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-780-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 15:41:32

处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	28996	100.000	6718	4702	1.113	--
总计		28996	100.000	6718			

图24 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-781-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-4
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:12:01
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	33710	100.000	7775	4694	1.115	--
总计		33710	100.000	7775			

图25 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-782-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:15:26
处理时间(V2)：2025/01/14 11:09:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	35448	100.000	8258	4754	1.112	--
总计		35448	100.000	8258			

图26 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-783-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-22

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 16:18:50

处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	37068	100.000	8622	4751	1.110	--
总计		37068	100.000	8622			

图27 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-784-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-31
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:22:15
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	36057	100.000	8369	4739	1.112	--
总计		36057	100.000	8369			

图28 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-785-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 16:25:40

处理时间(V2): 2025/01/14 11:10:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	36612	100.000	8432	4684	1.114	--
总计		36612	100.000	8432			

图29 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-786-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-49
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:29:05
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	36039	100.000	8377	4728	1.110	--
总计		36039	100.000	8377			

图30 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-787-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:32:29
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:11
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	42970	100.000	10074	4806	1.109	--
总计		42970	100.000	10074			

图31 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-788-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-14
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 16:35:54 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	43200	100.000	10113	4798	1.108	--
总计		43200	100.000	10113			

图32 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-789-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-23

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 16:39:19

处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	45520	100.000	10527	4707	1.111	--
总计		45520	100.000	10527			

图33 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-790-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-32
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:42:44
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	44824	100.000	10365	4708	1.112	--
总计		44824	100.000	10365			

图34 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-791-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-41
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:46:09
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	45050	100.000	10578	4807	1.107	--
总计		45050	100.000	10578			

图35 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-792-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:49:35
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	44918	100.000	10402	4693	1.111	--
总计		44918	100.000	10402			

图36 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-793-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:52:59
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	52109	100.000	12226	4803	1.108	--
总计		52109	100.000	12226			

图37 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-794-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-15
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:56:24
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:31
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	53121	100.000	12253	4688	1.111	--
总计		53121	100.000	12253			

图38 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-795-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-24
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:59:50
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	54782	100.000	12870	4811	1.106	--
总计		54782	100.000	12870			

图39 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-796-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-33

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:03:16

处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	53268	100.000	12416	4752	1.110	--
总计		53268	100.000	12416			

图40 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-797-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 17:06:42 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:10:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	53972	100.000	12632	4781	1.109	--
总计		53972	100.000	12632			

图41 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-798-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-51
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:10:07
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:42
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	53190	100.000	12323	4704	1.110	--
总计		53190	100.000	12323			

图42 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-799-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-7
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:13:31
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	58649	100.000	13588	4715	1.112	--
总计		58649	100.000	13588			

图43 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-800-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-16
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:16:57
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	59666	100.000	13867	4724	1.110	--
总计		59666	100.000	13867			

图44 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-801-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-25
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:20:21
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	60151	100.000	13978	4742	1.109	--
总计		60151	100.000	13978			

图45 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-802-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-34 版本号：6.115
进样体积：50 μl 实验者：jiangjinwei
进样时间：2025/01/13 17:23:47 处理者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	60007	100.000	14002	4746	1.110	--
总计		60007	100.000	14002			

图46 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-803-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-43
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:27:11
处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	59598	100.000	13872	4730	1.109	--
总计		59598	100.000	13872			

图47 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-804-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-52

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:30:35

处理时间(V2)：2025/01/14 11:10:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	59283	100.000	13819	4744	1.109	--
总计		59283	100.000	13819			

图48 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-805-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:34:01
处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	66440	100.000	15470	4744	1.108	--
总计		66440	100.000	15470			

图49 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-806-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-17
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:37:27
处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	68130	100.000	15826	4723	1.110	--
总计		68130	100.000	15826			

图50 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-807-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:40:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	68341	100.000	15915	4747	1.109	--
总计		68341	100.000	15915			

图51 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-808-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-35

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:44:19

处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	67106	100.000	15640	4755	1.109	--
总计		67106	100.000	15640			

图52 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-809-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-44

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:47:44

处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	66259	100.000	15426	4744	1.110	--
总计		66259	100.000	15426			

图53 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-810-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-53
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:51:10
处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:14
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	65708	100.000	15280	4729	1.110	--
总计		65708	100.000	15280			

图54 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-811-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 17:54:35

处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	68749	100.000	15985	4732	1.108	--
总计		68749	100.000	15985			

图55 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-812-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 17:57:59
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	69168	100.000	16046	4712	1.108	--
总计		69168	100.000	16046			

图56 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-813-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 18:01:23 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	70368	100.000	16311	4726	1.108	--
总计		70368	100.000	16311			

图57 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-814-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-120min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-28

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:04:48

处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	72578	100.000	16920	4748	1.107	--
总计		72578	100.000	16920			

图58 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-815-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 18:08:13

处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	70773	100.000	16618	4811	1.105	--
总计		70773	100.000	16618			

图59 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-816-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-46
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:11:38
处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	72033	100.000	16781	4747	1.107	--
总计		72033	100.000	16781			

图60 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-817-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-180min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 18:15:03
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	75827	100.000	17811	4811	1.105	--
总计		75827	100.000	17811			

图61 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-818-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-180min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-11

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:18:28

处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	77799	100.000	18052	4718	1.108	--
总计		77799	100.000	18052			

图62 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-819-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-180min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 18:21:52 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	76242	100.000	17901	4803	1.105	--
总计		76242	100.000	17901			

图63 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-820-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-180min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:25:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	79100	100.000	18487	4773	1.107	--
总计		79100	100.000	18487			

图64 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30℃ 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-821-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-180min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:28:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	78036	100.000	18209	4762	1.106	--
总计		78036	100.000	18209			

图65 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30℃ 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-822-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-180min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:32:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	77283	100.000	18045	4760	1.106	--
总计		77283	100.000	18045			

图66 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-823-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-240min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-3

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:35:28

处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	79537	100.000	18605	4777	1.106	--
总计		79537	100.000	18605			

图67 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-824-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-240min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 18:38:53

处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	83391	100.000	19421	4732	1.108	--
总计		83391	100.000	19421			

图68 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-825-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-240min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-21
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:42:18
处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	81730	100.000	19069	4751	1.107	--
总计		81730	100.000	19069			

图69 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-826-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-240min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-30
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:45:42
处理时间(V2)：2025/01/14 11:11:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	80911	100.000	19025	4811	1.106	--
总计		80911	100.000	19025			

图70 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30℃ 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-827-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-240min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:49:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:11:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	80609	100.000	18775	4738	1.108	--
总计		80609	100.000	18775			

图71 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-828-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-240min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-48
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:52:33
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:02
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	79634	100.000	18523	4716	1.108	--
总计		79634	100.000	18523			

图72 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-829-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 18:55:57

处理时间(V2): 2025/01/14 11:12:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	78920	100.000	18314	4705	1.108	--
总计		78920	100.000	18314			

图73 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-830-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-13
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:59:21
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	81530	100.000	19027	4744	1.107	--
总计		81530	100.000	19027			

图74 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-831-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-22
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:02:45
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	82359	100.000	19288	4786	1.106	--
总计		82359	100.000	19288			

图75 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-832-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-31
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:06:10
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:12
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	83317	100.000	19577	4802	1.105	--
总计		83317	100.000	19577			

图76 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-833-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-40
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:09:35
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	80967	100.000	19082	4837	1.105	--
总计		80967	100.000	19082			

图77 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-834-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-49

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:13:00

处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	81851	100.000	19052	4724	1.108	--
总计		81851	100.000	19052			

图78 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-835-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:16:25

处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	97533	100.000	21787	4277	1.117	--
总计		97533	100.000	21787			

图79 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-836-2 - zzp-25010201-1-2p-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:19:51
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	97545	100.000	21790	4279	1.117	--
总计		97545	100.000	21790			

图80 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-837-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:23:19
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图81 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-838-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:26:45

处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	49390	100.000	11035	4273	1.117	--
总计		49390	100.000	11035			

图82 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-839-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:30:12
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	49323	100.000	11043	4286	1.115	--
总计		49323	100.000	11043			

图83 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-840-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:33:38

处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	49377	100.000	11039	4278	1.117	--
总计		49377	100.000	11039			

图84 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-841-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:37:06

处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	49204	100.000	10993	4282	1.117	--
总计		49204	100.000	10993			

图85 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-842-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:40:32
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:40
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	49225	100.000	11024	4295	1.115	--
总计		49225	100.000	11024			

图86 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30°C
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-843-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 19:43:57
处理时间(V2): 2025/01/14 11:12:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	3997	100.000	885	4464	1.365	--
总计		3997	100.000	885			

图87 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-844-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 19:47:23

处理时间(V2): 2025/01/14 11:12:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	4623	100.000	1036	4505	1.251	--
总计		4623	100.000	1036			

图88 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-845-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 19:50:48

处理时间(V2): 2025/01/14 11:12:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	4198	100.000	921	4395	1.356	--
总计		4198	100.000	921			

图89 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-846-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 19:54:14
处理时间(V2): 2025/01/14 11:12:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	5282	100.000	1185	4511	1.185	--
总计		5282	100.000	1185			

图90 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-847-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:57:41
处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	5244	100.000	1184	4632	1.184	--
总计		5244	100.000	1184			

图91 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-848-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:01:06

处理时间(V2)：2025/01/14 11:12:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	4404	100.000	978	4411	1.239	--
总计		4404	100.000	978			

图92 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30°C
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-849-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 20:04:32
处理时间(V2): 2025/01/14 11:13:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	10154	100.000	2367	4757	1.133	--
总计		10154	100.000	2367			

图93 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-850-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:07:58
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	10747	100.000	2461	4634	1.140	--
总计		10747	100.000	2461			

图94 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-851-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-20
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:11:23
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	10644	100.000	2449	4650	1.136	--
总计		10644	100.000	2449			

图95 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-852-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:14:48
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	10460	100.000	2412	4667	1.138	--
总计		10460	100.000	2412			

图96 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-853-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-38
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:18:13
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:11
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	11160	100.000	2568	4668	1.132	--
总计		11160	100.000	2568			

图97 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-854-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:21:39
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:14
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	10805	100.000	2488	4647	1.134	--
总计		10805	100.000	2488			

图98 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-855-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-3
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:25:05
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	14876	100.000	3474	4767	1.122	--
总计		14876	100.000	3474			

图99 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-856-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:28:32
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	16028	100.000	3726	4742	1.124	--
总计		16028	100.000	3726			

图100 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-857-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-21
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:31:58
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	15805	100.000	3705	4789	1.123	--
总计		15805	100.000	3705			

图101 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-858-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-30
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:35:23
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	15524	100.000	3584	4675	1.131	--
总计		15524	100.000	3584			

图102 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-859-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:38:49
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	16309	100.000	3764	4660	1.125	--
总计		16309	100.000	3764			

图103 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-860-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:42:16
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	15988	100.000	3710	4696	1.124	--
总计		15988	100.000	3710			

图104 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-861-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-4
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:45:42
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	18663	100.000	4366	4783	1.121	--
总计		18663	100.000	4366			

图105 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-862-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-13
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:49:09
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	19827	100.000	4590	4692	1.122	--
总计		19827	100.000	4590			

图106 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-863-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-22

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:52:34

处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	20017	100.000	4703	4815	1.118	--
总计		20017	100.000	4703			

图107 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-864-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-31

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:56:00

处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	19207	100.000	4495	4768	1.121	--
总计		19207	100.000	4495			

图108 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-865-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-40
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:59:27
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	20022	100.000	4671	4758	1.121	--
总计		20022	100.000	4671			

图109 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-866-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-49
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:02:52
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	19852	100.000	4652	4800	1.119	--
总计		19852	100.000	4652			

图110 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-867-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 21:06:20
处理时间(V2): 2025/01/14 11:13:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	23758	100.000	5555	4756	1.119	--
总计		23758	100.000	5555			

图111 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-868-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-14

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 21:09:47

处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	24918	100.000	5797	4705	1.120	--
总计		24918	100.000	5797			

图112 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-869-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:13:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:13:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	25133	100.000	5892	4787	1.115	--
总计		25133	100.000	5892			

图113 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-870-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-32
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:16:40
处理时间(V2)：2025/01/14 11:13:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	24476	100.000	5714	4715	1.116	--
总计		24476	100.000	5714			

图114 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-871-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-41

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 21:20:05

处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	25291	100.000	5931	4786	1.120	--
总计		25291	100.000	5931			

图115 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-872-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 21:23:31

处理时间(V2): 2025/01/14 11:14:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	24843	100.000	5853	4839	1.119	--
总计		24843	100.000	5853			

图116 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-873-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-6
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:26:59
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	29906	100.000	7069	4867	1.115	--
总计		29906	100.000	7069			

图117 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-874-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-15 版本号：6.115
进样体积：50 μl 实验者：jiangjinwei
进样时间：2025/01/13 21:30:26 处理者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	30258	100.000	7113	4801	1.117	--
总计		30258	100.000	7113			

图118 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-875-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-24
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:33:52
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:12
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	30842	100.000	7254	4812	1.118	--
总计		30842	100.000	7254			

图119 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-876-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-33
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 21:37:18 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:14 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	29705	100.000	6960	4782	1.118	--
总计		29705	100.000	6960			

图120 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-877-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-42
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:40:45
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	30985	100.000	7300	4826	1.114	--
总计		30985	100.000	7300			

图121 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-878-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-51
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 21:44:12 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:20 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	30344	100.000	7149	4819	1.117	--
总计		30344	100.000	7149			

图122 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-879-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-7
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:47:37
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	32854	100.000	7773	4874	1.111	--
总计		32854	100.000	7773			

图123 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-880-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-16
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:51:04
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	33138	100.000	7852	4884	1.110	--
总计		33138	100.000	7852			

图124 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-881-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:54:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:14:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	33396	100.000	7905	4855	1.111	--
总计		33396	100.000	7905			

图125 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-882-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 21:57:59

处理时间(V2): 2025/01/14 11:14:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	32900	100.000	7752	4800	1.112	--
总计		32900	100.000	7752			

图126 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-883-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-43

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 22:01:25

处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	33278	100.000	7829	4783	1.112	--
总计		33278	100.000	7829			

图127 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-884-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 22:04:51 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:14:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	33720	100.000	7925	4771	1.113	--
总计		33720	100.000	7925			

图128 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-885-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-8

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 22:08:18

处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	37475	100.000	8811	4786	1.112	--
总计		37475	100.000	8811			

图129 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-886-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-17

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 22:11:44

处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	37419	100.000	8801	4782	1.113	--
总计		37419	100.000	8801			

图130 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-887-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-26

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 22:15:12

处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	38616	100.000	9100	4799	1.111	--
总计		38616	100.000	9100			

图131 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-888-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 22:18:38

处理时间(V2): 2025/01/14 11:14:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	38759	100.000	9135	4795	1.112	--
总计		38759	100.000	9135			

图132 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-889-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-44

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 22:22:04

处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	38297	100.000	9012	4777	1.111	--
总计		38297	100.000	9012			

图133 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-890-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-53
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 22:25:32
处理时间(V2)：2025/01/14 11:14:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	39097	100.000	9198	4804	1.113	--
总计		39097	100.000	9198			

图134 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-891-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 22:28:56

处理时间(V2): 2025/01/14 11:14:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	41391	100.000	9760	4814	1.112	--
总计		41391	100.000	9760			

图135 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-892-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 22:32:21
处理时间(V2): 2025/01/14 11:14:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	40696	100.000	9589	4791	1.113	--
总计		40696	100.000	9589			

图136 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-893-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:35:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	41326	100.000	9729	4794	1.110	--
总计		41326	100.000	9729			

图137 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-894-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 22:39:09 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	40399	100.000	9514	4798	1.113	--
总计		40399	100.000	9514			

图138 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-895-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 22:42:33

处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	41067	100.000	9695	4811	1.113	--
总计		41067	100.000	9695			

图139 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-896-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 22:45:58

处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	40435	100.000	9507	4774	1.114	--
总计		40435	100.000	9507			

图140 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30°C
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-897-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-180min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 22:49:22
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	43913	100.000	10361	4816	1.110	--
总计		43913	100.000	10361			

图141 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-898-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-180min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 22:52:46 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	44600	100.000	10510	4802	1.112	--
总计		44600	100.000	10510			

图142 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-180min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-899-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-180min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-24
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 22:56:10
处理时间(V2)：2025/01/14 11:15:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	44818	100.000	10556	4802	1.113	--
总计		44818	100.000	10556			

图143 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-900-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-180min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 22:59:34

处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	44257	100.000	10505	4905	1.110	--
总计		44257	100.000	10505			

图144 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-901-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-180min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 23:02:58

处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	45194	100.000	10656	4806	1.113	--
总计		45194	100.000	10656			

图145 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-902-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-180min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 23:06:21
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	44688	100.000	10555	4847	1.111	--
总计		44688	100.000	10555			

图146 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-180min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-903-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p1-240min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-7 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 23:09:46 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	46312	100.000	10948	4833	1.114	--
总计		46312	100.000	10948			

图147 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-904-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-240min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 23:13:11
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	45676	100.000	10747	4781	1.114	--
总计		45676	100.000	10747			

图148 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-240min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-905-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-240min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 23:16:34 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	45996	100.000	10848	4826	1.112	--
总计		45996	100.000	10848			

图149 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-906-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-240min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 23:19:59

处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	45472	100.000	10734	4835	1.113	--
总计		45472	100.000	10734			

图150 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-240min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-907-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-240min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 23:23:23
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	46022	100.000	10839	4808	1.113	--
总计		46022	100.000	10839			

图151 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-908-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-240min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 23:26:47 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	46680	100.000	11027	4837	1.113	--
总计		46680	100.000	11027			

图152 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-浆法-50转-240min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-909-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-pl-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/13 23:30:11
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	44752	100.000	10532	4783	1.114	--
总计		44752	100.000	10532			

图153 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-910-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 23:33:36

处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	45781	100.000	10771	4801	1.113	--
总计		45781	100.000	10771			

图154 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-911-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p3-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-26

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 23:37:00

处理时间(V2)：2025/01/14 11:15:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	46624	100.000	10957	4767	1.114	--
总计		46624	100.000	10957			

图155 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-912-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 23:40:26

处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	45527	100.000	10715	4796	1.114	--
总计		45527	100.000	10715			

图156 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-913-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/01/13 23:43:50 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	45588	100.000	10734	4801	1.115	--
总计		45588	100.000	10734			

图157 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 18-11/27-914-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/13 23:47:15

处理时间(V2): 2025/01/14 11:15:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	45606	100.000	10722	4802	1.114	--
总计		45606	100.000	10722			

图158 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-915-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 23:50:41
处理时间(V2)：2025/01/14 11:16:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	49862	100.000	11137	4336	1.121	--
总计		49862	100.000	11137			

图159 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-11/27-916-2 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 23:54:09

处理时间(V2)：2025/01/14 11:16:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	50041	100.000	11174	4335	1.122	--
总计		50041	100.000	11174			

图160 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2