




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-333-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 16:22:23
处理时间(V3)：2025/01/14 09:10:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-334-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 16:33:49

处理时间(V3)：2025/01/14 09:10:44


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.675	129960	100.000	10351	6553	0.989	--
总计		129960	100.000	10351			

图2 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-335-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 16:45:15

处理时间(V3)：2025/01/14 09:10:47


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.678	129997	100.000	10362	6590	0.988	--
总计		129997	100.000	10362			

图3 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-2



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-336-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 16:56:40

处理时间(V3)：2025/01/14 09:10:49


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.677	130296	100.000	10360	6529	0.987	--
总计		130296	100.000	10360			

图4 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-3



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-337-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:08:06

处理时间(V3)：2025/01/14 09:10:52


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.681	129858	100.000	10379	6580	0.994	--
总计		129858	100.000	10379			

图5 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-4



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-338-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:19:32

处理时间(V3)：2025/01/14 09:10:55


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.679	129452	100.000	10365	6574	0.994	--
总计		129452	100.000	10365			

图6 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-5



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-339-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:30:57

处理时间(V3)：2025/01/14 09:10:57


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.724	129139	100.000	12093	9328	0.959	--
总计		129139	100.000	12093			

图7 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-340-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P1-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:42:22

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:00


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.727	129186	100.000	12086	9333	0.961	--
总计		129186	100.000	12086			

图8 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片1
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-341-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P2-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:53:47

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:02


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.723	138460	100.000	13002	9424	0.956	--
总计		138460	100.000	13002			

图9 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-342-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:05:12

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:05


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.718	138358	100.000	12968	9377	0.960	--
总计		138358	100.000	12968			

图10 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片2
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-343-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P3-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:16:37

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:07


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.724	127729	100.000	11957	9335	0.960	--
总计		127729	100.000	11957			

图11 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-344-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P3-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:28:02

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:10


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.722	127845	100.000	11974	9325	0.961	--
总计		127845	100.000	11974			

图12 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片3
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-345-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P4-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:39:26

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:12


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.725	133528	100.000	12486	9339	0.957	--
总计		133528	100.000	12486			

图13 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-346-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P4-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:50:50

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:15


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.723	133184	100.000	12560	9464	0.959	--
总计		133184	100.000	12560			

图14 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片4
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-347-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P5-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:02:15

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:18


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.723	129653	100.000	12181	9458	0.957	--
总计		129653	100.000	12181			

图15 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-348-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:13:40
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.720	129722	100.000	12188	9385	0.958	--
总计		129722	100.000	12188			

图16 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片5
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-349-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P6-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:25:03

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:23


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.719	136895	100.000	12897	9417	0.960	--
总计		136895	100.000	12897			

图17 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-350-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-P6-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:36:27

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:25


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.718	136934	100.000	12881	9377	0.958	--
总计		136934	100.000	12881			

图18 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质-片6
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-351-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:47:53

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:28


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.670	129872	100.000	10434	6615	0.995	--
总计		129872	100.000	10434			

图19 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-352-3 - zz-25010201-1-2p-rcd-15mg-SHUI+SDSjz-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:59:19

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:31


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.667	129665	100.000	10422	6650	0.995	--
总计		129665	100.000	10422			

图20 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-1-2批(15mg规格)-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-353-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:10:46
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图21 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-354-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:22:12 实验者：jiangjinwei
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:36 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.669	129800	100.000	10425	6630	0.995	--
总计		129800	100.000	10425			

图22 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-355-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:33:39
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.669	130000	100.000	10404	6598	0.992	--
总计		130000	100.000	10404			

图23 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-356-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:45:06
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.673	129466	100.000	10402	6632	0.994	--
总计		129466	100.000	10402			

图24 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-357-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:56:32
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.669	129576	100.000	10393	6642	0.994	--
总计		129576	100.000	10393			

图25 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-358-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 21:07:59

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:46


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.671	129544	100.000	10416	6613	0.993	--
总计		129544	100.000	10416			

图26 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-359-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 21:19:26 实验者：jiangjinwei
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:49 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.727	133551	100.000	12728	9704	0.958	--
总计		133551	100.000	12728			

图27 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-360-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:30:50
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:51
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.728	133969	100.000	12750	9638	0.958	--
总计		133969	100.000	12750			

图28 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片1
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-361-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P2-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：2-10

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 21:42:17

处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:54


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.724	135731	100.000	12971	9716	0.956	--
总计		135731	100.000	12971			

图29 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-362-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:53:43
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:57
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.725	135777	100.000	12956	9713	0.959	--
总计		135777	100.000	12956			

图30 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片2
供试品溶液-2




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-363-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 22:05:09
处理时间(V3)：2025/01/14 09:11:59
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.727	134831	100.000	12837	9686	0.959	--
总计		134831	100.000	12837			

图31 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-364-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P3-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：2-19

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 22:16:34

处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:02


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.731	134391	100.000	12838	9736	0.960	--
总计		134391	100.000	12838			

图32 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片3
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-365-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 22:28:00
处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.732	133167	100.000	12739	9774	0.959	--
总计		133167	100.000	12739			

图33 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-366-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 22:39:26
处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.735	133147	100.000	12738	9789	0.959	--
总计		133147	100.000	12738			

图34 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片4
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-367-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P5-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：2-37

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 22:50:52

处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:10


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.733	137536	100.000	13138	9767	0.962	--
总计		137536	100.000	13138			

图35 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-368-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P5-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：2-37

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 23:02:17

处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:13


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.728	137697	100.000	13148	9749	0.961	--
总计		137697	100.000	13148			

图36 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片5
供试品溶液-2



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-369-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P6-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 23:13:42

处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速：1.5ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.730	126849	100.000	12104	9682	0.960	--
总计		126849	100.000	12104			

图37 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-370-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 23:25:08 实验者：jiangjinwei
处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:18 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.731	126695	100.000	12095	9697	0.963	--
总计		126695	100.000	12095			

图38 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质-片6
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-371-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 23:36:34

处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:21


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.676	130668	100.000	10510	6708	0.995	--
总计		130668	100.000	10510			

图39 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 18-9/30-372-3 - zz-25010201-2-2p-rcd-7.5mg-SHUI+SDSjz-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcd-FX279.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcd-FX279.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 23:48:00

处理时间(V3)：2025/01/14 09:12:24


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX279)

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	6.678	131053	100.000	10549	6679	0.992	--
总计		131053	100.000	10549			

图40 托伐普坦口崩片溶出度测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批-水(内含%SDS)介质
对照品溶液-2-2