




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1874-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:33:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:21:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1875-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:38:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	748910	100.000	90126	1676	1.035	--
总计		748910	100.000	90126			


图2 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1876-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:42:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	745906	100.000	90130	1688	1.035	--
总计		745906	100.000	90130			


图3 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1877-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:47:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	747975	100.000	90125	1682	1.036	--
总计		747975	100.000	90125			


图4 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1878-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:51:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	748680	100.000	90218	1675	1.036	--
总计		748680	100.000	90218			


图5 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1879-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:55:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	746650	100.000	90284	1679	1.036	--
总计		746650	100.000	90284			


图6 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1880-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:00:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	195111	100.000	23153	1590	1.043	--
总计		195111	100.000	23153			


图7 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1881-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:04:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	213946	100.000	25470	1608	1.044	--
总计		213946	100.000	25470			

图8 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1882-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:08:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:22:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	191473	100.000	22805	1602	1.042	--
总计		191473	100.000	22805			


图9 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1883-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:13:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	191151	100.000	22702	1602	1.040	--
总计		191151	100.000	22702			


图10 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1884-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:17:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	187866	100.000	22295	1593	1.043	--
总计		187866	100.000	22295			

图11 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1885-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:22:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:22:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	240621	100.000	28598	1600	1.041	--
总计		240621	100.000	28598			


图12 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1886-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:26:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	397962	100.000	47006	1588	1.043	--
总计		397962	100.000	47006			


图13 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1887-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:30:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	403088	100.000	47720	1592	1.044	--
总计		403088	100.000	47720			


图14 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1888-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:35:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	375739	100.000	44503	1597	1.042	--
总计		375739	100.000	44503			


图15 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1889-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:39:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	346550	100.000	41116	1596	1.042	--
总计		346550	100.000	41116			


图16 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1890-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:43:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	366393	100.000	43469	1599	1.042	--
总计		366393	100.000	43469			


图17 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1891-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:48:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	431398	100.000	51138	1595	1.045	--
总计		431398	100.000	51138			


图18 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1892-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:52:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	507827	100.000	60362	1604	1.045	--
总计		507827	100.000	60362			


图19 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1893-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:57:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	512198	100.000	60636	1590	1.043	--
总计		512198	100.000	60636			


图20 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1894-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:01:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	475504	100.000	56286	1591	1.045	--
总计		475504	100.000	56286			


图21 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1895-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:05:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	433779	100.000	51321	1592	1.043	--
总计		433779	100.000	51321			


图22 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1896-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:10:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	464772	100.000	55126	1597	1.044	--
总计		464772	100.000	55126			


图23 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1897-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:14:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	528999	100.000	62637	1592	1.045	--
总计		528999	100.000	62637			


图24 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1898-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:18:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	563556	100.000	66720	1592	1.046	--
总计		563556	100.000	66720			


图25 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1899-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:23:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	536723	100.000	63569	1598	1.044	--
总计		536723	100.000	63569			

图26 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1900-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:27:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 09:22:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	520944	100.000	61709	1595	1.046	--
总计		520944	100.000	61709			


图27 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1901-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:32:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:22:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	502520	100.000	59697	1603	1.044	--
总计		502520	100.000	59697			

图28 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1902-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:36:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 09:22:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	535286	100.000	63483	1599	1.044	--
总计		535286	100.000	63483			


图29 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1903-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:40:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	576566	100.000	68194	1588	1.046	--
总计		576566	100.000	68194			


图30 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1904-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:45:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	647708	100.000	76670	1596	1.045	--
总计		647708	100.000	76670			

图31 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1905-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:49:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:23:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	624488	100.000	73767	1589	1.046	--
总计		624488	100.000	73767			


图32 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1906-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:53:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	593643	100.000	70189	1590	1.044	--
总计		593643	100.000	70189			

图33 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1907-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:58:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:23:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	572002	100.000	67738	1593	1.045	--
总计		572002	100.000	67738			


图34 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1908-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:02:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	581251	100.000	68818	1589	1.045	--
总计		581251	100.000	68818			


图35 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1909-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:06:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	575498	100.000	67947	1585	1.045	--
总计		575498	100.000	67947			


图36 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1910-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:11:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	638008	100.000	75505	1591	1.047	--
总计		638008	100.000	75505			


图37 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1911-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:15:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	635284	100.000	75051	1587	1.046	--
总计		635284	100.000	75051			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1912-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:20:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	598933	100.000	70735	1582	1.045	--
总计		598933	100.000	70735			

图39 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1913-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 01:24:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:23:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	605907	100.000	71585	1589	1.045	--
总计		605907	100.000	71585			


图40 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1914-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:28:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	603623	100.000	71400	1592	1.045	--
总计		603623	100.000	71400			

图41 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1915-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 01:33:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:23:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	626048	100.000	74070	1591	1.046	--
总计		626048	100.000	74070			


图42 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1916-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:37:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	642188	100.000	76059	1590	1.046	--
总计		642188	100.000	76059			


图43 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1917-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 01:41:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	637145	100.000	75317	1584	1.045	--
总计		637145	100.000	75317			


图44 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1918-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 01:46:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	590004	100.000	69875	1595	1.046	--
总计		590004	100.000	69875			


图45 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1919-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:50:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	612740	100.000	72531	1592	1.045	--
总计		612740	100.000	72531			


图46 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1920-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:55:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	634136	100.000	75013	1591	1.046	--
总计		634136	100.000	75013			

图47 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1921-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 01:59:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:23:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	637434	100.000	75618	1594	1.046	--
总计		637434	100.000	75618			

图48 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1922-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 02:03:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:23:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	609834	100.000	72135	1583	1.046	--
总计		609834	100.000	72135			


图49 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1923-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:08:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:23:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	641796	100.000	76040	1591	1.046	--
总计		641796	100.000	76040			

图50 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1924-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 02:12:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:23:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	638185	100.000	75739	1592	1.047	--
总计		638185	100.000	75739			


图51 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1925-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 02:16:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:24:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	642528	100.000	76001	1592	1.046	--
总计		642528	100.000	76001			


图52 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1926-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:21:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:24:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	653723	100.000	77356	1592	1.045	--
总计		653723	100.000	77356			


图53 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1927-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:25:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:24:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	654956	100.000	77562	1583	1.047	--
总计		654956	100.000	77562			


图54 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1928-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 02:30:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:24:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	750017	100.000	90650	1673	1.039	--
总计		750017	100.000	90650			


图55 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1929-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 02:34:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:24:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	749663	100.000	90605	1679	1.038	--
总计		749663	100.000	90605			

图56 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1989-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 10:01:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:28:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1990-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 10:05:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:28:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	748039	100.000	89083	1677	1.045	--
总计		748039	100.000	89083			


图58 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1991-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 10:09:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:28:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	747218	100.000	89087	1682	1.045	--
总计		747218	100.000	89087			

图59 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1992-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 10:14:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:28:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	747085	100.000	88970	1679	1.045	--
总计		747085	100.000	88970			


图60 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1993-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 10:18:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:28:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	748959	100.000	88900	1676	1.044	--
总计		748959	100.000	88900			


图61 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1994-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 10:23:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:28:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	746960	100.000	89013	1684	1.044	--
总计		746960	100.000	89013			


图62 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1995-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 10:27:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	221463	100.000	26021	1604	1.051	--
总计		221463	100.000	26021			

图63 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1996-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 10:31:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:29:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	225094	100.000	26285	1592	1.050	--
总计		225094	100.000	26285			


图64 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1997-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 10:36:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	190217	100.000	22285	1601	1.049	--
总计		190217	100.000	22285			


图65 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1998-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 10:40:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	231911	100.000	27095	1592	1.049	--
总计		231911	100.000	27095			


图66 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-1999-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 10:44:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	208824	100.000	24400	1592	1.052	--
总计		208824	100.000	24400			


图67 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2000-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 10:49:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	210898	100.000	24717	1602	1.051	--
总计		210898	100.000	24717			

图68 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2001-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 10:53:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 09:29:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	406208	100.000	47426	1593	1.051	--
总计		406208	100.000	47426			


图69 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2002-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 10:58:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	404147	100.000	47403	1609	1.051	--
总计		404147	100.000	47403			


图70 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2003-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:02:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	357362	100.000	41740	1594	1.052	--
总计		357362	100.000	41740			


图71 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2004-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:06:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	432762	100.000	50504	1591	1.052	--
总计		432762	100.000	50504			


图72 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2005-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:11:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	402662	100.000	47079	1596	1.053	--
总计		402662	100.000	47079			


图73 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2006-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:15:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	315921	100.000	36913	1589	1.052	--
总计		315921	100.000	36913			


图74 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2007-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 11:19:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	530508	100.000	61957	1595	1.053	--
总计		530508	100.000	61957			


图75 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2008-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:24:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	519117	100.000	60688	1597	1.053	--
总计		519117	100.000	60688			


图76 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2009-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 11:28:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	446785	100.000	52134	1590	1.053	--
总计		446785	100.000	52134			


图77 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2010-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 11:33:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	485624	100.000	56529	1578	1.054	--
总计		485624	100.000	56529			

图78 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2011-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 11:37:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:29:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	431420	100.000	50301	1587	1.053	--
总计		431420	100.000	50301			

图79 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2012-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 11:41:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:29:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	480727	100.000	56049	1589	1.053	--
总计		480727	100.000	56049			


图80 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2013-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:46:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	545470	100.000	63608	1584	1.053	--
总计		545470	100.000	63608			


图81 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2014-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:50:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	564096	100.000	65700	1581	1.054	--
总计		564096	100.000	65700			


图82 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2015-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:54:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	520441	100.000	60700	1590	1.052	--
总计		520441	100.000	60700			


图83 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2016-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 11:59:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:29:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	541714	100.000	63201	1590	1.054	--
总计		541714	100.000	63201			

图84 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2017-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 12:03:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:30:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	545744	100.000	63467	1581	1.053	--
总计		545744	100.000	63467			


图85 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2018-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:07:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	518448	100.000	60391	1586	1.052	--
总计		518448	100.000	60391			


图86 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2019-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:12:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	571159	100.000	66419	1582	1.053	--
总计		571159	100.000	66419			


图87 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2020-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:16:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	562920	100.000	65704	1590	1.053	--
总计		562920	100.000	65704			


图88 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2021-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:21:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	576977	100.000	67348	1593	1.053	--
总计		576977	100.000	67348			


图89 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2022-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:25:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	567231	100.000	66147	1592	1.054	--
总计		567231	100.000	66147			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2023-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:29:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	581562	100.000	67720	1588	1.053	--
总计		581562	100.000	67720			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2024-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 12:34:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	589098	100.000	68835	1595	1.053	--
总计		589098	100.000	68835			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2025-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:38:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	598866	100.000	69834	1591	1.053	--
总计		598866	100.000	69834			

图93 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2026-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 12:42:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:30:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	608422	100.000	70877	1586	1.053	--
总计		608422	100.000	70877			


图94 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2027-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:47:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	606066	100.000	70633	1596	1.052	--
总计		606066	100.000	70633			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2028-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:51:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	622238	100.000	72411	1584	1.053	--
总计		622238	100.000	72411			


图96 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2029-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 12:55:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	665643	100.000	77517	1588	1.053	--
总计		665643	100.000	77517			




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2030-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:00:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:30:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	598806	100.000	69765	1589	1.054	--
总计		598806	100.000	69765			


图98 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2031-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:04:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	676587	100.000	78929	1590	1.054	--
总计		676587	100.000	78929			

图99 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2032-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:09:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:30:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	621778	100.000	72411	1584	1.055	--
总计		621778	100.000	72411			


图100 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2033-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:13:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	620222	100.000	72232	1588	1.054	--
总计		620222	100.000	72232			


图101 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2034-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:17:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	616073	100.000	71657	1583	1.053	--
总计		616073	100.000	71657			


图102 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2035-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:22:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	658978	100.000	76726	1589	1.054	--
总计		658978	100.000	76726			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2036-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:26:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:30:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	582525	100.000	67934	1590	1.054	--
总计		582525	100.000	67934			

图104 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2037-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:30:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:30:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	682372	100.000	79547	1590	1.054	--
总计		682372	100.000	79547			


图105 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2038-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:35:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:31:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	651077	100.000	75875	1588	1.052	--
总计		651077	100.000	75875			


图106 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2039-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:39:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:31:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	663992	100.000	77360	1588	1.053	--
总计		663992	100.000	77360			


图107 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2040-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:44:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:31:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	673349	100.000	78765	1600	1.055	--
总计		673349	100.000	78765			


图108 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2041-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:48:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:31:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	660866	100.000	76981	1585	1.054	--
总计		660866	100.000	76981			

图109 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2042-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:52:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:31:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	635096	100.000	74019	1586	1.054	--
总计		635096	100.000	74019			


图110 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2043-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:57:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:31:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	746638	100.000	88587	1673	1.046	--
总计		746638	100.000	88587			


图111 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-64/25-2044-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:01:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:31:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	747022	100.000	88695	1674	1.046	--
总计		747022	100.000	88695			

图112 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2