



替米沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.87	27107	27094	27086	26902	26806	26999	0.51
2	13.94	26713	26751				26732	0.11

单位质量响应值		RSD%	判断
1946.58	1917.65	1.06	数据可信

溶出曲线测定

替米沙坦氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024100621批-ph1.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	22833	-	22833	85.137	85.00	4.60	85.14	85.00	4.60
	2	23701	-	23701	88.373			88.37		
	3	21389	-	21389	79.752			79.75		
	4	23521	-	23521	87.702			87.70		
	5	21640	-	21640	80.688			80.69		
	6	23700	-	23700	88.369			88.37		
10min	1	23448	-	23448	87.430	89.89	3.85	88.28	90.74	3.82
	2	23946	-	23946	89.287			90.17		
	3	22705	-	22705	84.659			85.46		
	4	24688	-	24688	92.053			92.93		
	5	25215	-	25215	94.018			94.83		
	6	24651	-	24651	91.915			92.80		
15min	1	23048	-	23048	85.938	90.14	2.83	87.66	91.89	2.81
	2	24215	-	24215	90.290			92.07		
	3	23778	-	23778	88.660			90.30		
	4	24516	-	24516	91.412			93.21		
	5	24999	-	24999	93.213			94.96		
	6	24494	-	24494	91.330			93.13		
20min	1	23831	-	23831	88.858	88.84	5.23	91.44	91.49	5.07
	2	24859	-	24859	92.691			95.37		
	3	24044	-	24044	89.652			92.18		
	4	24553	-	24553	91.550			94.26		
	5	24281	-	24281	90.536			93.21		
	6	21396	-	21396	79.778			82.49		
30min	1	22671	-	22671	84.533	86.16	3.65	88.01	89.70	3.54
	2	22016	-	22016	82.090			85.70		
	3	22855	-	22855	85.219			88.65		
	4	24032	-	24032	89.607			93.23		
	5	24201	-	24201	90.237			93.82		
	6	22871	-	22871	85.278			88.79		
45min	1	23174	-	23174	86.408	86.63	3.39	90.73	91.03	3.23
	2	24729	-	24729	92.206			96.63		
	3	23167	-	23167	86.382			90.66		
	4	23146	-	23146	86.304			90.83		
	5	22636	-	22636	84.402			88.89		
	6	22542	-	22542	84.052			88.42		
60min	1	22508	-	22508	83.925	86.17	3.98	89.11	91.44	3.85
	2	23301	-	23301	86.882			92.23		
	3	22175	-	22175	82.683			87.83		
	4	23780	-	23780	88.668			94.05		
	5	24517	-	24517	91.416			96.75		
	6	22385	-	22385	83.466			88.67		
极限	1	23312	-	23312	86.923	86.12	2.68	92.94	92.25	2.52
	2	24150	-	24150	90.047			96.27		
	3	22902	-	22902	85.394			91.36		
	4	22352	-	22352	83.343			89.62		
	5	23164	-	23164	86.371			92.62		
	6	22697	-	22697	84.629			90.67		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-16

复核者:

未审阅版本



替米沙坦氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.87	26914	26862	26472	26890	26940	26816	0.73
2	13.94	26488	26				13257	141.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
1933.38		951.00		48.17	数据不可信!(响应值差异过大,请重新称样测定!)			

溶出曲线测定

替米沙坦氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024100621批-pH1.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	24002	-	24002	135.622	129.63	5.66	135.62	129.63	5.66
	2	21352	-	21352	120.649			120.65		
	3	21761	-	21761	122.960			122.96		
	4	24127	-	24127	136.329			136.33		
	5	22249	-	22249	125.717			125.72		
	6	24161	-	24161	136.521			136.52		
10min	1	24955	-	24955	141.007	136.02	3.17	142.36	137.32	3.16
	2	23931	-	23931	135.221			136.43		
	3	24513	-	24513	138.510			139.74		
	4	24226	-	24226	136.888			138.25		
	5	22700	-	22700	128.266			129.52		
	6	24114	-	24114	136.255			137.62		
15min	1	24480	-	24480	138.323	114.63	48.97	141.09	117.29	47.91
	2	24584	-	24584	138.911			141.47		
	3	24099	-	24099	136.171			138.79		
	4	23811	-	23811	134.543			137.28		
	5	21	-	21	0.119			2.66		
	6	24730	-	24730	139.736			142.46		
20min	1	25103	-	25103	141.844	113.74	49.02	145.99	117.54	47.32
	2	23886	-	23886	134.967			138.91		
	3	23729	-	23729	134.080			138.06		
	4	24428	-	24428	138.030			142.11		
	5	23610	-	23610	133.408			135.95		
	6	22	-	22	0.124			4.25		
30min	1	23470	-	23470	132.616	134.53	2.32	138.18	139.47	2.02
	2	23866	-	23866	134.854			140.15		
	3	23536	-	23536	132.989			138.31		
	4	23794	-	23794	134.447			139.91		
	5	24856	-	24856	140.448			144.32		
	6	23334	-	23334	131.848			135.97		
45min	1	24937	-	24937	140.906	135.39	3.09	147.80	141.68	3.31
	2	24460	-	24460	138.210			144.86		
	3	23843	-	23843	134.724			141.37		
	4	23723	-	23723	134.046			140.85		
	5	22759	-	22759	128.599			133.88		
	6	24046	-	24046	135.871			141.32		
60min	1	22967	-	22967	129.774	132.64	2.45	138.08	140.28	2.03
	2	22824	-	22824	128.966			136.99		
	3	23945	-	23945	135.300			143.29		
	4	23235	-	23235	131.289			139.43		
	5	23569	-	23569	133.176			139.74		
	6	24301	-	24301	137.312			144.12		
极限	1	24868	-	24868	140.516	134.81	3.26	150.12	143.78	3.44
	2	24294	-	24294	137.272			146.59		
	3	23917	-	23917	135.142			144.49		
	4	23560	-	23560	133.125			142.58		
	5	22551	-	22551	127.424			135.32		
	6	23958	-	23958	135.374			143.55		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-16

复核者:

未审阅版本



替米沙坦氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.87	26846	26386	26547	26493	26641	26583	0.66
2	13.94	26656	26370				26513	0.77
单位质量响应值			RSD%	判断				
1916.58			0.55	数据可信				

溶出曲线测定

替米沙坦氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024100621批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21529	-	21529	81.232	84.93	2.95	81.23	84.92	2.95
	2	22346	-	22346	84.314			84.31		
	3	22004	-	22004	83.024			83.02		
	4	23224	-	23224	87.627			87.63		
	5	23039	-	23039	86.929			86.93		
	6	22906	-	22906	86.427			86.43		
10min	1	21988	-	21988	82.964	87.99	3.00	83.78	88.83	2.99
	2	23268	-	23268	87.793			88.64		
	3	23544	-	23544	88.835			89.66		
	4	23937	-	23937	90.318			91.19		
	5	23790	-	23790	89.763			90.63		
	6	23386	-	23386	88.239			89.10		
15min	1	23438	-	23438	88.435	85.72	5.04	90.08	87.45	4.95
	2	21281	-	21281	80.296			82.02		
	3	22017	-	22017	83.073			84.79		
	4	23512	-	23512	88.714			90.49		
	5	24182	-	24182	91.242			93.01		
	6	21881	-	21881	82.560			84.31		
20min	1	22322	-	22322	84.224	85.51	2.01	86.75	88.10	2.01
	2	22156	-	22156	83.598			86.12		
	3	22728	-	22728	85.756			88.31		
	4	23473	-	23473	88.567			91.23		
	5	22624	-	22624	85.363			88.04		
	6	22675	-	22675	85.556			88.13		
30min	1	21781	-	21781	82.183	82.89	2.12	85.55	86.33	2.08
	2	22386	-	22386	84.465			87.83		
	3	21348	-	21348	80.549			83.96		
	4	22323	-	22323	84.228			87.78		
	5	22410	-	22410	84.556			88.09		
	6	21559	-	21559	81.345			84.77		
45min	1	21591	-	21591	81.466	85.18	2.61	85.66	89.45	2.55
	2	22374	-	22374	84.420			88.62		
	3	23164	-	23164	87.401			91.61		
	4	23160	-	23160	87.386			91.78		
	5	22719	-	22719	85.722			90.10		
	6	22444	-	22444	84.684			88.93		
60min	1	21718	-	21718	81.945	83.90	4.30	86.95	89.02	4.16
	2	21708	-	21708	81.907			86.96		
	3	21013	-	21013	79.285			84.37		
	4	23293	-	23293	87.888			93.16		
	5	23418	-	23418	88.359			93.60		
	6	22268	-	22268	84.020			89.11		
极限	1	21207	-	21207	80.017	79.46	4.69	85.84	85.42	4.32
	2	20429	-	20429	77.081			82.95		
	3	22310	-	22310	84.179			90.06		
	4	21768	-	21768	82.134			88.28		
	5	19519	-	19519	73.648			79.77		
	6	21120	-	21120	79.689			85.62		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-16

复核者:

未审阅版本



替米沙坦氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.87	26411	26568	26504	26346	26481	26462	0.33
2	13.94	26738	26				13382	141.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
1907.86		959.97		46.75	数据不可信!(响应值差异过大,请重新称样测定!)			

溶出曲线测定

替米沙坦氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024100621批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21623	-	21623	121.954	126.58	3.44	121.95	126.58	3.44
	2	21884	-	21884	123.426			123.43		
	3	21740	-	21740	122.614			122.61		
	4	23171	-	23171	130.685			130.68		
	5	22964	-	22964	129.517			129.52		
	6	23273	-	23273	131.260			131.26		
10min	1	22344	-	22344	126.020	131.92	3.95	127.24	133.19	3.94
	2	22799	-	22799	128.587			129.82		
	3	22986	-	22986	129.641			130.87		
	4	24828	-	24828	140.030			141.34		
	5	23250	-	23250	131.130			132.43		
	6	24138	-	24138	136.139			137.45		
15min	1	23493	-	23493	132.501	131.97	3.31	134.98	134.56	3.27
	2	23015	-	23015	129.805			132.32		
	3	23551	-	23551	132.828			135.35		
	4	24773	-	24773	139.720			142.43		
	5	22499	-	22499	126.895			129.50		
	6	23065	-	23065	130.087			132.76		
20min	1	23321	-	23321	131.531	133.16	2.84	135.34	137.06	2.82
	2	22731	-	22731	128.203			132.02		
	3	23068	-	23068	130.104			133.95		
	4	24294	-	24294	137.018			141.12		
	5	24336	-	24336	137.255			141.13		
	6	23909	-	23909	134.847			138.82		
30min	1	22974	-	22974	129.574	124.34	6.74	134.69	129.58	6.52
	2	21784	-	21784	122.862			127.96		
	3	19349	-	19349	109.129			114.28		
	4	23648	-	23648	133.375			138.85		
	5	22544	-	22544	127.148			132.40		
	6	21978	-	21978	123.956			129.28		
45min	1	22045	-	22045	124.334	126.59	3.95	130.75	133.07	3.88
	2	21193	-	21193	119.529			125.86		
	3	22436	-	22436	126.539			132.78		
	4	23914	-	23914	134.875			141.68		
	5	22437	-	22437	126.545			133.06		
	6	22646	-	22646	127.724			134.29		
60min	1	21740	-	21740	122.614	122.64	1.55	130.27	130.38	1.39
	2	21606	-	21606	121.858			129.38		
	3	21809	-	21809	123.003			130.51		
	4	21173	-	21173	119.416			127.57		
	5	22025	-	22025	124.221			132.01		
	6	22114	-	22114	124.723			132.56		
极限	1	22029	-	22029	124.244	124.93	3.26	133.13	133.90	3.22
	2	21424	-	21424	120.832			129.57		
	3	21517	-	21517	121.356			130.09		
	4	23421	-	23421	132.095			141.45		
	5	22365	-	22365	126.139			135.17		
	6	22150	-	22150	124.926			134.01		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-16

复核者:


未审阅版本

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2180-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:06:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:23:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2181-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:10:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	27107	100.000	4139	847	1.459	--
总计		27107	100.000	4139			


图2 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2182-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:15:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	27094	100.000	4173	869	1.448	--
总计		27094	100.000	4173			


图3 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2183-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:19:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	27086	100.000	4199	875	1.440	--
总计		27086	100.000	4199			

图4 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2184-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:24:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	26902	100.000	4205	892	1.423	--
总计		26902	100.000	4205			

图5 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2185-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:28:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	26806	100.000	4194	886	1.414	--
总计		26806	100.000	4194			


图6 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2186-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:32:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	22833	100.000	3774	943	1.312	--
总计		22833	100.000	3774			


图7 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2187-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 12:37:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	23701	100.000	3916	948	1.325	--
总计		23701	100.000	3916			


图8 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2188-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 12:41:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	21389	100.000	3538	944	1.330	--
总计		21389	100.000	3538			


图9 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2189-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:46:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	23521	100.000	3922	959	1.313	--
总计		23521	100.000	3922			


图10 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2190-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:50:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	21640	100.000	3610	958	1.301	--
总计		21640	100.000	3610			


图11 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2191-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:54:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	23700	100.000	3941	962	1.328	--
总计		23700	100.000	3941			


图12 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2192-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 12:59:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	23448	100.000	3868	951	1.314	--
总计		23448	100.000	3868			

图13 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2193-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:03:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	23946	100.000	4002	962	1.307	--
总计		23946	100.000	4002			


图14 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2194-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:08:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22705	100.000	3759	959	1.327	--
总计		22705	100.000	3759			

图15 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2195-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:12:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	24688	100.000	4103	963	1.315	--
总计		24688	100.000	4103			


图16 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2196-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:16:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	25215	100.000	4207	957	1.309	--
总计		25215	100.000	4207			


图17 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2197-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:21:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	24651	100.000	4132	967	1.311	--
总计		24651	100.000	4132			


图18 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2198-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:25:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	23048	100.000	3860	965	1.304	--
总计		23048	100.000	3860			


图19 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2199-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:29:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	24215	100.000	4096	977	1.310	--
总计		24215	100.000	4096			


图20 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2200-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:34:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	23778	100.000	4011	978	1.319	--
总计		23778	100.000	4011			


图21 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2201-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:38:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:24:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	24516	100.000	4104	962	1.302	--
总计		24516	100.000	4104			


图22 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2202-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:43:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	24999	100.000	4179	972	1.320	--
总计		24999	100.000	4179			


图23 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2203-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:47:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	24494	100.000	4125	978	1.304	--
总计		24494	100.000	4125			


图24 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2204-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 13:51:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	23831	100.000	4064	979	1.310	--
总计		23831	100.000	4064			

图25 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2205-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 13:56:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	24859	100.000	4197	978	1.302	--
总计		24859	100.000	4197			

图26 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2206-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:00:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	24044	100.000	4061	974	1.306	--
总计		24044	100.000	4061			


图27 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2207-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:05:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	24553	100.000	4135	971	1.295	--
总计		24553	100.000	4135			


图28 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2208-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:09:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	24281	100.000	4123	988	1.306	--
总计		24281	100.000	4123			

图29 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2209-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:13:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	21396	100.000	3581	983	1.310	--
总计		21396	100.000	3581			


图30 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2210-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:18:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	22671	100.000	3823	982	1.284	--
总计		22671	100.000	3823			


图31 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2211-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:22:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	22016	100.000	3693	983	1.323	--
总计		22016	100.000	3693			


图32 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2212-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:26:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	22855	100.000	3878	996	1.310	--
总计		22855	100.000	3878			


图33 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2213-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:31:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	24032	100.000	4060	981	1.308	--
总计		24032	100.000	4060			


图34 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2214-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:35:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	24201	100.000	4081	990	1.307	--
总计		24201	100.000	4081			


图35 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2215-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:40:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	22871	100.000	3851	968	1.312	--
总计		22871	100.000	3851			


图36 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2216-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:44:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	23174	100.000	3938	984	1.299	--
总计		23174	100.000	3938			


图37 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2217-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:48:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	24729	100.000	4168	987	1.306	--
总计		24729	100.000	4168			


图38 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2218-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:53:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	23167	100.000	3931	992	1.302	--
总计		23167	100.000	3931			


图39 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2219-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:57:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	23146	100.000	3918	981	1.317	--
总计		23146	100.000	3918			

图40 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2220-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:02:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	22636	100.000	3857	995	1.299	--
总计		22636	100.000	3857			


图41 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2221-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:06:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:25:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	22542	100.000	3797	988	1.310	--
总计		22542	100.000	3797			


图42 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2222-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:10:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	22508	100.000	3829	999	1.297	--
总计		22508	100.000	3829			


图43 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2223-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:15:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	23301	100.000	3963	994	1.283	--
总计		23301	100.000	3963			


图44 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2224-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:19:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	22175	100.000	3817	1002	1.290	--
总计		22175	100.000	3817			


图45 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2225-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:23:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	23780	100.000	4034	983	1.307	--
总计		23780	100.000	4034			


图46 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2226-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:28:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	24517	100.000	4138	996	1.310	--
总计		24517	100.000	4138			


图47 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2227-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:32:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	22385	100.000	3812	987	1.309	--
总计		22385	100.000	3812			


图48 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2228-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:37:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	23312	100.000	3976	983	1.278	--
总计		23312	100.000	3976			


图49 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2229-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:41:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	24150	100.000	4081	989	1.296	--
总计		24150	100.000	4081			


图50 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2230-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:45:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	22902	100.000	3886	991	1.304	--
总计		22902	100.000	3886			


图51 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2231-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:50:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	22352	100.000	3815	984	1.295	--
总计		22352	100.000	3815			


图52 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2232-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:54:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	23164	100.000	3946	990	1.304	--
总计		23164	100.000	3946			


图53 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2233-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:59:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	22697	100.000	3895	1002	1.294	--
总计		22697	100.000	3895			

图54 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2234-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:03:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	26713	100.000	4326	935	1.365	--
总计		26713	100.000	4326			

图55 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2235-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-1-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:07:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	26751	100.000	4362	940	1.357	--
总计		26751	100.000	4362			


图56 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2236-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:12:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2237-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:16:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.205	26914	100.000	4390	949	1.370	--
总计		26914	100.000	4390			


图58 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2238-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:21:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	26862	100.000	4355	943	1.361	--
总计		26862	100.000	4355			


图59 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2239-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:25:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	26472	100.000	4334	943	1.336	--
总计		26472	100.000	4334			


图60 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2240-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:30:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.203	26890	100.000	4378	944	1.354	--
总计		26890	100.000	4378			


图61 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2241-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:34:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	26940	100.000	4371	939	1.359	--
总计		26940	100.000	4371			


图62 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2242-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:38:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	24002	100.000	4070	999	1.315	--
总计		24002	100.000	4070			


图63 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2243-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:43:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:26:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	21352	100.000	3647	999	1.291	--
总计		21352	100.000	3647			

图64 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2244-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:47:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	21761	100.000	3721	997	1.292	--
总计		21761	100.000	3721			


图65 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2245-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:52:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	24127	100.000	4115	996	1.292	--
总计		24127	100.000	4115			


图66 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2246-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:56:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	22249	100.000	3775	991	1.305	--
总计		22249	100.000	3775			


图67 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2247-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:00:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	24161	100.000	4103	993	1.308	--
总计		24161	100.000	4103			


图68 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2248-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:05:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	24955	100.000	4255	994	1.296	--
总计		24955	100.000	4255			


图69 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2249-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:09:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	23931	100.000	4070	989	1.291	--
总计		23931	100.000	4070			


图70 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2250-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:14:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	24513	100.000	4138	981	1.308	--
总计		24513	100.000	4138			


图71 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2251-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:18:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	24226	100.000	4131	1004	1.299	--
总计		24226	100.000	4131			


图72 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2252-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:22:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	22700	100.000	3881	998	1.308	--
总计		22700	100.000	3881			


图73 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2253-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:27:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	24114	100.000	4089	983	1.290	--
总计		24114	100.000	4089			


图74 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2254-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:31:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	24480	100.000	4218	1000	1.287	--
总计		24480	100.000	4218			


图75 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2255-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:36:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	24584	100.000	4209	1010	1.322	--
总计		24584	100.000	4209			


图76 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2256-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:40:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	24099	100.000	4122	993	1.299	--
总计		24099	100.000	4122			


图77 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2257-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:45:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	23811	100.000	4089	995	1.296	--
总计		23811	100.000	4089			


图78 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2258-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:49:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	21781	100.000	3574	994	1.279	--
总计		21781	100.000	3574			


图79 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2259-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:53:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	24730	100.000	4259	1003	1.290	--
总计		24730	100.000	4259			


图80 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2260-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:58:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	25103	100.000	4275	997	1.295	--
总计		25103	100.000	4275			


图81 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2261-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:02:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	23886	100.000	4081	1003	1.307	--
总计		23886	100.000	4081			


图82 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2262-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:07:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	23729	100.000	4025	1001	1.323	--
总计		23729	100.000	4025			


图83 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2263-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:11:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	24428	100.000	4177	1002	1.301	--
总计		24428	100.000	4177			


图84 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2264-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:15:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:27:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	23610	100.000	4048	1003	1.298	--
总计		23610	100.000	4048			


图85 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2265-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:20:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	22248	100.000	3631	988	1.299	--
总计		22248	100.000	3631			


图86 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2266-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:24:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	23470	100.000	4041	991	1.294	--
总计		23470	100.000	4041			


图87 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2267-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:29:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	23866	100.000	4119	991	1.285	--
总计		23866	100.000	4119			


图88 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2268-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:33:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	23536	100.000	4029	1000	1.318	--
总计		23536	100.000	4029			


图89 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2269-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:37:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	23794	100.000	4097	995	1.291	--
总计		23794	100.000	4097			

图90 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2270-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:42:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	24856	100.000	4222	992	1.313	--
总计		24856	100.000	4222			


图91 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2271-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:46:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	23334	100.000	3970	983	1.324	--
总计		23334	100.000	3970			


图92 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2272-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:51:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	24937	100.000	4282	998	1.293	--
总计		24937	100.000	4282			

图93 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2273-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:55:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	24460	100.000	4198	982	1.287	--
总计		24460	100.000	4198			


图94 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2274-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 18:59:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	23843	100.000	4098	1002	1.299	--
总计		23843	100.000	4098			


图95 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2275-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:04:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	23723	100.000	4086	997	1.288	--
总计		23723	100.000	4086			


图96 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2276-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:08:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	22759	100.000	3882	997	1.311	--
总计		22759	100.000	3882			


图97 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2277-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:13:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	24046	100.000	4152	993	1.303	--
总计		24046	100.000	4152			


图98 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2278-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:17:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	22967	100.000	3963	987	1.283	--
总计		22967	100.000	3963			


图99 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2279-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:21:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	22824	100.000	3935	993	1.307	--
总计		22824	100.000	3935			


图100 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2280-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:26:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	23945	100.000	4037	986	1.327	--
总计		23945	100.000	4037			


图101 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2281-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:30:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	23235	100.000	3988	987	1.298	--
总计		23235	100.000	3988			


图102 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2282-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:35:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	23569	100.000	4046	985	1.303	--
总计		23569	100.000	4046			


图103 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2283-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:39:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	24301	100.000	4182	985	1.303	--
总计		24301	100.000	4182			


图104 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2284-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:44:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:28:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	24868	100.000	4286	991	1.290	--
总计		24868	100.000	4286			


图105 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2285-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:48:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	24294	100.000	4155	990	1.312	--
总计		24294	100.000	4155			

图106 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2286-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:52:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	23917	100.000	4090	989	1.308	--
总计		23917	100.000	4090			


图107 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2287-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 19:57:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	23560	100.000	4075	990	1.286	--
总计		23560	100.000	4075			


图108 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2288-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:01:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	22551	100.000	3878	993	1.312	--
总计		22551	100.000	3878			


图109 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2289-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:06:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	23958	100.000	4096	992	1.305	--
总计		23958	100.000	4096			


图110 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2290-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:10:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	26488	100.000	4368	949	1.369	--
总计		26488	100.000	4368			


图111 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2291-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH1.0-2-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:14:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	26583	100.000	4406	946	1.355	--
总计		26583	100.000	4406			


图112 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2292-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:19:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图113 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2293-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:23:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	26846	100.000	4382	940	1.358	--
总计		26846	100.000	4382			


图114 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2294-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:28:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	26386	100.000	4361	950	1.364	--
总计		26386	100.000	4361			


图115 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2295-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:32:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	26547	100.000	4365	942	1.358	--
总计		26547	100.000	4365			


图116 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2296-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:36:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	26493	100.000	4368	949	1.351	--
总计		26493	100.000	4368			


图117 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2297-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:41:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	26641	100.000	4366	946	1.355	--
总计		26641	100.000	4366			


图118 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2298-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:45:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	21529	100.000	3587	971	1.346	--
总计		21529	100.000	3587			

图119 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2299-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:49:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	22346	100.000	3747	972	1.358	--
总计		22346	100.000	3747			

图120 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1


120

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2300-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:54:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	22004	100.000	3688	987	1.354	--
总计		22004	100.000	3688			


图121 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2301-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 20:58:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	23224	100.000	3876	969	1.337	--
总计		23224	100.000	3876			


图122 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2302-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:03:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	23039	100.000	3863	971	1.356	--
总计		23039	100.000	3863			


图123 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2303-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:07:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	22906	100.000	3804	965	1.339	--
总计		22906	100.000	3804			


图124 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2304-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:11:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	21988	100.000	3697	966	1.335	--
总计		21988	100.000	3697			


图125 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2305-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:16:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:29:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	23268	100.000	3911	983	1.348	--
总计		23268	100.000	3911			


图126 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2306-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:20:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	23544	100.000	3923	971	1.336	--
总计		23544	100.000	3923			


图127 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2307-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:25:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	23937	100.000	3990	967	1.331	--
总计		23937	100.000	3990			


图128 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2308-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:29:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	23790	100.000	4013	979	1.316	--
总计		23790	100.000	4013			


图129 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2309-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:33:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	23386	100.000	3905	980	1.367	--
总计		23386	100.000	3905			


图130 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2310-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:38:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	23438	100.000	3898	975	1.338	--
总计		23438	100.000	3898			


图131 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2311-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:42:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21281	100.000	3529	970	1.368	--
总计		21281	100.000	3529			

图132 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2312-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:46:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22017	100.000	3683	983	1.355	--
总计		22017	100.000	3683			


图133 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2313-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 21:51:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	23512	100.000	3957	976	1.334	--
总计		23512	100.000	3957			


图134 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2314-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:55:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	24182	100.000	4012	970	1.355	--
总计		24182	100.000	4012			


图135 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2315-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:00:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	21881	100.000	3677	978	1.346	--
总计		21881	100.000	3677			


图136 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2316-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:04:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	22322	100.000	3739	968	1.345	--
总计		22322	100.000	3739			


图137 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2317-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:08:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	22156	100.000	3703	968	1.347	--
总计		22156	100.000	3703			


图138 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2318-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:13:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	22728	100.000	3809	967	1.326	--
总计		22728	100.000	3809			


图139 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2319-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:17:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	23473	100.000	3948	978	1.344	--
总计		23473	100.000	3948			


图140 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2320-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:21:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	22624	100.000	3802	974	1.341	--
总计		22624	100.000	3802			


图141 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2321-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:26:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	22675	100.000	3736	965	1.369	--
总计		22675	100.000	3736			


图142 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2322-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:30:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	21781	100.000	3627	974	1.342	--
总计		21781	100.000	3627			


图143 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2323-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:34:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	22386	100.000	3661	959	1.352	--
总计		22386	100.000	3661			


图144 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2324-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:39:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	21348	100.000	3576	978	1.331	--
总计		21348	100.000	3576			


图145 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2325-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:43:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	22323	100.000	3701	964	1.343	--
总计		22323	100.000	3701			


图146 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2326-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:48:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:30:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	22410	100.000	3705	959	1.352	--
总计		22410	100.000	3705			


图147 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2327-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:52:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	21559	100.000	3577	961	1.358	--
总计		21559	100.000	3577			


图148 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2328-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 22:56:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21591	100.000	3605	976	1.344	--
总计		21591	100.000	3605			

图149 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2329-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:01:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22374	100.000	3736	970	1.342	--
总计		22374	100.000	3736			


图150 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2330-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:05:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	23164	100.000	3832	957	1.341	--
总计		23164	100.000	3832			


图151 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2331-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:09:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	23160	100.000	3852	969	1.345	--
总计		23160	100.000	3852			


图152 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2332-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:14:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	22719	100.000	3787	963	1.344	--
总计		22719	100.000	3787			


图153 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2333-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:18:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22444	100.000	3748	976	1.365	--
总计		22444	100.000	3748			


图154 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2334-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:23:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	21718	100.000	3632	970	1.348	--
总计		21718	100.000	3632			


图155 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2335-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:27:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21708	100.000	3656	980	1.330	--
总计		21708	100.000	3656			


图156 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2336-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:31:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21013	100.000	3538	977	1.333	--
总计		21013	100.000	3538			

图157 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2337-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:36:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	23293	100.000	3898	961	1.364	--
总计		23293	100.000	3898			


图158 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2338-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:40:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	23418	100.000	3867	964	1.357	--
总计		23418	100.000	3867			


图159 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2339-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:44:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22268	100.000	3692	969	1.355	--
总计		22268	100.000	3692			

图160 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2340-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:49:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	21207	100.000	3574	982	1.346	--
总计		21207	100.000	3574			


图161 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2341-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:53:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	20429	100.000	3412	975	1.368	--
总计		20429	100.000	3412			


图162 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2342-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 23:57:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22310	100.000	3698	974	1.339	--
总计		22310	100.000	3698			


图163 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2343-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:02:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	21768	100.000	3695	980	1.320	--
总计		21768	100.000	3695			

图164 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2344-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:06:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	19519	100.000	3286	971	1.333	--
总计		19519	100.000	3286			


图165 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2345-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:11:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	21120	100.000	3505	952	1.355	--
总计		21120	100.000	3505			

图166 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2346-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:15:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	26656	100.000	4387	952	1.355	--
总计		26656	100.000	4387			


图167 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2347-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-1-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:19:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	26370	100.000	4370	958	1.358	--
总计		26370	100.000	4370			


图168 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2348-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:24:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:31:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图169 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2349-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:28:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	26411	100.000	4363	961	1.351	--
总计		26411	100.000	4363			


图170 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2350-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:33:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	26568	100.000	4350	948	1.352	--
总计		26568	100.000	4350			


图171 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2351-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:37:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	26504	100.000	4374	950	1.336	--
总计		26504	100.000	4374			


图172 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2352-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:41:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	26346	100.000	4345	951	1.341	--
总计		26346	100.000	4345			


图173 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2353-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:46:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	26481	100.000	4365	949	1.343	--
总计		26481	100.000	4365			


图174 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2354-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 00:50:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21623	100.000	3595	966	1.361	--
总计		21623	100.000	3595			

图175 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2355-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:55:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	21884	100.000	3670	982	1.325	--
总计		21884	100.000	3670			

图176 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2356-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:59:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	21740	100.000	3643	963	1.338	--
总计		21740	100.000	3643			


图177 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2357-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:03:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	23171	100.000	3848	973	1.372	--
总计		23171	100.000	3848			


图178 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2358-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:08:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	22964	100.000	3827	971	1.343	--
总计		22964	100.000	3827			


图179 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2359-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:12:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	23273	100.000	3877	969	1.350	--
总计		23273	100.000	3877			


图180 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2360-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:17:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22344	100.000	3738	962	1.343	--
总计		22344	100.000	3738			


图181 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2361-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:21:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	22799	100.000	3787	973	1.349	--
总计		22799	100.000	3787			

图182 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2362-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 01:25:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22986	100.000	3853	974	1.343	--
总计		22986	100.000	3853			


图183 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2363-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:30:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	24828	100.000	4144	975	1.357	--
总计		24828	100.000	4144			

图184 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2364-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 01:34:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	23250	100.000	3876	982	1.333	--
总计		23250	100.000	3876			


图185 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2365-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:39:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	24138	100.000	4003	971	1.348	--
总计		24138	100.000	4003			


图186 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2366-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:43:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	23493	100.000	3931	969	1.326	--
总计		23493	100.000	3931			


图187 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2367-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 01:47:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	23015	100.000	3861	976	1.324	--
总计		23015	100.000	3861			


图188 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2368-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 01:52:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	23551	100.000	3918	966	1.365	--
总计		23551	100.000	3918			


图189 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2369-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 01:56:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:32:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	24773	100.000	4167	979	1.343	--
总计		24773	100.000	4167			


图190 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2370-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 02:01:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22499	100.000	3745	972	1.367	--
总计		22499	100.000	3745			


图191 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2371-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:05:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	23065	100.000	3887	972	1.331	--
总计		23065	100.000	3887			


图192 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2372-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:09:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	23321	100.000	3866	969	1.351	--
总计		23321	100.000	3866			


图193 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2373-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:14:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	22731	100.000	3817	984	1.335	--
总计		22731	100.000	3817			


图194 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2374-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 02:18:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	23068	100.000	3807	977	1.390	--
总计		23068	100.000	3807			


图195 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2375-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:22:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	24294	100.000	4056	963	1.348	--
总计		24294	100.000	4056			


图196 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2376-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:27:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	24336	100.000	4054	973	1.348	--
总计		24336	100.000	4054			


图197 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2377-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:31:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	23909	100.000	3969	969	1.346	--
总计		23909	100.000	3969			


图198 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2378-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 02:36:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22974	100.000	3834	969	1.339	--
总计		22974	100.000	3834			


图199 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2379-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:40:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21784	100.000	3628	970	1.343	--
总计		21784	100.000	3628			


图200 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2380-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:44:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	19349	100.000	3224	971	1.318	--
总计		19349	100.000	3224			


图201 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2381-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 02:49:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	23648	100.000	3951	979	1.342	--
总计		23648	100.000	3951			


图202 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2382-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 02:53:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	22544	100.000	3746	975	1.361	--
总计		22544	100.000	3746			


图203 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2383-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 02:58:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21978	100.000	3632	965	1.344	--
总计		21978	100.000	3632			

图204 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2384-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 03:02:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	22045	100.000	3651	959	1.354	--
总计		22045	100.000	3651			

图205 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1


205

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2385-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 03:06:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	21193	100.000	3527	963	1.326	--
总计		21193	100.000	3527			

图206 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2386-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 03:11:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	22436	100.000	3715	965	1.361	--
总计		22436	100.000	3715			


图207 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2387-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 03:15:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	23914	100.000	3990	961	1.325	--
总计		23914	100.000	3990			


图208 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2388-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:20:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	22437	100.000	3732	970	1.331	--
总计		22437	100.000	3732			

图209 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2389-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 03:24:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:33:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	22646	100.000	3728	954	1.350	--
总计		22646	100.000	3728			

图210 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1


210

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2390-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:28:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21740	100.000	3622	969	1.325	--
总计		21740	100.000	3622			


图211 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2391-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:33:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21606	100.000	3579	968	1.343	--
总计		21606	100.000	3579			


图212 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2392-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 03:37:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	21809	100.000	3646	971	1.360	--
总计		21809	100.000	3646			


图213 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2393-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:42:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	21173	100.000	3507	956	1.339	--
总计		21173	100.000	3507			


图214 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2394-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:46:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	22025	100.000	3684	981	1.336	--
总计		22025	100.000	3684			


图215 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2395-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 03:50:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	22114	100.000	3652	964	1.385	--
总计		22114	100.000	3652			


图216 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2396-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:55:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	22029	100.000	3698	984	1.338	--
总计		22029	100.000	3698			


图217 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2397-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 03:59:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	21424	100.000	3526	964	1.364	--
总计		21424	100.000	3526			


图218 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2398-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:04:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	21517	100.000	3578	960	1.355	--
总计		21517	100.000	3578			

图219 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2399-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 04:08:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	23421	100.000	3902	967	1.337	--
总计		23421	100.000	3902			

图220 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1


220

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2400-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:12:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	22365	100.000	3707	958	1.350	--
总计		22365	100.000	3707			


图221 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2401-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:17:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	22150	100.000	3710	966	1.338	--
总计		22150	100.000	3710			


图222 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2402-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:21:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	26738	100.000	4358	946	1.348	--
总计		26738	100.000	4358			


图223 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:237nm
数据文件名: RC\$999 - 0-67/24-2403-2 - zzp-2024100621p-rcqx-pH4.5-2-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250114-aldp-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 04:26:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:34:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	26556	100.000	4329	957	1.346	--
总计		26556	100.000	4329			

图224 替米沙坦氨氯地平片氨氯地平溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2