



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-305-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:32:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:12:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-306-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:35:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:12:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	99227	100.000	16066	2674	1.104	--
总计		99227	100.000	16066			

图2 玛巴洛沙韦干湿混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-307-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:39:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	99058	100.000	16046	2679	1.104	--
总计		99058	100.000	16046			

图3 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-308-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:42:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	99160	100.000	16025	2674	1.104	--
总计		99160	100.000	16025			

图4 玛巴洛沙韦干湿悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-309-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:46:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	99088	100.000	16031	2681	1.104	--
总计		99088	100.000	16031			

图5 玛巴洛沙韦干湿混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-310-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:49:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	98938	100.000	15999	2681	1.104	--
总计		98938	100.000	15999			

图6 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-311-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:52:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	79324	100.000	13187	2830	1.101	--
总计		79324	100.000	13187			

图7 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-312-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:56:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	66399	100.000	11025	2829	1.101	--
总计		66399	100.000	11025			

图8 玛巴洛沙韦干湿悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-313-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:59:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	87928	100.000	14650	2841	1.101	--
总计		87928	100.000	14650			

图9 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-314-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:02:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	86322	100.000	14394	2844	1.101	--
总计		86322	100.000	14394			

图10 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-315-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:06:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	89878	100.000	14992	2847	1.101	--
总计		89878	100.000	14992			

图11 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-316-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:09:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	67352	100.000	11241	2844	1.100	--
总计		67352	100.000	11241			

图12 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-317-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:13:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	86283	100.000	14382	2836	1.101	--
总计		86283	100.000	14382			

图13 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-318-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:16:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	74144	100.000	12366	2844	1.102	--
总计		74144	100.000	12366			

图14 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-319-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:19:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	90868	100.000	15174	2850	1.101	--
总计		90868	100.000	15174			

图15 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-320-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:23:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	90522	100.000	15102	2845	1.101	--
总计		90522	100.000	15102			

图16 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-321-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:26:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	93387	100.000	15565	2840	1.103	--
总计		93387	100.000	15565			

图17 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-322-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:29:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	75274	100.000	12542	2843	1.102	--
总计		75274	100.000	12542			

图18 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-323-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:33:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	90257	100.000	15015	2838	1.101	--
总计		90257	100.000	15015			

图19 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-324-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:36:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	77187	100.000	12840	2843	1.103	--
总计		77187	100.000	12840			

图20 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-325-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:40:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	94226	100.000	15673	2842	1.102	--
总计		94226	100.000	15673			

图21 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-326-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:43:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:13:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	92167	100.000	15351	2838	1.100	--
总计		92167	100.000	15351			

图22 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-327-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:46:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	94705	100.000	15814	2848	1.102	--
总计		94705	100.000	15814			

图23 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-328-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:50:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	78883	100.000	13129	2842	1.103	--
总计		78883	100.000	13129			

图24 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-329-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:53:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	87880	100.000	14621	2838	1.103	--
总计		87880	100.000	14621			

图25 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-330-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:57:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	80219	100.000	13356	2845	1.101	--
总计		80219	100.000	13356			

图26 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-331-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:00:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	92548	100.000	15423	2840	1.102	--
总计		92548	100.000	15423			

图27 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-332-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:03:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	93736	100.000	15623	2847	1.101	--
总计		93736	100.000	15623			

图28 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-333-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:07:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	92781	100.000	15456	2845	1.102	--
总计		92781	100.000	15456			

图29 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-334-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:10:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	79375	100.000	13226	2843	1.102	--
总计		79375	100.000	13226			

图30 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-335-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:13:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	86256	100.000	14355	2838	1.103	--
总计		86256	100.000	14355			

图31 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-336-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:17:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	82067	100.000	13666	2836	1.103	--
总计		82067	100.000	13666			

图32 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-337-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:20:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92843	100.000	15428	2840	1.103	--
总计		92843	100.000	15428			

图33 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-338-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:24:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92291	100.000	15353	2848	1.102	--
总计		92291	100.000	15353			

图34 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-339-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:27:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	93544	100.000	15561	2843	1.103	--
总计		93544	100.000	15561			

图35 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-340-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:30:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	84540	100.000	14093	2845	1.102	--
总计		84540	100.000	14093			

图36 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-341-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:34:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	88319	100.000	14677	2839	1.102	--
总计		88319	100.000	14677			

图37 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-342-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:37:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	81596	100.000	13572	2829	1.103	--
总计		81596	100.000	13572			

图38 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-343-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:41:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92074	100.000	15298	2842	1.103	--
总计		92074	100.000	15298			

图39 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-344-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:44:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92237	100.000	15329	2839	1.103	--
总计		92237	100.000	15329			

图40 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-345-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:47:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92882	100.000	15436	2842	1.103	--
总计		92882	100.000	15436			

图41 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-346-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:51:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:14:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	84607	100.000	14065	2844	1.103	--
总计		84607	100.000	14065			

图42 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-347-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:54:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	86932	100.000	14458	2844	1.104	--
总计		86932	100.000	14458			

图43 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-348-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:57:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	82686	100.000	13722	2837	1.103	--
总计		82686	100.000	13722			

图44 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-349-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:01:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92744	100.000	15414	2840	1.103	--
总计		92744	100.000	15414			

图45 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-350-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:04:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	92004	100.000	15294	2838	1.103	--
总计		92004	100.000	15294			

图46 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-351-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:08:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	92164	100.000	15315	2838	1.103	--
总计		92164	100.000	15315			

图47 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-352-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:11:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	83528	100.000	13862	2836	1.103	--
总计		83528	100.000	13862			

图48 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-353-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:14:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	91819	100.000	15257	2844	1.103	--
总计		91819	100.000	15257			

图49 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-354-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:18:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	92970	100.000	15456	2836	1.102	--
总计		92970	100.000	15456			

图50 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-355-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:21:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	96459	100.000	16042	2841	1.103	--
总计		96459	100.000	16042			

图51 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-356-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:25:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	95394	100.000	15843	2840	1.104	--
总计		95394	100.000	15843			

图52 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-357-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:28:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	95798	100.000	15927	2843	1.102	--
总计		95798	100.000	15927			

图53 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-358-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:31:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	93841	100.000	15603	2839	1.102	--
总计		93841	100.000	15603			

图54 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-359-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:35:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	98809	100.000	16068	2679	1.104	--
总计		98809	100.000	16068			

图55 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-360-2 - zzp-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:38:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	98934	100.000	16083	2673	1.104	--
总计		98934	100.000	16083			

图56 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-361-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:42:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-362-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:45:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	99008	100.000	16099	2678	1.104	--
总计		99008	100.000	16099			

图58 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-363-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:48:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	98679	100.000	16055	2682	1.106	--
总计		98679	100.000	16055			

图59 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-364-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:52:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	98927	100.000	16095	2683	1.104	--
总计		98927	100.000	16095			

图60 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-365-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:55:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	98852	100.000	16084	2684	1.105	--
总计		98852	100.000	16084			

图61 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-366-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:59:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	98778	100.000	16062	2679	1.105	--
总计		98778	100.000	16062			

图62 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-367-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:02:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:15:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	71486	100.000	11906	2842	1.102	--
总计		71486	100.000	11906			

图63 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-368-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:05:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	88249	100.000	14719	2851	1.102	--
总计		88249	100.000	14719			

图64 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-369-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:09:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	81378	100.000	13566	2848	1.102	--
总计		81378	100.000	13566			

图65 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-370-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:12:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	84350	100.000	14101	2860	1.102	--
总计		84350	100.000	14101			

图66 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-371-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:16:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	69299	100.000	11550	2846	1.104	--
总计		69299	100.000	11550			

图67 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-372-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:19:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	89341	100.000	14867	2843	1.103	--
总计		89341	100.000	14867			

图68 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-373-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:22:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	82365	100.000	13723	2861	1.105	--
总计		82365	100.000	13723			

图69 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-374-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:26:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	93065	100.000	15554	2867	1.104	--
总计		93065	100.000	15554			

图70 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-375-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:29:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	88479	100.000	14733	2854	1.104	--
总计		88479	100.000	14733			

图71 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-376-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:33:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	90100	100.000	15027	2853	1.105	--
总计		90100	100.000	15027			

图72 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-377-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:36:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	78206	100.000	13089	2875	1.104	--
总计		78206	100.000	13089			

图73 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-378-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:39:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	95227	100.000	15933	2869	1.104	--
总计		95227	100.000	15933			

图74 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-379-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:43:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	84717	100.000	14137	2851	1.103	--
总计		84717	100.000	14137			

图75 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-380-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:46:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	93324	100.000	15574	2863	1.103	--
总计		93324	100.000	15574			

图76 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-381-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:50:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	93761	100.000	15604	2852	1.106	--
总计		93761	100.000	15604			

图77 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-382-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:53:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	90933	100.000	15177	2864	1.104	--
总计		90933	100.000	15177			

图78 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-383-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:56:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	82054	100.000	13679	2861	1.104	--
总计		82054	100.000	13679			

图79 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-384-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:00:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	96157	100.000	16024	2856	1.104	--
总计		96157	100.000	16024			

图80 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-385-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:03:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	87045	100.000	14497	2856	1.105	--
总计		87045	100.000	14497			

图81 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-386-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:07:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92076	100.000	15347	2861	1.104	--
总计		92076	100.000	15347			

图82 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-387-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:10:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:16:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	89332	100.000	14894	2860	1.104	--
总计		89332	100.000	14894			

图83 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-388-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:13:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	90552	100.000	15116	2866	1.105	--
总计		90552	100.000	15116			

图84 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-389-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:17:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	83860	100.000	13985	2861	1.105	--
总计		83860	100.000	13985			

图85 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-390-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:20:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	95685	100.000	15942	2858	1.105	--
总计		95685	100.000	15942			

图86 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-391-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:24:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	87373	100.000	14574	2846	1.105	--
总计		87373	100.000	14574			

图87 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-392-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:27:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	92483	100.000	15432	2867	1.104	--
总计		92483	100.000	15432			

图88 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-393-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:30:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	90933	100.000	15149	2854	1.105	--
总计		90933	100.000	15149			

图89 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-394-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:34:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	91150	100.000	15220	2864	1.104	--
总计		91150	100.000	15220			

图90 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-395-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:37:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	85558	100.000	14294	2874	1.104	--
总计		85558	100.000	14294			

图91 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-396-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:41:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	94636	100.000	15817	2878	1.104	--
总计		94636	100.000	15817			

图92 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-397-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:44:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	85717	100.000	14278	2850	1.104	--
总计		85717	100.000	14278			

图93 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-398-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:47:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	91947	100.000	15320	2849	1.104	--
总计		91947	100.000	15320			

图94 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-399-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:51:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	88774	100.000	14803	2853	1.105	--
总计		88774	100.000	14803			

图95 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-400-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:54:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	90732	100.000	15127	2855	1.105	--
总计		90732	100.000	15127			

图96 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-401-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:58:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	84975	100.000	14202	2863	1.104	--
总计		84975	100.000	14202			

图97 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-402-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:01:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	94511	100.000	15759	2855	1.106	--
总计		94511	100.000	15759			

图98 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-403-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:04:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	86414	100.000	14400	2857	1.104	--
总计		86414	100.000	14400			

图99 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-404-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:08:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	91603	100.000	15284	2851	1.104	--
总计		91603	100.000	15284			

图100 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-405-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:11:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	87257	100.000	14538	2856	1.106	--
总计		87257	100.000	14538			

图101 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-406-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:15:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	90075	100.000	15011	2851	1.106	--
总计		90075	100.000	15011			

图102 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-407-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:18:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	84238	100.000	14045	2850	1.106	--
总计		84238	100.000	14045			

图103 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-408-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:22:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:17:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	93840	100.000	15631	2861	1.105	--
总计		93840	100.000	15631			

图104 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-409-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:25:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	95066	100.000	15837	2856	1.106	--
总计		95066	100.000	15837			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-410-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:28:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	94935	100.000	15890	2876	1.104	--
总计		94935	100.000	15890			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-411-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:32:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	94722	100.000	15796	2862	1.105	--
总计		94722	100.000	15796			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-412-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:35:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	96941	100.000	16126	2848	1.107	--
总计		96941	100.000	16126			

图108 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-413-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:39:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	97776	100.000	16299	2860	1.105	--
总计		97776	100.000	16299			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-414-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:42:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	96632	100.000	16134	2868	1.105	--
总计		96632	100.000	16134			

图110 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-415-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:45:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	99078	100.000	16133	2688	1.107	--
总计		99078	100.000	16133			

图111 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-416-2 - zzp-25010802-1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:49:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	98967	100.000	16146	2696	1.108	--
总计		98967	100.000	16146			

图112 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-417-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:52:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-418-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:56:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	99386	100.000	16199	2694	1.108	--
总计		99386	100.000	16199			

图114 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-419-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:59:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	99432	100.000	16189	2695	1.107	--
总计		99432	100.000	16189			

图115 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-420-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:02:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	99398	100.000	16175	2691	1.108	--
总计		99398	100.000	16175			

图116 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-421-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:06:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	99275	100.000	16162	2696	1.107	--
总计		99275	100.000	16162			

图117 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-422-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:09:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	99213	100.000	16131	2691	1.107	--
总计		99213	100.000	16131			

图118 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-423-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:12:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	86381	100.000	14447	2861	1.105	--
总计		86381	100.000	14447			

图119 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-424-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:16:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	83899	100.000	14035	2866	1.105	--
总计		83899	100.000	14035			

图120 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-425-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:19:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	81259	100.000	13565	2857	1.105	--
总计		81259	100.000	13565			

图121 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-426-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:23:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	80696	100.000	13480	2860	1.105	--
总计		80696	100.000	13480			

图122 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-427-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:26:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	69261	100.000	11604	2873	1.105	--
总计		69261	100.000	11604			

图123 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-428-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:29:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:18:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	87589	100.000	14661	2871	1.105	--
总计		87589	100.000	14661			

图124 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-429-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:33:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	91041	100.000	15204	2858	1.105	--
总计		91041	100.000	15204			

图125 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-430-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:36:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	87940	100.000	14697	2863	1.106	--
总计		87940	100.000	14697			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-431-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:39:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	86001	100.000	14367	2864	1.106	--
总计		86001	100.000	14367			

图127 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-432-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:43:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	90401	100.000	15122	2865	1.106	--
总计		90401	100.000	15122			

图128 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-433-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:46:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	76890	100.000	12854	2859	1.105	--
总计		76890	100.000	12854			

图129 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-434-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:50:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92732	100.000	15438	2855	1.106	--
总计		92732	100.000	15438			

图130 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-435-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:53:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	90088	100.000	15004	2856	1.106	--
总计		90088	100.000	15004			

图131 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-436-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:56:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	88953	100.000	14815	2858	1.106	--
总计		88953	100.000	14815			

图132 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-437-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:00:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	87446	100.000	14572	2857	1.105	--
总计		87446	100.000	14572			

图133 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-438-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:03:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	88181	100.000	14682	2854	1.107	--
总计		88181	100.000	14682			

图134 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-439-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:06:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	79760	100.000	13303	2857	1.106	--
总计		79760	100.000	13303			

图135 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-440-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:10:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	92381	100.000	15370	2850	1.108	--
总计		92381	100.000	15370			

图136 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-441-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:13:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	91383	100.000	15227	2859	1.106	--
总计		91383	100.000	15227			

图137 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-442-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:17:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	87705	100.000	14644	2863	1.106	--
总计		87705	100.000	14644			

图138 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-443-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:20:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	87406	100.000	14591	2860	1.106	--
总计		87406	100.000	14591			

图139 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-444-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:23:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	87126	100.000	14528	2859	1.107	--
总计		87126	100.000	14528			

图140 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-445-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:27:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	80048	100.000	13386	2861	1.106	--
总计		80048	100.000	13386			

图141 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-446-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:30:33

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	88257	100.000	14730	2857	1.105	--
总计		88257	100.000	14730			

图142 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-447-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:33:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	90669	100.000	15136	2860	1.106	--
总计		90669	100.000	15136			

图143 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-448-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:37:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	89747	100.000	14950	2859	1.105	--
总计		89747	100.000	14950			

图144 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-449-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:40:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:19:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	87315	100.000	14606	2862	1.106	--
总计		87315	100.000	14606			

图145 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-450-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:44:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	87756	100.000	14710	2877	1.105	--
总计		87756	100.000	14710			

图146 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-451-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:47:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	81281	100.000	13574	2855	1.106	--
总计		81281	100.000	13574			

图147 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-452-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:50:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	93051	100.000	15568	2868	1.106	--
总计		93051	100.000	15568			

图148 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-453-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:54:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	89908	100.000	14985	2856	1.107	--
总计		89908	100.000	14985			

图149 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-454-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:57:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	88333	100.000	14760	2863	1.106	--
总计		88333	100.000	14760			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-455-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:00:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	87698	100.000	14614	2856	1.106	--
总计		87698	100.000	14614			

图151 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-456-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:04:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	87497	100.000	14629	2863	1.107	--
总计		87497	100.000	14629			

图152 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-457-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:07:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	83145	100.000	13901	2867	1.106	--
总计		83145	100.000	13901			

图153 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-458-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:10:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	90991	100.000	15238	2868	1.106	--
总计		90991	100.000	15238			

图154 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-459-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:14:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	89696	100.000	14958	2858	1.107	--
总计		89696	100.000	14958			

图155 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-460-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:17:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	88623	100.000	14823	2865	1.107	--
总计		88623	100.000	14823			

图156 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-461-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:21:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	87466	100.000	14606	2866	1.105	--
总计		87466	100.000	14606			

图157 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-462-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:24:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	87342	100.000	14615	2865	1.105	--
总计		87342	100.000	14615			

图158 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-463-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:27:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	82316	100.000	13779	2870	1.106	--
总计		82316	100.000	13779			

图159 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-464-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:31:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	89480	100.000	14966	2869	1.106	--
总计		89480	100.000	14966			

图160 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-465-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:34:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	91851	100.000	15333	2859	1.107	--
总计		91851	100.000	15333			

图161 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-466-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:37:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	93190	100.000	15581	2866	1.107	--
总计		93190	100.000	15581			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-467-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:41:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	94274	100.000	15730	2860	1.107	--
总计		94274	100.000	15730			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-468-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:44:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:20:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	93770	100.000	15657	2857	1.106	--
总计		93770	100.000	15657			

图164 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-469-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:48:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:21:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	94542	100.000	15780	2858	1.107	--
总计		94542	100.000	15780			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-470-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:51:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:21:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	95318	100.000	15935	2865	1.107	--
总计		95318	100.000	15935			

图166 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-471-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:54:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:21:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	98839	100.000	16087	2696	1.108	--
总计		98839	100.000	16087			

图167 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-5/27-472-2 - zzp-25010802-3p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:58:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 11:21:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	99368	100.000	16172	2690	1.109	--
总计		99368	100.000	16172			

图168 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-3批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2