



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-203-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:32:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-204-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:35:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	99962	100.000	17134	2763	1.129	--
总计		99962	100.000	17134			

图2 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-205-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:39:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	99940	100.000	17136	2756	1.131	--
总计		99940	100.000	17136			

图3 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-206-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:42:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	99988	100.000	17132	2766	1.131	--
总计		99988	100.000	17132			

图4 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-207-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:46:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	100400	100.000	17141	2751	1.132	--
总计		100400	100.000	17141			

图5 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-208-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:49:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	100199	100.000	17193	2769	1.130	--
总计		100199	100.000	17193			

图6 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-209-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:52:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	51528	100.000	9035	2934	1.133	--
总计		51528	100.000	9035			

图7 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-210-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:56:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	59109	100.000	10390	2955	1.133	--
总计		59109	100.000	10390			

图8 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-211-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 14:59:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	58851	100.000	10333	2974	1.137	--
总计		58851	100.000	10333			

图9 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-212-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:03:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	56853	100.000	10014	2944	1.132	--
总计		56853	100.000	10014			

图10 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-213-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:06:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	55177	100.000	9738	2947	1.130	--
总计		55177	100.000	9738			

图11 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-214-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:09:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	57918	100.000	10237	2950	1.131	--
总计		57918	100.000	10237			

图12 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-215-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:13:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	61209	100.000	10780	2940	1.132	--
总计		61209	100.000	10780			

图13 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-216-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:16:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	65529	100.000	11601	2959	1.130	--
总计		65529	100.000	11601			

图14 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-217-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:19:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	66971	100.000	11816	2952	1.131	--
总计		66971	100.000	11816			

图15 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-218-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:23:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	66055	100.000	11691	2949	1.130	--
总计		66055	100.000	11691			

图16 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-219-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:26:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	62668	100.000	11075	2942	1.130	--
总计		62668	100.000	11075			

图17 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-220-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:30:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:22:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	65736	100.000	11576	2951	1.131	--
总计		65736	100.000	11576			

图18 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-221-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:33:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	66310	100.000	11698	2958	1.132	--
总计		66310	100.000	11698			

图19 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-222-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:36:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	69657	100.000	12318	2944	1.133	--
总计		69657	100.000	12318			

图20 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-223-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:40:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	71365	100.000	12550	2941	1.134	--
总计		71365	100.000	12550			

图21 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-224-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:43:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	71744	100.000	12637	2950	1.131	--
总计		71744	100.000	12637			

图22 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-225-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:46:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	66666	100.000	11744	2960	1.133	--
总计		66666	100.000	11744			

图23 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-226-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:50:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	71398	100.000	12606	2951	1.130	--
总计		71398	100.000	12606			

图24 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-227-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:53:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	68884	100.000	12106	2953	1.134	--
总计		68884	100.000	12106			

图25 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-228-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 15:57:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	72359	100.000	12767	2946	1.133	--
总计		72359	100.000	12767			

图26 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-229-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:00:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	72277	100.000	12748	2939	1.133	--
总计		72277	100.000	12748			

图27 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-230-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:03:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	74114	100.000	12997	2953	1.132	--
总计		74114	100.000	12997			

图28 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-231-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:07:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	71139	100.000	12538	2953	1.131	--
总计		71139	100.000	12538			

图29 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-232-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:10:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	73574	100.000	12915	2948	1.130	--
总计		73574	100.000	12915			

图30 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-233-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:13:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	73660	100.000	13016	2945	1.127	--
总计		73660	100.000	13016			

图31 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-234-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:17:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	76377	100.000	13486	2953	1.134	--
总计		76377	100.000	13486			

图32 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-235-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:20:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	76225	100.000	13436	2937	1.131	--
总计		76225	100.000	13436			

图33 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-236-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:24:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	81414	100.000	14397	2956	1.132	--
总计		81414	100.000	14397			

图34 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-237-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:27:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	75078	100.000	13239	2941	1.130	--
总计		75078	100.000	13239			

图35 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-238-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:30:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	79365	100.000	13976	2956	1.134	--
总计		79365	100.000	13976			

图36 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-239-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:34:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	80164	100.000	14074	2951	1.133	--
总计		80164	100.000	14074			

图37 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-240-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:37:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:23:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	79910	100.000	14074	2947	1.132	--
总计		79910	100.000	14074			

图38 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-241-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:41:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	82095	100.000	14438	2946	1.134	--
总计		82095	100.000	14438			

图39 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-242-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:44:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	87028	100.000	15356	2961	1.133	--
总计		87028	100.000	15356			

图40 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-243-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:47:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	79961	100.000	14084	2950	1.132	--
总计		79961	100.000	14084			

图41 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-244-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:51:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	81725	100.000	14362	2955	1.133	--
总计		81725	100.000	14362			

图42 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-245-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:54:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	81379	100.000	14325	2944	1.134	--
总计		81379	100.000	14325			

图43 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-246-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 16:57:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	81105	100.000	14207	2952	1.133	--
总计		81105	100.000	14207			

图44 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-247-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:01:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	83001	100.000	14560	2959	1.136	--
总计		83001	100.000	14560			

图45 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-248-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:04:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	89785	100.000	15805	2949	1.132	--
总计		89785	100.000	15805			

图46 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-249-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:07:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	80050	100.000	14127	2950	1.131	--
总计		80050	100.000	14127			

图47 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-250-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:11:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	84444	100.000	14877	2953	1.131	--
总计		84444	100.000	14877			

图48 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-251-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:14:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	93390	100.000	16473	2958	1.133	--
总计		93390	100.000	16473			

图49 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-252-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:18:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	91704	100.000	16175	2956	1.134	--
总计		91704	100.000	16175			

图50 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-253-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:21:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	93527	100.000	16447	2953	1.133	--
总计		93527	100.000	16447			

图51 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-254-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:24:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	103103	100.000	18171	2961	1.135	--
总计		103103	100.000	18171			

图52 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-255-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:28:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	93024	100.000	16420	2966	1.133	--
总计		93024	100.000	16420			

图53 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-256-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:31:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	96847	100.000	16978	2950	1.134	--
总计		96847	100.000	16978			

图54 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-257-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:35:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	100439	100.000	17185	2773	1.133	--
总计		100439	100.000	17185			

图55 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-258-2 - zzp-25010801p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:38:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	100138	100.000	17191	2781	1.130	--
总计		100138	100.000	17191			

图56 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010801批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-259-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:41:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-260-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:45:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:24:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	100244	100.000	17177	2768	1.133	--
总计		100244	100.000	17177			

图58 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-261-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:48:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	99892	100.000	17126	2775	1.133	--
总计		99892	100.000	17126			

图59 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-262-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:52:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	100533	100.000	17138	2760	1.134	--
总计		100533	100.000	17138			

图60 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-263-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:55:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	100298	100.000	17149	2759	1.129	--
总计		100298	100.000	17149			

图61 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-264-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 17:58:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	100216	100.000	17191	2768	1.130	--
总计		100216	100.000	17191			

图62 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-265-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:02:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	78337	100.000	13782	2967	1.138	--
总计		78337	100.000	13782			

图63 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-266-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:05:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	86892	100.000	15259	2955	1.131	--
总计		86892	100.000	15259			

图64 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-267-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:09:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	76272	100.000	13428	2974	1.135	--
总计		76272	100.000	13428			

图65 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-268-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:12:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	91371	100.000	16171	2962	1.133	--
总计		91371	100.000	16171			

图66 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-269-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:15:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	93189	100.000	16465	2962	1.131	--
总计		93189	100.000	16465			

图67 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-270-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:19:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	79234	100.000	14038	2963	1.133	--
总计		79234	100.000	14038			

图68 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-271-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:22:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	84437	100.000	14931	2961	1.133	--
总计		84437	100.000	14931			

图69 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-272-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:26:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	90024	100.000	15914	2951	1.133	--
总计		90024	100.000	15914			

图70 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-273-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:29:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	84358	100.000	14910	2961	1.134	--
总计		84358	100.000	14910			

图71 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-274-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:32:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	95907	100.000	16957	2960	1.133	--
总计		95907	100.000	16957			

图72 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-275-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:36:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	96823	100.000	17123	2955	1.133	--
总计		96823	100.000	17123			

图73 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-276-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:39:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	87543	100.000	15488	2952	1.131	--
总计		87543	100.000	15488			

图74 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-277-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:43:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	86117	100.000	15221	2951	1.132	--
总计		86117	100.000	15221			

图75 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-278-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:46:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	91201	100.000	16117	2952	1.137	--
总计		91201	100.000	16117			

图76 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-279-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:49:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:25:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	86760	100.000	15334	2948	1.133	--
总计		86760	100.000	15334			

图77 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-280-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:53:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	96585	100.000	17103	2955	1.132	--
总计		96585	100.000	17103			

图78 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-281-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:56:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	95841	100.000	16967	2948	1.134	--
总计		95841	100.000	16967			

图79 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-282-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 18:59:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	87802	100.000	15542	2955	1.132	--
总计		87802	100.000	15542			

图80 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-283-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:03:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	86737	100.000	15400	2975	1.131	--
总计		86737	100.000	15400			

图81 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-284-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:06:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	90924	100.000	16098	2968	1.134	--
总计		90924	100.000	16098			

图82 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-285-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:10:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	86891	100.000	15368	2964	1.135	--
总计		86891	100.000	15368			

图83 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-286-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:13:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	95669	100.000	16907	2948	1.137	--
总计		95669	100.000	16907			

图84 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-287-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:16:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	95273	100.000	16850	2953	1.136	--
总计		95273	100.000	16850			

图85 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-288-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:20:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	89204	100.000	15805	2979	1.133	--
总计		89204	100.000	15805			

图86 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-289-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:23:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	85666	100.000	15150	2948	1.133	--
总计		85666	100.000	15150			

图87 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-290-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:27:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	91930	100.000	16292	2971	1.136	--
总计		91930	100.000	16292			

图88 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-291-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:30:33

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	88493	100.000	15687	2969	1.133	--
总计		88493	100.000	15687			

图89 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-292-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:33:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	93759	100.000	16633	2969	1.137	--
总计		93759	100.000	16633			

图90 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-293-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:37:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	94794	100.000	16750	2959	1.137	--
总计		94794	100.000	16750			

图91 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-294-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:40:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	89910	100.000	15922	2973	1.134	--
总计		89910	100.000	15922			

图92 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-295-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:44:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	85749	100.000	15168	2959	1.133	--
总计		85749	100.000	15168			

图93 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-296-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:47:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	89780	100.000	15876	2971	1.133	--
总计		89780	100.000	15876			

图94 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-297-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:50:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	86647	100.000	15308	2952	1.134	--
总计		86647	100.000	15308			

图95 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-298-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:54:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:26:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	94401	100.000	16713	2960	1.134	--
总计		94401	100.000	16713			

图96 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-299-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 19:57:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	94542	100.000	16687	2958	1.132	--
总计		94542	100.000	16687			

图97 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-300-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:01:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	89071	100.000	15749	2947	1.131	--
总计		89071	100.000	15749			

图98 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-301-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:04:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	85860	100.000	15278	2998	1.135	--
总计		85860	100.000	15278			

图99 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-302-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:07:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	90027	100.000	15883	2953	1.137	--
总计		90027	100.000	15883			

图100 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-303-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:11:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	88454	100.000	15597	2952	1.136	--
总计		88454	100.000	15597			

图101 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-304-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:14:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	92218	100.000	16341	2961	1.132	--
总计		92218	100.000	16341			

图102 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-305-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:18:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	92418	100.000	16330	2957	1.135	--
总计		92418	100.000	16330			

图103 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-306-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:21:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	88394	100.000	15673	2965	1.132	--
总计		88394	100.000	15673			

图104 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-307-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:25:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	90479	100.000	16024	2968	1.133	--
总计		90479	100.000	16024			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-308-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:28:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	91416	100.000	16141	2947	1.137	--
总计		91416	100.000	16141			

图106 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-309-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:31:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	96112	100.000	16996	2951	1.134	--
总计		96112	100.000	16996			

图107 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-310-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:35:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	93252	100.000	16544	2971	1.134	--
总计		93252	100.000	16544			

图108 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-311-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:38:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	92366	100.000	16352	2961	1.134	--
总计		92366	100.000	16352			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-312-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:42:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	92847	100.000	16561	3008	1.133	--
总计		92847	100.000	16561			

图110 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-313-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:45:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	99893	100.000	17119	2779	1.134	--
总计		99893	100.000	17119			

图111 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-314-2 - zzp-25010802-2p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:48:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	100092	100.000	17129	2764	1.135	--
总计		100092	100.000	17129			

图112 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-2批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-315-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:52:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-316-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:55:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	100459	100.000	17140	2769	1.136	--
总计		100459	100.000	17140			

图114 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-317-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 20:58:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:27:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	99839	100.000	17147	2779	1.138	--
总计		99839	100.000	17147			

图115 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-318-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:02:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	100398	100.000	17178	2772	1.137	--
总计		100398	100.000	17178			

图116 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-319-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:05:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	100379	100.000	17170	2772	1.137	--
总计		100379	100.000	17170			

图117 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-320-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:09:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	99833	100.000	17216	2789	1.134	--
总计		99833	100.000	17216			

图118 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-321-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:12:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	71001	100.000	12556	2963	1.137	--
总计		71001	100.000	12556			

图119 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-322-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:15:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	89264	100.000	15660	2952	1.133	--
总计		89264	100.000	15660			

图120 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-323-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:19:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	70571	100.000	12492	2963	1.134	--
总计		70571	100.000	12492			

图121 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35℃

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-324-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:22:33

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	65173	100.000	11506	2952	1.137	--
总计		65173	100.000	11506			

图122 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-325-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:25:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	74865	100.000	13241	2957	1.133	--
总计		74865	100.000	13241			

图123 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-326-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:29:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	90236	100.000	15969	2960	1.134	--
总计		90236	100.000	15969			

图124 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-327-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:32:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	81865	100.000	14489	2972	1.136	--
总计		81865	100.000	14489			

图125 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-328-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:36:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	94076	100.000	16618	2957	1.135	--
总计		94076	100.000	16618			

图126 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-329-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:39:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	85778	100.000	15184	2959	1.139	--
总计		85778	100.000	15184			

图127 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-330-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:42:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	78988	100.000	13966	2960	1.134	--
总计		78988	100.000	13966			

图128 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-331-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:46:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	90654	100.000	16045	2961	1.135	--
总计		90654	100.000	16045			

图129 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-332-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:49:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	96778	100.000	17091	2958	1.137	--
总计		96778	100.000	17091			

图130 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-333-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:52:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	87394	100.000	15472	2965	1.136	--
总计		87394	100.000	15472			

图131 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-334-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:56:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	98636	100.000	17393	2949	1.136	--
总计		98636	100.000	17393			

图132 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-335-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 21:59:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	90775	100.000	16064	2957	1.134	--
总计		90775	100.000	16064			

图133 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-336-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:02:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	85981	100.000	15194	2951	1.137	--
总计		85981	100.000	15194			

图134 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-337-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:06:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:28:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	91264	100.000	16147	2963	1.134	--
总计		91264	100.000	16147			

图135 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-338-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:09:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	96738	100.000	17138	2969	1.134	--
总计		96738	100.000	17138			

图136 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-339-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:13:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	91752	100.000	16242	2960	1.132	--
总计		91752	100.000	16242			

图137 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-340-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:16:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	98070	100.000	17384	2965	1.136	--
总计		98070	100.000	17384			

图138 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-341-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:19:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	95162	100.000	16863	2971	1.135	--
总计		95162	100.000	16863			

图139 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-342-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:23:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	91229	100.000	16142	2955	1.137	--
总计		91229	100.000	16142			

图140 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-343-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:26:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	91917	100.000	16261	2959	1.137	--
总计		91917	100.000	16261			

图141 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-344-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:29:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	96159	100.000	17025	2965	1.136	--
总计		96159	100.000	17025			

图142 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-345-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:33:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	94476	100.000	16685	2950	1.137	--
总计		94476	100.000	16685			

图143 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-346-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:36:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	96074	100.000	16987	2960	1.137	--
总计		96074	100.000	16987			

图144 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-347-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:40:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	97071	100.000	17167	2961	1.136	--
总计		97071	100.000	17167			

图145 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-348-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:43:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	94057	100.000	16625	2953	1.137	--
总计		94057	100.000	16625			

图146 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-349-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:46:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	93479	100.000	16546	2962	1.136	--
总计		93479	100.000	16546			

图147 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-350-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:50:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	96051	100.000	16992	2956	1.138	--
总计		96051	100.000	16992			

图148 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-351-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:53:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	91609	100.000	16210	2960	1.138	--
总计		91609	100.000	16210			

图149 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-352-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:56:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	95524	100.000	16909	2963	1.136	--
总计		95524	100.000	16909			

图150 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-353-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:00:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	94876	100.000	16766	2959	1.140	--
总计		94876	100.000	16766			

图151 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-354-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:03:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	93888	100.000	16592	2957	1.136	--
总计		93888	100.000	16592			

图152 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-355-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:06:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	93818	100.000	16545	2957	1.136	--
总计		93818	100.000	16545			

图153 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-356-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:10:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:29:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	94807	100.000	16737	2956	1.136	--
总计		94807	100.000	16737			

图154 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-357-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:13:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	91822	100.000	16204	2953	1.136	--
总计		91822	100.000	16204			

图155 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-358-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:17:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	98182	100.000	17387	2962	1.136	--
总计		98182	100.000	17387			

图156 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-359-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:20:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.014	95046	100.000	16854	2974	1.139	--
总计		95046	100.000	16854			

图157 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-360-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:23:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	94187	100.000	16675	2970	1.135	--
总计		94187	100.000	16675			

图158 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-361-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:27:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	92454	100.000	16345	2963	1.138	--
总计		92454	100.000	16345			

图159 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-362-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:30:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	94427	100.000	16636	2944	1.137	--
总计		94427	100.000	16636			

图160 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-363-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:33:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	92975	100.000	16417	2965	1.137	--
总计		92975	100.000	16417			

图161 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-364-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:37:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	95122	100.000	16823	2968	1.138	--
总计		95122	100.000	16823			

图162 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-365-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:40:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	93180	100.000	16395	2957	1.137	--
总计		93180	100.000	16395			

图163 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-366-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:43:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.010	93857	100.000	16528	2942	1.136	--
总计		93857	100.000	16528			

图164 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-367-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:47:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.009	91409	100.000	16048	2941	1.136	--
总计		91409	100.000	16048			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-368-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:50:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.008	92703	100.000	16371	2956	1.139	--
总计		92703	100.000	16371			

图166 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-369-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:54:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	99470	100.000	17148	2777	1.136	--
总计		99470	100.000	17148			

图167 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-6/30-370-2 - zzp-25010802-4p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250114-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:57:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 14:30:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.004	99628	100.000	17143	2770	1.134	--
总计		99628	100.000	17143			

图168 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010802-4批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2