




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-227-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 14:19:23
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:58:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-228-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:22:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:58:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	382295	100.000	52330	2117	1.350	--
总计		382295	100.000	52330			

图2 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-229-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 14:26:10
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:58:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	382406	100.000	52275	2115	1.355	--
总计		382406	100.000	52275			

图3 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-230-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:29:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:58:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	382815	100.000	52255	2115	1.356	--
总计		382815	100.000	52255			

图4 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-231-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:32:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:58:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	382597	100.000	52237	2115	1.357	--
总计		382597	100.000	52237			

图5 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-232-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 14:36:21
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	382708	100.000	52196	2114	1.361	--
总计		382708	100.000	52196			

图6 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-233-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 14:39:44
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	157146	100.000	24562	2939	1.352	--
总计		157146	100.000	24562			

图7 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-234-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:43:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	163332	100.000	25464	2935	1.357	--
总计		163332	100.000	25464			

图8 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-235-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:46:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	155779	100.000	24312	2937	1.360	--
总计		155779	100.000	24312			

图9 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-236-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:49:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	163313	100.000	25465	2934	1.363	--
总计		163313	100.000	25465			

图10 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-237-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 14:53:17
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	161541	100.000	25247	2933	1.358	--
总计		161541	100.000	25247			

图11 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-238-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 14:56:39
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	164369	100.000	25653	2932	1.358	--
总计		164369	100.000	25653			

图12 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-239-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 15:00:02
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	217159	100.000	33782	2933	1.363	--
总计		217159	100.000	33782			

图13 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-240-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 15:03:25
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	226639	100.000	35275	2927	1.363	--
总计		226639	100.000	35275			

图14 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-241-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:06:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	234322	100.000	36544	2936	1.363	--
总计		234322	100.000	36544			

图15 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-242-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:10:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	232098	100.000	36187	2934	1.360	--
总计		232098	100.000	36187			

图16 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-243-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:13:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	227751	100.000	35513	2936	1.361	--
总计		227751	100.000	35513			

图17 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-244-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:16:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	237779	100.000	37086	2931	1.363	--
总计		237779	100.000	37086			

图18 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-245-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 15:20:21
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	249309	100.000	38781	2932	1.363	--
总计		249309	100.000	38781			

图19 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-246-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 15:23:44
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	260857	100.000	40627	2930	1.361	--
总计		260857	100.000	40627			

图20 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-247-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:27:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	264384	100.000	41204	2931	1.364	--
总计		264384	100.000	41204			

图21 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-248-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 15:30:30
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	267337	100.000	41608	2928	1.365	--
总计		267337	100.000	41608			

图22 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-249-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:33:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	260428	100.000	40592	2932	1.363	--
总计		260428	100.000	40592			

图23 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-250-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 15:37:15
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	272589	100.000	42441	2930	1.366	--
总计		272589	100.000	42441			

图24 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-251-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:40:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 09:59:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	268599	100.000	41776	2930	1.367	--
总计		268599	100.000	41776			

图25 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-252-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 15:44:01
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:59:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	280600	100.000	43594	2929	1.364	--
总计		280600	100.000	43594			

图26 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-253-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:47:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	284061	100.000	44245	2933	1.363	--
总计		284061	100.000	44245			

图27 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-254-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:50:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	288994	100.000	44961	2928	1.367	--
总计		288994	100.000	44961			

图28 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-255-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 15:54:10
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	281521	100.000	43824	2934	1.367	--
总计		281521	100.000	43824			

图29 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-256-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/15 15:57:32

处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min


波长:275nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	293864	100.000	45754	2932	1.366	--
总计		293864	100.000	45754			

图30 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-257-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:00:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	290461	100.000	45161	2933	1.366	--
总计		290461	100.000	45161			

图31 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-258-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/15 16:04:17

处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min


波长:275nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	302407	100.000	47011	2933	1.365	--
总计		302407	100.000	47011			

图32 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-259-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:07:40
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	311785	100.000	48419	2933	1.368	--
总计		311785	100.000	48419			

图33 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-260-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:11:03
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	313460	100.000	48765	2930	1.367	--
总计		313460	100.000	48765			

图34 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-261-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:14:26
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	303556	100.000	47253	2930	1.365	--
总计		303556	100.000	47253			

图35 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-262-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:17:48
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	316438	100.000	49222	2928	1.363	--
总计		316438	100.000	49222			

图36 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-263-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:21:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	306811	100.000	47724	2935	1.364	--
总计		306811	100.000	47724			

图37 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-264-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:24:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	319926	100.000	49785	2931	1.366	--
总计		319926	100.000	49785			

图38 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-265-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:27:57
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	322677	100.000	50265	2936	1.365	--
总计		322677	100.000	50265			

图39 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-266-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:31:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	329936	100.000	51330	2929	1.364	--
总计		329936	100.000	51330			

图40 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-267-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:34:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	320487	100.000	49899	2932	1.364	--
总计		320487	100.000	49899			

图41 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-268-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:38:07
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	331947	100.000	51669	2930	1.366	--
总计		331947	100.000	51669			

图42 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-269-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:41:29
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	315184	100.000	49070	2931	1.365	--
总计		315184	100.000	49070			

图43 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-270-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:44:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	325919	100.000	50702	2935	1.363	--
总计		325919	100.000	50702			

图44 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-271-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:48:15
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	330374	100.000	51361	2935	1.365	--
总计		330374	100.000	51361			

图45 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-272-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 16:51:37
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:00:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	339109	100.000	52767	2937	1.366	--
总计		339109	100.000	52767			

图46 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-273-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:54:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	328343	100.000	51150	2938	1.361	--
总计		328343	100.000	51150			

图47 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-274-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:58:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:00:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	338720	100.000	52721	2933	1.365	--
总计		338720	100.000	52721			

图48 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-275-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:01:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	371913	100.000	57849	2934	1.366	--
总计		371913	100.000	57849			

图49 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-276-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 17:05:09
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:01:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	378022	100.000	58823	2932	1.364	--
总计		378022	100.000	58823			

图50 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-277-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:08:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	375789	100.000	58522	2931	1.363	--
总计		375789	100.000	58522			

图51 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-278-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:11:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	386604	100.000	60079	2931	1.366	--
总计		386604	100.000	60079			

图52 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-279-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 17:15:20
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:01:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	381015	100.000	59294	2932	1.364	--
总计		381015	100.000	59294			

图53 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-280-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 17:18:44
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:01:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	380581	100.000	59158	2929	1.366	--
总计		380581	100.000	59158			

图54 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-281-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:22:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	382039	100.000	51888	2107	1.367	--
总计		382039	100.000	51888			

图55 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-282-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:25:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	381374	100.000	51930	2114	1.368	--
总计		381374	100.000	51930			

图56 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-283-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 17:28:56
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:01:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-284-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:32:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	382302	100.000	52041	2117	1.368	--
总计		382302	100.000	52041			

图58 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-285-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:35:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	382425	100.000	52045	2116	1.368	--
总计		382425	100.000	52045			

图59 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-286-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:39:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	382016	100.000	52058	2115	1.366	--
总计		382016	100.000	52058			

图60 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-287-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:42:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	382284	100.000	52049	2116	1.367	--
总计		382284	100.000	52049			

图61 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-288-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 17:45:59
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:01:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	382443	100.000	52091	2117	1.366	--
总计		382443	100.000	52091			

图62 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-289-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:49:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	152746	100.000	23672	2936	1.365	--
总计		152746	100.000	23672			

图63 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-290-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:52:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	163428	100.000	25370	2938	1.368	--
总计		163428	100.000	25370			

图64 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-291-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:56:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	158128	100.000	24537	2941	1.367	--
总计		158128	100.000	24537			

图65 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-292-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:59:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	156067	100.000	24215	2941	1.365	--
总计		156067	100.000	24215			

图66 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-293-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:02:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	160352	100.000	24863	2935	1.367	--
总计		160352	100.000	24863			

图67 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-294-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:06:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	159391	100.000	24688	2933	1.368	--
总计		159391	100.000	24688			

图68 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-295-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:09:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	217429	100.000	33703	2939	1.365	--
总计		217429	100.000	33703			

图69 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-296-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:13:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:01:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	220336	100.000	34124	2939	1.369	--
总计		220336	100.000	34124			

图70 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-297-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:16:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	214688	100.000	33274	2938	1.366	--
总计		214688	100.000	33274			

图71 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-298-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:19:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	217097	100.000	33649	2938	1.369	--
总计		217097	100.000	33649			

图72 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-299-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:23:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	222896	100.000	34642	2943	1.365	--
总计		222896	100.000	34642			

图73 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-300-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:26:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	220205	100.000	34217	2941	1.366	--
总计		220205	100.000	34217			

图74 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-301-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:30:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	251884	100.000	39022	2942	1.369	--
总计		251884	100.000	39022			

图75 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-302-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:33:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	252079	100.000	39177	2941	1.365	--
总计		252079	100.000	39177			

图76 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-303-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:36:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	240959	100.000	37360	2939	1.366	--
总计		240959	100.000	37360			

图77 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-304-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:40:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	247884	100.000	38419	2939	1.367	--
总计		247884	100.000	38419			

图78 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-305-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:43:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	255991	100.000	39715	2938	1.367	--
总计		255991	100.000	39715			

图79 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-306-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:47:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	251144	100.000	38913	2944	1.369	--
总计		251144	100.000	38913			

图80 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-307-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 18:50:36
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:02:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	272158	100.000	42154	2938	1.367	--
总计		272158	100.000	42154			

图81 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-308-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 18:53:59
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:02:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	271431	100.000	42144	2937	1.366	--
总计		271431	100.000	42144			

图82 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-309-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 18:57:23
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:02:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	258928	100.000	40121	2937	1.370	--
总计		258928	100.000	40121			

图83 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-310-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/15 19:00:48

处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:02:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min


波长:275nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	267041	100.000	41419	2939	1.368	--
总计		267041	100.000	41419			

图84 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-311-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:04:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	280518	100.000	43556	2937	1.366	--
总计		280518	100.000	43556			

图85 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-312-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 19:07:35
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:02:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	272294	100.000	42318	2941	1.366	--
总计		272294	100.000	42318			

图86 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-313-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:10:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	294789	100.000	45761	2939	1.366	--
总计		294789	100.000	45761			

图87 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-314-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:14:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	294309	100.000	45605	2936	1.366	--
总计		294309	100.000	45605			

图88 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-315-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:17:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	278787	100.000	43215	2936	1.368	--
总计		278787	100.000	43215			

图89 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-316-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:21:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	293867	100.000	45607	2944	1.368	--
总计		293867	100.000	45607			

图90 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-317-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:24:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:02:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	295236	100.000	45757	2942	1.370	--
总计		295236	100.000	45757			

图91 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-318-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 19:28:00
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:02:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	301956	100.000	46869	2938	1.369	--
总计		301956	100.000	46869			

图92 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-319-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:31:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	314792	100.000	48861	2941	1.368	--
总计		314792	100.000	48861			

图93 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-320-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:34:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	310934	100.000	48310	2945	1.365	--
总计		310934	100.000	48310			

图94 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-321-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:38:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	294437	100.000	45702	2942	1.369	--
总计		294437	100.000	45702			

图95 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-322-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:41:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	304457	100.000	47227	2939	1.367	--
总计		304457	100.000	47227			

图96 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-323-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:45:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	310084	100.000	48176	2945	1.366	--
总计		310084	100.000	48176			

图97 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-324-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:48:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	309761	100.000	48178	2948	1.362	--
总计		309761	100.000	48178			

图98 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-325-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:51:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	327552	100.000	50817	2937	1.368	--
总计		327552	100.000	50817			

图99 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-326-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:55:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	320283	100.000	49638	2937	1.370	--
总计		320283	100.000	49638			

图100 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-327-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 19:58:43
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:03:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	301606	100.000	46801	2943	1.370	--
总计		301606	100.000	46801			

图101 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-328-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:02:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	318699	100.000	49487	2942	1.369	--
总计		318699	100.000	49487			

图102 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-329-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:05:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	318739	100.000	49444	2941	1.367	--
总计		318739	100.000	49444			

图103 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-330-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:08:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	318323	100.000	49411	2942	1.369	--
总计		318323	100.000	49411			

图104 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-331-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 20:12:21
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:03:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	385089	100.000	59874	2940	1.366	--
总计		385089	100.000	59874			

图105 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-332-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 20:15:46
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:03:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	387409	100.000	60161	2937	1.367	--
总计		387409	100.000	60161			

图106 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-333-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:19:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	372281	100.000	57868	2943	1.365	--
总计		372281	100.000	57868			

图107 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-334-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 20:22:36
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:03:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	378549	100.000	58825	2942	1.367	--
总计		378549	100.000	58825			

图108 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-335-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:26:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	379082	100.000	58871	2940	1.368	--
总计		379082	100.000	58871			

图109 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-336-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:29:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	386499	100.000	59991	2946	1.370	--
总计		386499	100.000	59991			

图110 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-337-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:32:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	383000	100.000	52195	2129	1.368	--
总计		383000	100.000	52195			

图111 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-338-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:36:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	383181	100.000	52243	2128	1.365	--
总计		383181	100.000	52243			

图112 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-339-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 20:39:38
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:03:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-340-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:43:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:03:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	381708	100.000	51997	2122	1.366	--
总计		381708	100.000	51997			

图114 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-341-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:46:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	381172	100.000	51946	2124	1.366	--
总计		381172	100.000	51946			

图115 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-342-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:49:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	381429	100.000	51974	2125	1.364	--
总计		381429	100.000	51974			

图116 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-343-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:53:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	381408	100.000	51919	2126	1.367	--
总计		381408	100.000	51919			

图117 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-344-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:56:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	380392	100.000	51883	2126	1.365	--
总计		380392	100.000	51883			

图118 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-345-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 20:59:57
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:04:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	191028	100.000	29678	2947	1.367	--
总计		191028	100.000	29678			

图119 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-346-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:03:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	177029	100.000	27561	2945	1.361	--
总计		177029	100.000	27561			

图120 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-347-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:06:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	178383	100.000	27744	2941	1.365	--
总计		178383	100.000	27744			

图121 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-348-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:10:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	178143	100.000	27760	2950	1.365	--
总计		178143	100.000	27760			

图122 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-349-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 21:13:28
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:04:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	188311	100.000	29311	2946	1.367	--
总计		188311	100.000	29311			

图123 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-350-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:16:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	184734	100.000	28668	2943	1.370	--
总计		184734	100.000	28668			

图124 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-351-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:20:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	252882	100.000	39345	2950	1.368	--
总计		252882	100.000	39345			

图125 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-352-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 21:23:37
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:04:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	237878	100.000	36975	2946	1.368	--
总计		237878	100.000	36975			

图126 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-353-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:27:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	237600	100.000	36876	2946	1.373	--
总计		237600	100.000	36876			

图127 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-354-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:30:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	248577	100.000	38639	2948	1.369	--
总计		248577	100.000	38639			

图128 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-355-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/15 21:33:44

处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:04:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min


波长:275nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	259234	100.000	40286	2948	1.368	--
总计		259234	100.000	40286			

图129 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-356-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 21:37:06
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:04:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	252332	100.000	39194	2946	1.369	--
总计		252332	100.000	39194			

图130 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-357-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 21:40:29
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:04:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	292762	100.000	45391	2946	1.369	--
总计		292762	100.000	45391			

图131 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-358-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:43:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	266162	100.000	41260	2945	1.370	--
总计		266162	100.000	41260			

图132 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-359-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:47:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	272940	100.000	42284	2948	1.372	--
总计		272940	100.000	42284			

图133 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-360-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:50:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	282362	100.000	43755	2948	1.371	--
总计		282362	100.000	43755			

图134 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-361-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:53:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:04:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	296203	100.000	45807	2946	1.373	--
总计		296203	100.000	45807			

图135 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-362-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 21:57:20
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:04:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	290278	100.000	44891	2945	1.372	--
总计		290278	100.000	44891			

图136 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-363-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:00:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	315277	100.000	48818	2947	1.373	--
总计		315277	100.000	48818			


图137 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-364-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:04:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	282348	100.000	43725	2945	1.370	--
总计		282348	100.000	43725			


图138 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-365-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:07:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	282962	100.000	43770	2949	1.372	--
总计		282962	100.000	43770			

图139 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-366-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 22:10:47
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:05:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	302229	100.000	46685	2945	1.373	--
总计		302229	100.000	46685			

图140 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-367-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:14:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	318602	100.000	49278	2946	1.371	--
总计		318602	100.000	49278			

图141 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-368-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:17:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	309161	100.000	47719	2946	1.375	--
总计		309161	100.000	47719			

图142 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-369-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:20:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	345048	100.000	53290	2948	1.373	--
总计		345048	100.000	53290			

图143 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-370-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:24:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	300873	100.000	46510	2949	1.371	--
总计		300873	100.000	46510			

图144 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-371-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:27:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	301582	100.000	46599	2949	1.370	--
总计		301582	100.000	46599			

图145 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-372-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:31:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	326719	100.000	50350	2947	1.376	--
总计		326719	100.000	50350			

图146 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-373-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:34:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	344651	100.000	53157	2947	1.376	--
总计		344651	100.000	53157			

图147 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-374-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 22:37:44
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:05:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	330265	100.000	50966	2950	1.373	--
总计		330265	100.000	50966			

图148 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-375-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:41:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	364643	100.000	56271	2948	1.373	--
总计		364643	100.000	56271			

图149 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-376-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 22:44:27
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:05:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	312971	100.000	48369	2950	1.372	--
总计		312971	100.000	48369			

图150 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-377-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:47:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	314093	100.000	48460	2948	1.374	--
总计		314093	100.000	48460			

图151 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-378-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:51:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	345301	100.000	53316	2949	1.374	--
总计		345301	100.000	53316			

图152 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-379-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:54:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	362449	100.000	56023	2950	1.372	--
总计		362449	100.000	56023			

图153 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-380-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:57:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	351538	100.000	54299	2946	1.371	--
总计		351538	100.000	54299			

图154 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-381-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:01:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:05:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	372214	100.000	57487	2950	1.374	--
总计		372214	100.000	57487			

图155 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-382-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 23:04:39
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:05:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	320326	100.000	49546	2949	1.369	--
总计		320326	100.000	49546			

图156 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-383-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:08:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	321160	100.000	49652	2948	1.372	--
总计		321160	100.000	49652			

图157 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-384-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:11:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	354912	100.000	54919	2947	1.371	--
总计		354912	100.000	54919			

图158 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-385-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:14:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	374166	100.000	57975	2950	1.372	--
总计		374166	100.000	57975			

图159 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-386-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 23:18:08
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:06:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	363402	100.000	56203	2950	1.375	--
总计		363402	100.000	56203			

图160 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-387-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:21:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	382259	100.000	59081	2946	1.374	--
总计		382259	100.000	59081			

图161 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-388-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:24:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	372919	100.000	57534	2947	1.376	--
总计		372919	100.000	57534			

图162 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-389-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:28:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	375983	100.000	58149	2948	1.371	--
总计		375983	100.000	58149			

图163 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-390-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 23:31:42
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:06:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	374956	100.000	58015	2950	1.373	--
总计		374956	100.000	58015			

图164 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-391-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/15 23:35:05

处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:06:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min


波长:275nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	383372	100.000	59315	2950	1.372	--
总计		383372	100.000	59315			

图165 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-392-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:38:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	383085	100.000	59212	2945	1.375	--
总计		383085	100.000	59212			

图166 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-393-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:41:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	383669	100.000	52184	2134	1.368	--
总计		383669	100.000	52184			

图167 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-394-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:45:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	383497	100.000	52186	2136	1.365	--
总计		383497	100.000	52186			

图168 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-395-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/15 23:48:38
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:06:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-396-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:52:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	382953	100.000	52095	2134	1.366	--
总计		382953	100.000	52095			

图170 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-397-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:55:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	382879	100.000	52058	2133	1.365	--
总计		382879	100.000	52058			

图171 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-398-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:58:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	383191	100.000	52091	2133	1.365	--
总计		383191	100.000	52091			

图172 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-399-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:02:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	382693	100.000	52046	2132	1.365	--
总计		382693	100.000	52046			

图173 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-400-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:05:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	382919	100.000	52018	2129	1.364	--
总计		382919	100.000	52018			

图174 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-401-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:09:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	188668	100.000	29282	2962	1.367	--
总计		188668	100.000	29282			

图175 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-402-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:12:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	179423	100.000	27811	2951	1.368	--
总计		179423	100.000	27811			

图176 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-403-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:15:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:06:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	182114	100.000	28226	2945	1.374	--
总计		182114	100.000	28226			

图177 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-404-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:19:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	166134	100.000	25775	2957	1.374	--
总计		166134	100.000	25775			

图178 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-405-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:22:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	171791	100.000	26548	2949	1.377	--
总计		171791	100.000	26548			

图179 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-406-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:25:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	184551	100.000	28547	2949	1.376	--
总计		184551	100.000	28547			

图180 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-407-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:29:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	242220	100.000	37543	2954	1.373	--
总计		242220	100.000	37543			

图181 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-408-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:32:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	249293	100.000	38637	2950	1.375	--
总计		249293	100.000	38637			

图182 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-409-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:36:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	261146	100.000	40498	2955	1.372	--
总计		261146	100.000	40498			

图183 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-410-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 00:39:30
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:07:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	238413	100.000	36876	2950	1.378	--
总计		238413	100.000	36876			

图184 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-411-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:42:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	241110	100.000	37374	2954	1.371	--
总计		241110	100.000	37374			

图185 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-412-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:46:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	255113	100.000	39522	2952	1.372	--
总计		255113	100.000	39522			

图186 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-413-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:49:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	273287	100.000	42352	2952	1.372	--
总计		273287	100.000	42352			

图187 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-414-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:53:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	286211	100.000	44317	2948	1.371	--
总计		286211	100.000	44317			

图188 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-415-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 00:56:27
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:07:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	301253	100.000	46615	2948	1.375	--
总计		301253	100.000	46615			

图189 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-416-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:59:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	275814	100.000	42699	2948	1.374	--
总计		275814	100.000	42699			

图190 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-417-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:03:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	277850	100.000	43015	2949	1.376	--
总计		277850	100.000	43015			

图191 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-418-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:06:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	289116	100.000	44773	2950	1.373	--
总计		289116	100.000	44773			

图192 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-419-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:10:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	291299	100.000	45091	2948	1.374	--
总计		291299	100.000	45091			

图193 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-420-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:13:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	311139	100.000	48189	2949	1.374	--
总计		311139	100.000	48189			

图194 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-421-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:16:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	327076	100.000	50627	2948	1.374	--
总计		327076	100.000	50627			

图195 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-422-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:20:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	297662	100.000	46041	2944	1.376	--
总计		297662	100.000	46041			

图196 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-423-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:23:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	301968	100.000	46732	2947	1.374	--
总计		301968	100.000	46732			

图197 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-424-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:26:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	308753	100.000	47778	2951	1.376	--
总计		308753	100.000	47778			

图198 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-425-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:30:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	315630	100.000	48834	2948	1.374	--
总计		315630	100.000	48834			

图199 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-426-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:33:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:07:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	344430	100.000	53321	2950	1.376	--
总计		344430	100.000	53321			

图200 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-427-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:37:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	352877	100.000	54603	2949	1.376	--
总计		352877	100.000	54603			

图201 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-428-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:40:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	321360	100.000	49764	2950	1.375	--
总计		321360	100.000	49764			

图202 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-429-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:43:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	328730	100.000	50885	2949	1.374	--
总计		328730	100.000	50885			

图203 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-430-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:47:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	332543	100.000	51456	2944	1.375	--
总计		332543	100.000	51456			

图204 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-431-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:50:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	326046	100.000	50459	2951	1.372	--
总计		326046	100.000	50459			

图205 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-432-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:54:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	366969	100.000	56799	2948	1.376	--
总计		366969	100.000	56799			

图206 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-433-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:57:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	368368	100.000	56987	2948	1.378	--
总计		368368	100.000	56987			

图207 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-434-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:00:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	340385	100.000	52674	2949	1.374	--
总计		340385	100.000	52674			

图208 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-435-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:04:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	346577	100.000	53642	2952	1.375	--
总计		346577	100.000	53642			

图209 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-436-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:07:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	353806	100.000	54762	2951	1.374	--
总计		353806	100.000	54762			

图210 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-437-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:11:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	334158	100.000	51638	2949	1.378	--
总计		334158	100.000	51638			

图211 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-438-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:14:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	373981	100.000	57844	2946	1.374	--
总计		373981	100.000	57844			

图212 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-439-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:17:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	373763	100.000	57783	2945	1.377	--
总计		373763	100.000	57783			

图213 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-440-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:21:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	349391	100.000	54102	2951	1.375	--
总计		349391	100.000	54102			

图214 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-441-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 02:24:46
处理时间 (V2) : 2025/01/16 10:08:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	355433	100.000	54984	2946	1.377	--
总计		355433	100.000	54984			

图215 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-442-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:28:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	362386	100.000	56087	2950	1.374	--
总计		362386	100.000	56087			

图216 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-443-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:31:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	378810	100.000	58698	2951	1.371	--
总计		378810	100.000	58698			


图217 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-444-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:35:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	380182	100.000	58747	2944	1.375	--
总计		380182	100.000	58747			

图218 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-445-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:38:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	376714	100.000	58277	2944	1.374	--
总计		376714	100.000	58277			

图219 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-446-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:41:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	382771	100.000	59082	2944	1.379	--
总计		382771	100.000	59082			

图220 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-447-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:45:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:08:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	367682	100.000	56856	2947	1.376	--
总计		367682	100.000	56856			

图221 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-448-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:48:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:09:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	380475	100.000	58760	2947	1.377	--
总计		380475	100.000	58760			

图222 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-449-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:52:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:09:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	385069	100.000	52182	2136	1.366	--
总计		385069	100.000	52182			

图223 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 29-3/18-450-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:55:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 10:09:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	384715	100.000	52165	2138	1.366	--
总计		384715	100.000	52165			

图224 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2