




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1075-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:05:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
溶剂




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1076-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 11:08:58
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:25:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	174734	36.609	30703	2156	1.163	--
2	2.214	302566	63.391	44508	2463	1.106	2.970
总计		477300	100.000	75210			

图2 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1077-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:12:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	174580	36.602	30681	2155	1.163	--
2	2.215	302383	63.398	44504	2464	1.106	2.970
总计		476963	100.000	75185			

图3 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1078-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 11:15:48
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:25:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	174898	36.637	30717	2154	1.164	--
2	2.214	302484	63.363	44520	2465	1.105	2.969
总计		477382	100.000	75237			

图4 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1079-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:21:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	174861	36.647	30705	2154	1.163	--
2	2.215	302294	63.353	44491	2465	1.106	2.968
总计		477154	100.000	75196			

图5 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1080-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:24:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	174671	36.597	30727	2159	1.162	--
2	2.214	302610	63.403	44544	2467	1.105	2.970
总计		477282	100.000	75271			

图6 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1081-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:27:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	55254	20.753	10672	2655	1.136	--
2	2.218	210996	79.247	30232	2343	1.094	2.973
总计		266250	100.000	40905			

图7 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1082-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:31:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	36285	13.250	7056	2672	1.135	--
2	2.218	237567	86.750	34045	2343	1.094	2.973
总计		273852	100.000	41101			

图8 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1083-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 11:34:44
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:25:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	25190	11.191	4890	2650	1.127	--
2	2.217	199905	88.809	28575	2329	1.095	2.961
总计		225095	100.000	33465			

图9 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1084-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:38:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	46235	15.238	8983	2668	1.140	--
2	2.217	257183	84.762	36769	2327	1.093	2.961
总计		303418	100.000	45753			

图10 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1085-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 11:41:32
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:25:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	25986	12.215	5034	2658	1.130	--
2	2.217	186756	87.785	26771	2337	1.092	2.964
总计		212742	100.000	31804			

图11 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1086-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 11:44:57
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:25:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	41938	14.192	8131	2664	1.133	--
2	2.216	253559	85.808	36400	2341	1.093	2.966
总计		295497	100.000	44532			

图12 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1087-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/15 11:48:23

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:40

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	133942	31.331	25821	2656	1.137	--
2	2.216	293567	68.669	42134	2341	1.092	2.968
总计		427509	100.000	67955			

图13 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1088-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 11:51:47
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:25:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	121396	28.440	23449	2664	1.138	--
2	2.216	305450	71.560	43766	2329	1.093	2.959
总计		426846	100.000	67215			

图14 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1089-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:55:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	103549	25.439	20060	2664	1.135	--
2	2.217	303499	74.561	43463	2336	1.092	2.961
总计		407048	100.000	63523			

图15 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1090-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 11:58:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	135828	30.452	26290	2664	1.137	--
2	2.217	310211	69.548	44425	2336	1.092	2.961
总计		446039	100.000	70715			

图16 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1091-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:02:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	103011	24.970	19976	2676	1.136	--
2	2.216	309532	75.030	44360	2340	1.091	2.962
总计		412543	100.000	64336			


图17 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1092-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:05:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	116055	27.770	22408	2657	1.137	--
2	2.217	301865	72.230	43242	2336	1.091	2.959
总计		417921	100.000	65650			

图18 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1093-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 12:08:51
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:25:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	164666	34.673	31765	2663	1.136	--
2	2.216	310242	65.327	44551	2342	1.092	2.964
总计		474908	100.000	76316			

图19 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1094-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:12:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:25:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	155410	33.347	29942	2652	1.136	--
2	2.215	310626	66.653	44577	2336	1.090	2.958
总计		466036	100.000	74519			

图20 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1095-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:15:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	147318	31.268	28516	2667	1.138	--
2	2.216	323832	68.732	46419	2330	1.090	2.955
总计		471150	100.000	74935			

图21 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1096-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:19:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	169490	34.597	32768	2663	1.136	--
2	2.216	320414	65.403	45978	2339	1.090	2.958
总计		489904	100.000	78746			

图22 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1097-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:22:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	145535	31.147	28172	2664	1.136	--
2	2.216	321724	68.853	46224	2346	1.090	2.961
总计		467259	100.000	74396			

图23 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1098-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/15 12:25:55

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:09

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	155190	33.025	30035	2666	1.137	--
2	2.216	314731	66.975	45284	2351	1.090	2.963
总计		469922	100.000	75319			

图24 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1099-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:29:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	172988	35.546	33401	2665	1.137	--
2	2.215	313674	64.454	45205	2353	1.090	2.964
总计		486662	100.000	78606			

图25 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1100-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:32:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	171126	35.061	33152	2667	1.134	--
2	2.216	316951	64.939	45681	2362	1.090	2.965
总计		488077	100.000	78832			

图26 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1101-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:36:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	161928	33.432	31513	2695	1.134	--
2	2.218	322420	66.568	46852	2416	1.089	2.994
总计		484348	100.000	78365			

图27 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1102-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 12:39:33
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:26:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	178593	35.789	34574	2670	1.136	--
2	2.216	320428	64.211	46280	2374	1.089	2.970
总计		499021	100.000	80854			

图28 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1103-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:42:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	160684	33.157	31108	2665	1.138	--
2	2.216	323938	66.843	46784	2366	1.089	2.966
总计		484622	100.000	77892			

图29 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1104-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:46:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	171775	34.809	33257	2669	1.135	--
2	2.215	321709	65.191	46414	2359	1.089	2.962
总计		493484	100.000	79670			

图30 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1105-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:49:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	169583	35.986	32776	2662	1.135	--
2	2.217	301666	64.014	43902	2413	1.088	2.989
总计		471249	100.000	76678			

图31 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1106-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 12:53:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	172951	35.782	33661	2690	1.134	--
2	2.217	310402	64.218	45397	2442	1.087	3.003
总计		483352	100.000	79058			

图32 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1107-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 12:56:37
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:26:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	171840	34.919	33363	2684	1.136	--
2	2.217	320270	65.081	46564	2411	1.088	2.987
总计		492110	100.000	79927			

图33 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1108-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:00:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	180808	36.388	34911	2657	1.136	--
2	2.216	316081	63.612	45729	2375	1.088	2.968
总计		496889	100.000	80640			

图34 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1109-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:03:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	171240	34.645	33342	2697	1.133	--
2	2.217	323026	65.355	47123	2436	1.088	2.997
总计		494266	100.000	80465			

图35 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1110-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:06:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175358	35.823	33978	2670	1.135	--
2	2.216	314149	64.177	45577	2392	1.087	2.976
总计		489506	100.000	79555			

图36 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1111-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:10:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	172541	36.012	33380	2671	1.137	--
2	2.216	306582	63.988	44670	2413	1.087	2.988
总计		479123	100.000	78050			

图37 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1112-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:13:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	178226	36.023	34379	2659	1.137	--
2	2.214	316528	63.977	45790	2369	1.089	2.963
总计		494754	100.000	80169			

图38 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1113-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 13:17:06
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:26:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	178681	35.458	34546	2663	1.136	--
2	2.215	325241	64.542	47049	2373	1.088	2.963
总计		503922	100.000	81596			

图39 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1114-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:20:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	181586	36.505	35049	2655	1.138	--
2	2.215	315836	63.495	45756	2379	1.089	2.966
总计		497422	100.000	80804			

图40 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1115-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:23:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:26:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	177719	35.230	34328	2655	1.136	--
2	2.215	326734	64.770	47277	2369	1.089	2.960
总计		504453	100.000	81605			

图41 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1116-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 13:27:19
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:26:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	179303	36.069	34688	2665	1.135	--
2	2.215	317809	63.931	46025	2378	1.088	2.964
总计		497112	100.000	80713			

图42 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1117-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:30:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	171331	35.928	32997	2650	1.137	--
2	2.214	305544	64.072	44341	2382	1.088	2.967
总计		476875	100.000	77338			

图43 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1118-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:34:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	177578	36.041	34284	2659	1.136	--
2	2.214	315132	63.959	45694	2377	1.089	2.963
总计		492710	100.000	79978			

图44 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30℃ 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1119-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/01/15 13:37:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175711	35.622	33931	2657	1.137	--
2	2.215	317556	64.378	46025	2382	1.088	2.965
总计		493267	100.000	79956			

图45 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1120-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:40:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	180016	36.461	34758	2655	1.137	--
2	2.215	313701	63.539	45539	2391	1.089	2.968
总计		493717	100.000	80298			

图46 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1121-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:44:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175950	35.306	33991	2659	1.136	--
2	2.214	322404	64.694	46795	2385	1.088	2.965
总计		498354	100.000	80786			

图47 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1122-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:47:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175573	36.088	33902	2656	1.136	--
2	2.215	310942	63.912	45138	2387	1.087	2.966
总计		486514	100.000	79040			

图48 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1123-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 13:51:14
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:27:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	171486	35.429	33116	2661	1.134	--
2	2.214	312547	64.571	45455	2391	1.089	2.969
总计		484033	100.000	78571			

图49 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1124-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 13:54:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	177540	35.916	34163	2647	1.136	--
2	2.213	316778	64.084	45822	2367	1.090	2.955
总计		494318	100.000	79985			

图50 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1125-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 13:58:05
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:27:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	177621	35.826	34613	2695	1.133	--
2	2.216	318173	64.174	46649	2447	1.088	2.994
总计		495794	100.000	81261			

图51 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1126-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-35 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/01/15 14:01:31 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	185779	36.161	35962	2667	1.135	--
2	2.214	327981	63.839	47626	2384	1.089	2.961
总计		513760	100.000	83588			

图52 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1127-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 14:04:57
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:27:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	179846	35.362	34872	2673	1.131	--
2	2.214	328733	64.638	47859	2397	1.088	2.968
总计		508579	100.000	82731			

图53 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1128-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 14:08:22
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:27:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	176946	36.094	34184	2665	1.136	--
2	2.213	313286	63.906	45547	2385	1.088	2.963
总计		490232	100.000	79731			

图54 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1129-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:11:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	174696	36.608	30858	2174	1.160	--
2	2.210	302514	63.392	44609	2478	1.100	2.946
总计		477210	100.000	75467			

图55 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1130-2 - zzp-2023121221p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:15:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	175680	36.657	30927	2166	1.164	--
2	2.210	303574	63.343	44723	2474	1.101	2.943
总计		479253	100.000	75649			

图56 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121221批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2



SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1131-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/15 14:18:41

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:36

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
溶剂




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1132-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:22:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	174461	36.606	30667	2154	1.163	--
2	2.210	302130	63.394	44325	2460	1.101	2.934
总计		476590	100.000	74992			

图58 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1133-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:25:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	174675	36.634	30708	2157	1.162	--
2	2.210	302141	63.366	44364	2462	1.101	2.936
总计		476816	100.000	75072			

图59 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1134-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:29:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	174839	36.640	30702	2156	1.164	--
2	2.210	302340	63.360	44343	2459	1.101	2.935
总计		477180	100.000	75045			

图60 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1135-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:32:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	174929	36.663	30718	2154	1.164	--
2	2.210	302195	63.337	44387	2460	1.102	2.934
总计		477124	100.000	75105			

图61 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1136-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:35:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	174900	36.643	30737	2157	1.163	--
2	2.210	302412	63.357	44417	2462	1.101	2.936
总计		477312	100.000	75155			

图62 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1137-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:39:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	47874	16.191	9302	2666	1.134	--
2	2.216	247807	83.809	36284	2434	1.089	2.985
总计		295681	100.000	45586			

图63 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1138-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 14:42:47
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:27:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	32847	14.256	6374	2661	1.127	--
2	2.214	197554	85.744	28904	2418	1.088	2.978
总计		230400	100.000	35278			

图64 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1139-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:46:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	57126	20.220	11101	2668	1.131	--
2	2.215	225393	79.780	33128	2448	1.088	2.992
总计		282518	100.000	44229			

图65 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1140-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:49:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:27:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	35222	12.412	6822	2655	1.134	--
2	2.215	248560	87.588	36348	2420	1.089	2.976
总计		283782	100.000	43170			

图66 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1141-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:53:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	53868	17.335	10491	2674	1.125	--
2	2.215	256877	82.665	37581	2434	1.089	2.989
总计		310745	100.000	48072			

图67 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1142-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 14:56:31
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:28:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	32977	12.360	6390	2660	1.132	--
2	2.215	233823	87.640	34236	2427	1.088	2.978
总计		266800	100.000	40626			

图68 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1143-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:59:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	129156	29.706	24967	2660	1.135	--
2	2.213	305624	70.294	44479	2393	1.089	2.963
总计		434780	100.000	69446			

图69 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1144-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:03:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	108824	26.782	21035	2658	1.134	--
2	2.213	297515	73.218	43255	2385	1.090	2.958
总计		406339	100.000	64290			

图70 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1145-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:06:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	126020	30.399	24425	2673	1.136	--
2	2.214	288530	69.601	42277	2428	1.087	2.980
总计		414550	100.000	66703			

图71 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1146-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:10:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	116443	27.633	22496	2656	1.135	--
2	2.213	304951	72.367	44480	2405	1.088	2.968
总计		421394	100.000	66976			

图72 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1147-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:13:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	129542	29.744	25088	2667	1.135	--
2	2.214	305977	70.256	44716	2415	1.088	2.969
总计		435519	100.000	69804			

图73 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1148-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:17:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	122023	27.972	23620	2664	1.135	--
2	2.214	314208	72.028	45874	2411	1.088	2.966
总计		436231	100.000	69494			

图74 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1149-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:20:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	158243	33.576	30613	2659	1.135	--
2	2.213	313052	66.424	45550	2394	1.089	2.957
总计		471295	100.000	76163			

图75 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1150-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:24:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	146985	31.603	28448	2663	1.133	--
2	2.212	318110	68.397	46171	2380	1.089	2.951
总计		465095	100.000	74619			

图76 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1151-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:27:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	150365	33.591	28958	2646	1.137	--
2	2.213	297275	66.409	43273	2394	1.089	2.958
总计		447640	100.000	72231			

图77 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1152-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/15 15:30:52

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:29

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	158905	33.352	30684	2654	1.136	--
2	2.212	317544	66.648	46293	2401	1.089	2.961
总计		476449	100.000	76977			

图78 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1153-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:34:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	154290	32.929	29844	2655	1.135	--
2	2.214	314265	67.071	45814	2405	1.089	2.961
总计		468555	100.000	75658			

图79 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1154-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:37:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	160902	33.559	31116	2656	1.135	--
2	2.213	318562	66.441	46513	2410	1.089	2.963
总计		479465	100.000	77629			

图80 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1155-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/15 15:41:11

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:37

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	170807	34.930	32948	2652	1.136	--
2	2.212	318191	65.070	46175	2383	1.089	2.950
总计		488998	100.000	79124			

图81 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1156-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:44:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	157777	33.426	30418	2652	1.136	--
2	2.212	314238	66.574	45620	2381	1.090	2.950
总计		472015	100.000	76038			

图82 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1157-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:48:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	163295	35.029	31474	2647	1.138	--
2	2.212	302876	64.971	44057	2389	1.088	2.953
总计		466171	100.000	75531			

图83 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30℃ 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1158-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/01/15 15:51:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	169264	34.607	32652	2653	1.134	--
2	2.212	319840	65.393	46587	2399	1.088	2.956
总计		489103	100.000	79238			

图84 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1159-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:54:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	166107	34.574	32006	2650	1.136	--
2	2.212	314338	65.426	45766	2395	1.087	2.955
总计		480445	100.000	77772			

图85 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1160-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/15 15:58:21

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:50

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	170115	34.857	32808	2653	1.135	--
2	2.212	317920	65.143	46428	2409	1.088	2.962
总计		488035	100.000	79237			

图86 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1161-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:01:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	174205	35.714	33602	2649	1.135	--
2	2.212	313568	64.286	45526	2382	1.088	2.945
总计		487772	100.000	79128			

图87 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1162-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:05:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	170316	35.048	32795	2650	1.136	--
2	2.211	315641	64.952	45737	2373	1.089	2.942
总计		485957	100.000	78532			

图88 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30℃ 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1163-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/01/15 16:08:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2025/01/16 09:28:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	173314	35.799	33420	2652	1.135	--
2	2.212	310813	64.201	45234	2394	1.088	2.952
总计		484126	100.000	78654			

图89 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1164-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:12:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175549	35.339	33882	2653	1.136	--
2	2.211	321209	64.661	46801	2403	1.088	2.953
总计		496758	100.000	80683			

图90 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1165-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:15:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	177055	35.462	34200	2657	1.134	--
2	2.211	322219	64.538	46922	2401	1.088	2.952
总计		499274	100.000	81122			

图91 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1166-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:18:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	178848	35.568	34547	2658	1.135	--
2	2.211	323988	64.432	47228	2402	1.088	2.954
总计		502835	100.000	81775			

图92 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1167-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:22:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	178252	36.006	34427	2656	1.135	--
2	2.211	316813	63.994	45975	2380	1.089	2.941
总计		495065	100.000	80402			

图93 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1168-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:25:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175257	35.679	33842	2656	1.135	--
2	2.211	315951	64.321	45900	2388	1.089	2.944
总计		491209	100.000	79742			

图94 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1169-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:29:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	172493	36.116	33310	2655	1.133	--
2	2.211	305121	63.884	44481	2406	1.088	2.954
总计		477613	100.000	77791			

图95 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1170-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:32:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175844	35.446	33959	2657	1.135	--
2	2.211	320251	64.554	46710	2409	1.088	2.954
总计		496095	100.000	80669			

图96 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1171-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:36:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	178542	35.756	34433	2650	1.135	--
2	2.210	320790	64.244	46603	2391	1.088	2.944
总计		499332	100.000	81035			

图97 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1172-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:39:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	179644	35.800	34668	2652	1.134	--
2	2.210	322157	64.200	46896	2399	1.089	2.948
总计		501801	100.000	81564			

图98 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1173-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:43:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175945	36.056	33938	2649	1.135	--
2	2.211	312037	63.944	45275	2383	1.088	2.937
总计		487982	100.000	79214			

图99 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1174-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 16:46:31
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	172379	35.799	33459	2677	1.133	--
2	2.211	309139	64.201	45305	2430	1.088	2.962
总计		481518	100.000	78765			

图100 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1175-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 16:49:58
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	173998	36.172	33545	2649	1.134	--
2	2.210	307030	63.828	44616	2392	1.088	2.942
总计		481028	100.000	78161			

图101 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1176-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 16:53:24
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	173372	35.404	33485	2651	1.134	--
2	2.211	316328	64.596	46109	2405	1.088	2.948
总计		489700	100.000	79593			

图102 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1177-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 16:56:51
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	175188	35.844	33734	2644	1.136	--
2	2.210	313562	64.156	45639	2402	1.088	2.946
总计		488750	100.000	79374			

图103 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1178-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 17:00:17
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	178591	35.821	34515	2657	1.134	--
2	2.211	319976	64.179	46691	2411	1.087	2.949
总计		498568	100.000	81205			

图104 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1179-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 17:03:44
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	171595	36.058	33790	2773	1.127	--
2	2.215	304296	63.942	45795	2574	1.084	3.032
总计		475891	100.000	79585			

图105 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1180-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:07:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	175300	35.865	33862	2662	1.136	--
2	2.209	313473	64.135	45460	2388	1.090	2.942
总计		488773	100.000	79322			




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1181-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 17:10:38
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	174913	36.195	33802	2663	1.135	--
2	2.210	308339	63.805	44890	2403	1.089	2.951
总计		483252	100.000	78692			

图107 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1182-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 17:14:04
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	171954	35.494	33126	2645	1.135	--
2	2.211	312503	64.506	45594	2411	1.088	2.955
总计		484457	100.000	78720			

图108 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1183-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:17:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	176075	35.804	34072	2666	1.132	--
2	2.210	315705	64.196	46057	2411	1.088	2.959
总计		491780	100.000	80129			

图109 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1184-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 17:20:57
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:29:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	180790	35.835	35022	2676	1.134	--
2	2.211	323723	64.165	47295	2417	1.088	2.962
总计		504512	100.000	82317			

图110 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1185-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:24:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	175393	36.636	30837	2156	1.163	--
2	2.206	303359	63.364	44692	2452	1.102	2.919
总计		478752	100.000	75529			

图111 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1186-2 - zzp-2023121421p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:27:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:29:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	175436	36.645	30833	2154	1.164	--
2	2.206	303307	63.355	44684	2452	1.102	2.919
总计		478743	100.000	75517			

图112 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121421批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2



SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1187-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/15 17:31:17

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2025/01/16 09:29:58

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图113 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1188-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:34:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	175461	36.673	30843	2158	1.164	--
2	2.207	302990	63.327	44601	2457	1.101	2.924
总计		478451	100.000	75444			

图114 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1189-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:38:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	175314	36.652	30861	2159	1.162	--
2	2.207	303009	63.348	44608	2460	1.101	2.926
总计		478323	100.000	75469			

图115 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1190-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:41:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	175504	36.698	30834	2153	1.162	--
2	2.207	302736	63.302	44608	2459	1.102	2.927
总计		478239	100.000	75442			

图116 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1191-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/15 17:44:58

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:09

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	175521	36.678	30895	2163	1.163	--
2	2.208	303025	63.322	44616	2463	1.100	2.930
总计		478546	100.000	75510			

图117 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1192-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:48:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	175565	36.703	30881	2159	1.161	--
2	2.208	302775	63.297	44567	2465	1.100	2.930
总计		478339	100.000	75448			

图118 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1193-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:51:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	29726	13.262	5756	2665	1.141	--
2	2.213	194409	86.738	28603	2443	1.089	2.983
总计		224135	100.000	34359			

图119 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1194-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:55:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	50054	23.580	9726	2678	1.136	--
2	2.214	162219	76.420	23879	2460	1.097	2.992
总计		212273	100.000	33605			

图120 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1195-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 17:58:37
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	55889	22.192	10845	2674	1.136	--
2	2.213	195951	77.808	28838	2445	1.090	2.983
总计		251840	100.000	39682			

图121 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1196-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:02:02
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	46635	18.105	9054	2661	1.135	--
2	2.213	210946	81.895	30919	2427	1.090	2.972
总计		257581	100.000	39973			

图122 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1197-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:05:27
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	51965	28.727	10086	2668	1.137	--
2	2.213	128927	71.273	18999	2446	1.090	2.983
总计		180892	100.000	29085			

图123 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1198-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:08:51
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	40849	14.467	7946	2680	1.136	--
2	2.213	241510	85.533	35617	2460	1.088	2.991
总计		282359	100.000	43563			

图124 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1199-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:12:16
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	110870	27.605	21440	2664	1.137	--
2	2.212	290755	72.395	42442	2409	1.090	2.966
总计		401625	100.000	63882			

图125 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1200-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:15:40
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	129670	32.837	25043	2659	1.136	--
2	2.212	265214	67.163	38790	2419	1.091	2.970
总计		394884	100.000	63833			


图126 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1201-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:19:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	115556	28.121	22360	2667	1.137	--
2	2.212	295372	71.879	43158	2410	1.090	2.965
总计		410928	100.000	65518			

图127 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1202-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:22:29
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	118025	28.060	22817	2663	1.137	--
2	2.212	302591	71.940	44226	2412	1.090	2.966
总计		420615	100.000	67043			

图128 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1203-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:25:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	113908	29.133	22007	2664	1.134	--
2	2.212	277090	70.867	40483	2410	1.090	2.964
总计		390997	100.000	62490			

图129 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1204-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:29:18
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	127108	29.195	24681	2677	1.135	--
2	2.212	308261	70.805	45152	2427	1.089	2.972
总计		435369	100.000	69833			

图130 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1205-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:32:42
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	149937	33.037	29000	2666	1.135	--
2	2.212	303908	66.963	44452	2417	1.089	2.967
总计		453844	100.000	73452			

图131 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1206-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:36:07
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	161324	35.641	31202	2667	1.135	--
2	2.212	291306	64.359	42541	2409	1.090	2.962
总计		452629	100.000	73743			

图132 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1207-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:39:32
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	144127	31.490	27874	2663	1.134	--
2	2.212	313568	68.510	45736	2402	1.090	2.959
总计		457695	100.000	73610			

图133 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1208-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:42:57
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	150627	32.213	29069	2657	1.136	--
2	2.211	316964	67.787	46164	2400	1.090	2.958
总计		467591	100.000	75233			

图134 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1209-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:46:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:30:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	140554	31.783	27188	2667	1.135	--
2	2.211	301678	68.217	44074	2413	1.088	2.964
总计		442233	100.000	71262			

图135 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1210-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:49:46
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:30:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	158342	33.397	30662	2673	1.134	--
2	2.212	315779	66.603	46280	2427	1.089	2.971
总计		474120	100.000	76942			

图136 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1211-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 18:53:10
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	168017	34.915	32559	2669	1.135	--
2	2.211	313204	65.085	45648	2402	1.090	2.957
总计		481221	100.000	78207			

图137 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1212-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:56:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	171778	36.112	33275	2670	1.135	--
2	2.212	303906	63.888	44396	2409	1.091	2.961
总计		475683	100.000	77672			

图138 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1213-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:59:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	164391	33.817	31867	2671	1.134	--
2	2.211	321726	66.183	46941	2406	1.090	2.958
总计		486117	100.000	78808			

图139 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1214-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:03:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	170697	34.346	33062	2673	1.134	--
2	2.211	326298	65.654	47546	2403	1.089	2.956
总计		496995	100.000	80609			

图140 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1215-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:06:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	158532	33.410	30766	2679	1.136	--
2	2.211	315978	66.590	46134	2411	1.089	2.961
总计		474510	100.000	76900			

图141 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1216-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 19:10:12
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	172647	34.560	33488	2680	1.134	--
2	2.211	326910	65.440	47742	2416	1.089	2.964
总计		499557	100.000	81230			

图142 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1217-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 19:13:36
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	172960	36.066	33447	2667	1.134	--
2	2.212	306600	63.934	44842	2415	1.088	2.963
总计		479559	100.000	78289			

图143 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1218-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:17:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	176326	36.166	34212	2680	1.133	--
2	2.211	311217	63.834	45595	2430	1.089	2.969
总计		487543	100.000	79807			

图144 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1219-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:20:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	176330	35.288	34122	2669	1.133	--
2	2.210	323362	64.712	47107	2405	1.089	2.956
总计		499692	100.000	81229			

图145 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1220-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 19:23:50
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	176615	35.435	34117	2664	1.136	--
2	2.210	321799	64.565	46843	2405	1.089	2.955
总计		498414	100.000	80960			

图146 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1221-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:27:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	171440	35.215	33288	2684	1.132	--
2	2.211	315401	64.785	46294	2440	1.088	2.973
总计		486841	100.000	79582			

图147 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1222-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 19:30:38
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	173134	35.356	33551	2669	1.134	--
2	2.211	316546	64.644	46345	2427	1.088	2.964
总计		489680	100.000	79896			

图148 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1223-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:34:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	178196	36.400	34483	2675	1.134	--
2	2.210	311351	63.600	45468	2417	1.090	2.961
总计		489548	100.000	79952			

图149 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1224-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 19:37:26
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	175849	36.051	34008	2667	1.134	--
2	2.210	311927	63.949	45541	2417	1.090	2.960
总计		487777	100.000	79549			

图150 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1225-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:40:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	178934	35.704	34710	2681	1.133	--
2	2.210	322223	64.296	47137	2427	1.089	2.965
总计		501157	100.000	81847			

图151 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1226-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 19:44:14
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	180550	35.726	34951	2673	1.133	--
2	2.209	324831	64.274	47282	2407	1.090	2.953
总计		505381	100.000	82233			

图152 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1227-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 19:47:38
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	176335	35.881	34168	2679	1.134	--
2	2.210	315107	64.119	45948	2410	1.089	2.956
总计		491442	100.000	80117			

图153 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1228-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 19:51:02
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:31:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	178224	35.644	34582	2682	1.133	--
2	2.210	321785	64.356	47048	2425	1.089	2.963
总计		500009	100.000	81631			

图154 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1229-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:54:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	177317	36.449	34190	2662	1.135	--
2	2.208	309161	63.551	45077	2405	1.089	2.953
总计		486478	100.000	79267			

图155 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1230-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:57:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	175349	36.001	33793	2666	1.134	--
2	2.209	311717	63.999	45497	2411	1.090	2.958
总计		487066	100.000	79291			

图156 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1231-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-25 版本号: 6.115
进样体积: 50 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2025/01/15 20:01:14 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	178306	35.826	34498	2675	1.134	--
2	2.209	319397	64.174	46563	2413	1.089	2.956
总计		497703	100.000	81060			


图157 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1232-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:04:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	179076	35.801	34655	2674	1.133	--
2	2.209	321128	64.199	46792	2408	1.090	2.953
总计		500204	100.000	81448			

图158 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1233-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:08:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:31:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	174609	36.023	33798	2670	1.134	--
2	2.209	310113	63.977	45196	2413	1.089	2.955
总计		484722	100.000	78993			

图159 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1234-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 20:11:25
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:32:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	174755	35.725	33756	2667	1.134	--
2	2.209	314408	64.275	45832	2413	1.089	2.955
总计		489164	100.000	79588			

图160 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1235-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 20:14:50
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:32:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	175404	36.416	33786	2661	1.135	--
2	2.208	306261	63.584	44631	2400	1.090	2.949
总计		481665	100.000	78417			

图161 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1236-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 20:18:16
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:32:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	176654	35.789	34107	2666	1.135	--
2	2.208	316941	64.211	46272	2410	1.089	2.953
总计		493595	100.000	80379			

图162 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1237-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 20:21:40
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:32:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	180876	35.843	35054	2678	1.133	--
2	2.209	323760	64.157	47154	2402	1.090	2.948
总计		504636	100.000	82208			

图163 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1238-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 20:25:05
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:32:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	178022	35.855	34465	2673	1.133	--
2	2.209	318481	64.145	46468	2413	1.089	2.954
总计		496503	100.000	80933			

图164 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1239-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 20:28:30
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:32:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	177266	36.075	34312	2676	1.133	--
2	2.208	314114	63.925	45824	2406	1.090	2.949
总计		491381	100.000	80136			

图165 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1240-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/15 20:31:54
处理时间 (V2) : 2025/01/16 09:32:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长: 232nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	174180	35.862	33732	2678	1.133	--
2	2.209	311519	64.138	45617	2435	1.088	2.964
总计		485699	100.000	79349			

图166 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1241-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:35:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:32:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	175677	36.628	31124	2186	1.161	--
2	2.205	303946	63.372	45095	2483	1.099	2.931
总计		479623	100.000	76219			

图167 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 31-54/10-1242-2 - zzp-2023121621p-rcqx-1-pH6.8+0.2twjz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20250115-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:38:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/16 09:32:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	176800	36.658	31293	2183	1.160	--
2	2.206	305492	63.342	45286	2480	1.100	2.930
总计		482293	100.000	76580			

图168 依折麦布阿托伐他汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023121621批-pH6.8(内含0.2%Tween)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2