




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-501-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:19:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:42:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-502-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:23:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:42:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	378153	100.000	53439	2321	1.185	--
总计		378153	100.000	53439			

图2 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-503-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:26:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:42:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	378120	100.000	53447	2324	1.186	--
总计		378120	100.000	53447			

图3 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-504-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:30:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:42:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	378350	100.000	53463	2323	1.185	--
总计		378350	100.000	53463			

图4 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-505-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:33:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:42:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	378429	100.000	53472	2323	1.186	--
总计		378429	100.000	53472			

图5 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-506-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:36:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	378212	100.000	53462	2324	1.186	--
总计		378212	100.000	53462			

图6 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-507-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:40:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	221963	100.000	34673	2980	1.183	--
总计		221963	100.000	34673			

图7 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-508-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:43:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	213909	100.000	33419	2980	1.183	--
总计		213909	100.000	33419			

图8 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-509-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:46:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	216145	100.000	33782	2974	1.183	--
总计		216145	100.000	33782			

图9 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-510-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:50:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	217576	100.000	33954	2980	1.184	--
总计		217576	100.000	33954			

图10 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-511-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:53:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	219082	100.000	34135	2971	1.184	--
总计		219082	100.000	34135			

图11 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-512-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:57:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	214116	100.000	33452	2981	1.184	--
总计		214116	100.000	33452			

图12 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-513-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:00:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	304923	100.000	47777	2984	1.181	--
总计		304923	100.000	47777			

图13 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-514-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:03:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	290979	100.000	45434	2985	1.182	--
总计		290979	100.000	45434			

图14 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-515-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:07:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	289228	100.000	45147	2987	1.182	--
总计		289228	100.000	45147			

图15 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-516-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:10:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	284623	100.000	44444	2984	1.182	--
总计		284623	100.000	44444			

图16 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-517-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:14:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	281607	100.000	43956	2984	1.182	--
总计		281607	100.000	43956			

图17 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-518-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:17:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	286932	100.000	44816	2988	1.181	--
总计		286932	100.000	44816			

图18 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-519-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:20:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	333683	100.000	52230	2990	1.181	--
总计		333683	100.000	52230			

图19 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-520-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:24:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	323957	100.000	50713	2991	1.180	--
总计		323957	100.000	50713			

图20 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-521-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:27:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	324535	100.000	50718	2989	1.181	--
总计		324535	100.000	50718			

图21 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-522-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:30:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	322491	100.000	50410	2989	1.181	--
总计		322491	100.000	50410			

图22 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-523-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:34:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	312508	100.000	48839	2989	1.181	--
总计		312508	100.000	48839			

图23 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-524-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:37:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	319002	100.000	49954	2992	1.182	--
总计		319002	100.000	49954			

图24 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-525-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:41:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	343939	100.000	53928	2987	1.180	--
总计		343939	100.000	53928			

图25 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-526-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:44:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	337110	100.000	52751	2990	1.181	--
总计		337110	100.000	52751			

图26 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-527-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:47:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:43:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	338633	100.000	53044	2995	1.180	--
总计		338633	100.000	53044			

图27 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-528-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:51:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:43:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	341059	100.000	53387	2993	1.181	--
总计		341059	100.000	53387			

图28 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-529-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:54:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	326897	100.000	51127	2989	1.181	--
总计		326897	100.000	51127			

图29 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-530-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:57:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	331769	100.000	51967	2994	1.180	--
总计		331769	100.000	51967			

图30 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-531-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:01:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	353899	100.000	55477	2988	1.180	--
总计		353899	100.000	55477			

图31 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-532-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:04:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:44:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	346729	100.000	54332	2992	1.180	--
总计		346729	100.000	54332			

图32 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-533-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:08:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	350055	100.000	54848	2992	1.180	--
总计		350055	100.000	54848			

图33 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-534-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:11:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	357892	100.000	56047	2993	1.180	--
总计		357892	100.000	56047			

图34 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-535-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:14:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	339538	100.000	53107	2991	1.180	--
总计		339538	100.000	53107			

图35 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-536-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:18:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	343253	100.000	53656	2991	1.180	--
总计		343253	100.000	53656			

图36 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-537-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:21:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	378133	100.000	59319	2993	1.179	--
总计		378133	100.000	59319			

图37 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-538-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:25:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:44:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	373249	100.000	58557	2991	1.179	--
总计		373249	100.000	58557			

图38 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-539-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:28:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	380519	100.000	59720	2994	1.179	--
总计		380519	100.000	59720			

图39 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-540-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:31:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	396149	100.000	62163	2990	1.179	--
总计		396149	100.000	62163			

图40 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-541-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:35:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:44:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	364538	100.000	57153	2988	1.179	--
总计		364538	100.000	57153			

图41 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-542-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:38:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	376012	100.000	58998	2988	1.179	--
总计		376012	100.000	58998			

图42 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-543-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:41:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	377727	100.000	53410	2322	1.184	--
总计		377727	100.000	53410			

图43 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-544-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:45:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	377640	100.000	53387	2322	1.183	--
总计		377640	100.000	53387			

图44 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-545-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:48:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:44:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-546-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:52:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	378351	100.000	53528	2325	1.183	--
总计		378351	100.000	53528			

图46 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-547-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:55:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	377991	100.000	53520	2331	1.184	--
总计		377991	100.000	53520			

图47 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-548-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:59:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	376611	100.000	53287	2327	1.184	--
总计		376611	100.000	53287			

图48 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-549-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:02:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	377919	100.000	53500	2329	1.184	--
总计		377919	100.000	53500			

图49 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-550-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:05:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	377351	100.000	53423	2332	1.184	--
总计		377351	100.000	53423			

图50 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-551-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:09:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:44:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	251558	100.000	39325	2984	1.181	--
总计		251558	100.000	39325			

图51 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-552-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:12:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:45:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	257987	100.000	40375	2979	1.181	--
总计		257987	100.000	40375			

图52 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-553-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:16:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	243483	100.000	38010	2980	1.183	--
总计		243483	100.000	38010			

图53 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-554-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:19:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	247362	100.000	38671	2984	1.182	--
总计		247362	100.000	38671			

图54 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-555-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:22:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	255120	100.000	39731	2986	1.182	--
总计		255120	100.000	39731			

图55 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-556-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:26:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	249175	100.000	38854	2989	1.181	--
总计		249175	100.000	38854			

图56 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-557-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:29:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	328712	100.000	51308	2992	1.180	--
总计		328712	100.000	51308			

图57 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-558-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:33:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	325622	100.000	50876	2997	1.180	--
总计		325622	100.000	50876			

图58 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-559-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:36:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	315325	100.000	49230	2996	1.180	--
总计		315325	100.000	49230			

图59 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-560-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:39:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	318425	100.000	49693	2993	1.180	--
总计		318425	100.000	49693			

图60 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-561-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:43:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	329782	100.000	51456	2994	1.180	--
总计		329782	100.000	51456			

图61 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-562-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:46:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:45:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	318117	100.000	49682	2995	1.180	--
总计		318117	100.000	49682			

图62 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-563-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:50:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	350555	100.000	54731	2997	1.179	--
总计		350555	100.000	54731			

图63 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-564-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:53:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:45:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	348697	100.000	54548	2999	1.178	--
总计		348697	100.000	54548			

图64 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-565-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:56:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	341460	100.000	53342	2998	1.180	--
总计		341460	100.000	53342			

图65 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-566-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:00:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	344773	100.000	53902	2999	1.180	--
总计		344773	100.000	53902			

图66 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-567-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:03:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	359316	100.000	56133	2998	1.179	--
总计		359316	100.000	56133			

图67 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-568-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:07:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	343676	100.000	53750	3000	1.179	--
总计		343676	100.000	53750			

图68 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-569-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:10:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	359224	100.000	56147	2999	1.179	--
总计		359224	100.000	56147			

图69 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-570-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:13:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	358407	100.000	55950	2998	1.179	--
总计		358407	100.000	55950			

图70 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-571-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:17:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	350194	100.000	54664	2996	1.179	--
总计		350194	100.000	54664			

图71 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-572-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:20:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	354884	100.000	55456	2999	1.179	--
总计		354884	100.000	55456			

图72 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-573-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:24:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	368984	100.000	57614	2997	1.179	--
总计		368984	100.000	57614			

图73 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-574-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:27:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:45:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	353518	100.000	55281	3001	1.179	--
总计		353518	100.000	55281			

图74 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-575-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:30:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	366444	100.000	57242	2998	1.179	--
总计		366444	100.000	57242			

图75 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-576-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:34:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	362894	100.000	56812	3002	1.178	--
总计		362894	100.000	56812			

图76 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-577-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:37:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	357171	100.000	56098	3016	1.177	--
总计		357171	100.000	56098			

图77 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-578-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:41:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	362808	100.000	56833	3001	1.178	--
总计		362808	100.000	56833			

图78 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-579-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:44:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	378550	100.000	59288	3003	1.178	--
总计		378550	100.000	59288			

图79 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-580-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:47:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	360474	100.000	56488	3003	1.178	--
总计		360474	100.000	56488			

图80 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-581-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:51:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:46:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	380329	100.000	59714	3016	1.176	--
总计		380329	100.000	59714			

图81 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-582-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:54:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	373522	100.000	58427	3001	1.178	--
总计		373522	100.000	58427			

图82 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-583-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:58:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	365952	100.000	57337	3002	1.178	--
总计		365952	100.000	57337			

图83 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-584-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:01:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:46:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	373907	100.000	58632	3005	1.177	--
总计		373907	100.000	58632			

图84 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-585-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:04:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:46:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	383641	100.000	60194	3008	1.178	--
总计		383641	100.000	60194			

图85 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-586-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:08:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	367702	100.000	57639	3004	1.178	--
总计		367702	100.000	57639			

图86 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-587-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:11:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	379039	100.000	53654	2347	1.182	--
总计		379039	100.000	53654			

图87 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-588-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:15:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	379018	100.000	53653	2345	1.182	--
总计		379018	100.000	53653			

图88 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-589-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:18:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:46:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2024122121批-均一性1-pH4.5介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-590-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:21:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	378721	100.000	53487	2341	1.182	--
总计		378721	100.000	53487			

图90 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-591-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:25:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	378754	100.000	53524	2342	1.182	--
总计		378754	100.000	53524			

图91 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-592-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:28:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	378852	100.000	53545	2344	1.182	--
总计		378852	100.000	53545			

图92 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-593-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:32:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	378991	100.000	53571	2343	1.182	--
总计		378991	100.000	53571			

图93 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-594-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:35:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	378678	100.000	53559	2344	1.181	--
总计		378678	100.000	53559			

图94 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-595-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:38:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	280039	100.000	43814	2995	1.179	--
总计		280039	100.000	43814			

图95 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-596-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:42:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	283834	100.000	44462	3001	1.178	--
总计		283834	100.000	44462			

图96 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-597-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:45:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:46:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	281620	100.000	44092	2996	1.179	--
总计		281620	100.000	44092			

图97 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-598-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:49:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	281020	100.000	44020	3000	1.179	--
总计		281020	100.000	44020			

图98 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-599-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:52:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	284516	100.000	44552	2997	1.179	--
总计		284516	100.000	44552			

图99 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-600-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:55:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	282263	100.000	44167	2997	1.179	--
总计		282263	100.000	44167			

图100 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-601-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:59:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	350091	100.000	54836	3002	1.178	--
总计		350091	100.000	54836			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-602-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:02:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	357541	100.000	56004	3001	1.178	--
总计		357541	100.000	56004			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-603-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:05:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	350005	100.000	54815	3000	1.178	--
总计		350005	100.000	54815			

图103 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-604-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:09:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:47:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	349848	100.000	54812	3001	1.177	--
总计		349848	100.000	54812			

图104 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-605-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:12:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	358421	100.000	56155	3001	1.177	--
总计		358421	100.000	56155			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-606-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:15:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:47:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	354580	100.000	55561	3002	1.178	--
总计		354580	100.000	55561			

图106 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-607-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:19:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	370877	100.000	58170	3008	1.177	--
总计		370877	100.000	58170			

图107 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-608-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:22:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	381112	100.000	59751	3004	1.177	--
总计		381112	100.000	59751			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-609-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:26:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:47:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	373295	100.000	58511	3004	1.178	--
总计		373295	100.000	58511			

图109 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-610-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:29:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	374242	100.000	58662	3004	1.177	--
总计		374242	100.000	58662			

图110 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-611-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:32:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	380511	100.000	59664	3004	1.177	--
总计		380511	100.000	59664			

图111 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-612-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:36:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	374022	100.000	58662	3007	1.177	--
总计		374022	100.000	58662			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-613-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:39:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	376295	100.000	59031	3008	1.177	--
总计		376295	100.000	59031			

图113 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-614-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:43:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:47:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	390739	100.000	61384	3013	1.176	--
总计		390739	100.000	61384			

图114 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-615-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:46:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	378282	100.000	59313	3007	1.177	--
总计		378282	100.000	59313			

图115 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-616-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:49:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	384091	100.000	60259	3009	1.177	--
总计		384091	100.000	60259			

图116 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-617-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:53:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	390200	100.000	61203	3005	1.177	--
总计		390200	100.000	61203			

图117 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-618-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:56:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	383784	100.000	60216	3006	1.177	--
总计		383784	100.000	60216			

图118 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-619-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:59:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:47:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	378676	100.000	59392	3006	1.177	--
总计		378676	100.000	59392			

图119 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-620-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:03:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	390817	100.000	61301	3007	1.176	--
总计		390817	100.000	61301			

图120 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-621-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:06:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	381842	100.000	59902	3008	1.177	--
总计		381842	100.000	59902			

图121 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-622-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:09:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	382093	100.000	59916	3006	1.176	--
总计		382093	100.000	59916			

图122 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-623-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:13:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:48:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	387739	100.000	60795	3003	1.177	--
总计		387739	100.000	60795			

图123 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-624-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:16:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:48:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	384511	100.000	60319	3005	1.177	--
总计		384511	100.000	60319			

图124 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-625-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:20:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	380208	100.000	59633	3009	1.177	--
总计		380208	100.000	59633			

图125 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-626-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:23:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	393837	100.000	61723	3007	1.177	--
总计		393837	100.000	61723			

图126 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-627-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:26:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	383131	100.000	60086	3009	1.177	--
总计		383131	100.000	60086			

图127 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-628-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:30:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	381966	100.000	59872	3010	1.177	--
总计		381966	100.000	59872			

图128 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-629-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:33:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	392067	100.000	61451	3012	1.177	--
总计		392067	100.000	61451			

图129 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-630-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:36:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:48:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	386002	100.000	60491	3013	1.177	--
总计		386002	100.000	60491			

图130 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-631-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:40:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	380197	100.000	53817	2353	1.180	--
总计		380197	100.000	53817			

图131 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-632-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:43:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	379857	100.000	53747	2354	1.180	--
总计		379857	100.000	53747			

图132 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-633-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:47:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图133 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-634-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:50:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	378742	100.000	53600	2354	1.180	--
总计		378742	100.000	53600			

图134 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-635-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:53:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	378831	100.000	53613	2355	1.179	--
总计		378831	100.000	53613			

图135 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-636-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:57:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	378961	100.000	53635	2355	1.180	--
总计		378961	100.000	53635			

图136 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-637-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:00:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	378750	100.000	53489	2360	1.180	--
总计		378750	100.000	53489			

图137 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-638-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:04:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	378752	100.000	53541	2362	1.180	--
总计		378752	100.000	53541			

图138 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-639-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:07:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	280446	100.000	43783	3011	1.178	--
总计		280446	100.000	43783			

图139 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-640-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:10:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	283064	100.000	44184	3009	1.178	--
总计		283064	100.000	44184			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-641-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:14:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:48:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	285757	100.000	44569	3010	1.178	--
总计		285757	100.000	44569			

图141 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-642-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:17:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:48:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	286195	100.000	44697	3013	1.178	--
总计		286195	100.000	44697			

图142 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-643-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:21:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	285019	100.000	44525	3015	1.178	--
总计		285019	100.000	44525			

图143 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-644-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:24:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	274022	100.000	42824	3008	1.177	--
总计		274022	100.000	42824			

图144 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-645-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:27:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:49:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	349368	100.000	54600	3014	1.177	--
总计		349368	100.000	54600			

图145 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-646-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:31:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:49:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	352655	100.000	55172	3017	1.176	--
总计		352655	100.000	55172			

图146 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-647-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:34:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	361302	100.000	56552	3022	1.176	--
总计		361302	100.000	56552			

图147 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-648-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:37:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:49:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	353681	100.000	55322	3015	1.177	--
总计		353681	100.000	55322			

图148 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-649-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:41:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	355568	100.000	55632	3017	1.177	--
总计		355568	100.000	55632			

图149 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-650-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:44:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	349399	100.000	54653	3015	1.177	--
总计		349399	100.000	54653			

图150 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-651-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:48:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	368816	100.000	57730	3017	1.176	--
总计		368816	100.000	57730			

图151 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-652-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:51:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	373468	100.000	58419	3016	1.177	--
总计		373468	100.000	58419			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-653-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:54:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	371669	100.000	58205	3020	1.176	--
总计		371669	100.000	58205			

图153 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-654-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:58:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	372694	100.000	58393	3023	1.176	--
总计		372694	100.000	58393			

图154 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-655-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:01:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	373343	100.000	58507	3022	1.176	--
总计		373343	100.000	58507			

图155 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-656-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:05:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	377339	100.000	59131	3022	1.176	--
总计		377339	100.000	59131			

图156 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-657-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:08:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	372827	100.000	58395	3021	1.176	--
总计		372827	100.000	58395			

图157 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-658-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:11:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	379459	100.000	59442	3022	1.175	--
总计		379459	100.000	59442			

图158 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-659-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:15:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	374367	100.000	58664	3023	1.175	--
总计		374367	100.000	58664			

图159 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-660-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:18:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	388673	100.000	60879	3020	1.176	--
总计		388673	100.000	60879			

图160 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-661-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:22:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	379961	100.000	59567	3023	1.176	--
总计		379961	100.000	59567			

图161 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-662-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:25:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	376267	100.000	58979	3026	1.176	--
总计		376267	100.000	58979			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-663-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:28:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	377250	100.000	59105	3021	1.176	--
总计		377250	100.000	59105			

图163 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-664-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:32:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	380609	100.000	59642	3022	1.176	--
总计		380609	100.000	59642			

图164 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-665-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:35:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:49:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	376899	100.000	59040	3020	1.176	--
总计		376899	100.000	59040			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-666-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:39:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	381166	100.000	59735	3025	1.175	--
总计		381166	100.000	59735			

图166 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-667-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:42:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	380457	100.000	59624	3026	1.175	--
总计		380457	100.000	59624			

图167 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-668-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:45:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:50:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	376069	100.000	58952	3026	1.176	--
总计		376069	100.000	58952			

图168 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-669-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:49:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:50:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	381229	100.000	59690	3025	1.176	--
总计		381229	100.000	59690			

图169 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-670-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:52:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:50:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	384066	100.000	60171	3025	1.176	--
总计		384066	100.000	60171			

图170 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-671-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:56:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:50:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	381024	100.000	59686	3024	1.176	--
总计		381024	100.000	59686			

图171 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-672-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:59:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:50:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	383418	100.000	60087	3026	1.175	--
总计		383418	100.000	60087			

图172 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-673-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:02:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:50:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	384070	100.000	60173	3025	1.176	--
总计		384070	100.000	60173			

图173 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-674-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:06:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	380556	100.000	59618	3025	1.176	--
总计		380556	100.000	59618			

图174 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-675-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:09:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	379475	100.000	53877	2378	1.178	--
总计		379475	100.000	53877			

图175 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-676-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:13:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	379668	100.000	53867	2374	1.178	--
总计		379668	100.000	53867			

图176 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-677-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:16:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:50:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图177 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-678-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:19:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	379085	100.000	53779	2373	1.178	--
总计		379085	100.000	53779			

图178 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-679-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:23:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	379044	100.000	53778	2373	1.177	--
总计		379044	100.000	53778			

图179 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-680-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:26:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	378960	100.000	53706	2370	1.177	--
总计		378960	100.000	53706			

图180 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-681-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:30:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	377719	100.000	53612	2376	1.178	--
总计		377719	100.000	53612			

图181 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-682-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:33:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	377386	100.000	53503	2371	1.177	--
总计		377386	100.000	53503			

图182 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-683-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:36:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	277846	100.000	43444	3020	1.177	--
总计		277846	100.000	43444			

图183 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-684-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:40:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	278033	100.000	43405	3020	1.178	--
总计		278033	100.000	43405			

图184 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-685-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:43:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	275156	100.000	42965	3022	1.177	--
总计		275156	100.000	42965			

图185 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-686-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:47:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	275237	100.000	42922	3021	1.178	--
总计		275237	100.000	42922			

图186 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-687-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:50:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:50:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	284357	100.000	44350	3024	1.178	--
总计		284357	100.000	44350			

图187 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-688-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:53:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	275043	100.000	42909	3022	1.177	--
总计		275043	100.000	42909			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-689-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:57:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	351402	100.000	54966	3024	1.176	--
总计		351402	100.000	54966			

图189 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-690-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:00:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	351378	100.000	54878	3026	1.176	--
总计		351378	100.000	54878			

图190 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-691-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:03:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	354093	100.000	55249	3025	1.177	--
总计		354093	100.000	55249			

图191 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-692-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:07:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	346956	100.000	54242	3025	1.176	--
总计		346956	100.000	54242			

图192 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-693-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:10:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	361103	100.000	56469	3026	1.176	--
总计		361103	100.000	56469			

图193 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-694-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:14:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:51:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	348126	100.000	54381	3026	1.176	--
总计		348126	100.000	54381			

图194 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-695-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:17:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	373080	100.000	58306	3023	1.176	--
总计		373080	100.000	58306			

图195 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-696-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:20:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	373684	100.000	58424	3027	1.176	--
总计		373684	100.000	58424			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-697-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:24:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	374972	100.000	58550	3027	1.176	--
总计		374972	100.000	58550			

图197 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-698-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:27:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	365779	100.000	57133	3026	1.176	--
总计		365779	100.000	57133			

图198 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-699-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:31:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	379711	100.000	59263	3027	1.176	--
总计		379711	100.000	59263			

图199 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-700-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:34:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	367741	100.000	57378	3029	1.176	--
总计		367741	100.000	57378			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-701-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:37:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	381273	100.000	59534	3028	1.176	--
总计		381273	100.000	59534			

图201 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-702-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:41:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	377784	100.000	58920	3028	1.176	--
总计		377784	100.000	58920			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-703-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:44:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	381266	100.000	59592	3027	1.176	--
总计		381266	100.000	59592			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-704-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:47:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	371672	100.000	57997	3029	1.176	--
总计		371672	100.000	57997			

图204 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-705-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:51:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	394741	100.000	61647	3030	1.175	--
总计		394741	100.000	61647			

图205 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-706-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:54:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	373705	100.000	58317	3028	1.176	--
总计		373705	100.000	58317			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-707-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:58:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	381863	100.000	59614	3028	1.176	--
总计		381863	100.000	59614			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-708-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:01:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	377961	100.000	58959	3031	1.176	--
总计		377961	100.000	58959			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-709-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:04:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:51:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	388423	100.000	60620	3031	1.175	--
总计		388423	100.000	60620			

图209 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-710-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:08:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:51:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	373048	100.000	58201	3030	1.176	--
总计		373048	100.000	58201			

图210 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-711-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:11:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	389683	100.000	60749	3031	1.176	--
总计		389683	100.000	60749			

图211 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-712-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:15:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	375657	100.000	58594	3029	1.176	--
总计		375657	100.000	58594			

图212 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-713-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:18:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	377381	100.000	58819	3031	1.176	--
总计		377381	100.000	58819			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-714-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:21:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	380017	100.000	59254	3030	1.175	--
总计		380017	100.000	59254			

图214 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-715-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:25:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	383511	100.000	59875	3028	1.176	--
总计		383511	100.000	59875			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-716-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:28:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	379154	100.000	59106	3029	1.176	--
总计		379154	100.000	59106			

图216 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-717-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:31:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:52:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	391008	100.000	60945	3029	1.175	--
总计		391008	100.000	60945			

图217 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-718-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:35:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	383756	100.000	59824	3029	1.175	--
总计		383756	100.000	59824			

图218 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-719-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:38:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	380988	100.000	53835	2379	1.177	--
总计		380988	100.000	53835			

图219 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-21/27-720-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:42:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:52:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	380399	100.000	53784	2380	1.177	--
总计		380399	100.000	53784			

图220 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2