




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-135-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:20:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:22:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-136-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:23:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:23:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	382816	100.000	51986	2202	1.203	--
总计		382816	100.000	51986			

图2 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-137-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:26:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	383210	100.000	51976	2201	1.202	--
总计		383210	100.000	51976			

图3 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-138-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:30:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	383090	100.000	51980	2204	1.204	--
总计		383090	100.000	51980			

图4 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-139-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:33:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	383216	100.000	51970	2203	1.206	--
总计		383216	100.000	51970			

图5 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-140-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:37:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	382816	100.000	51934	2202	1.204	--
总计		382816	100.000	51934			

图6 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-141-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:40:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	233689	100.000	36575	3103	1.168	--
总计		233689	100.000	36575			

图7 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-142-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:43:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:23:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	234404	100.000	36737	3104	1.168	--
总计		234404	100.000	36737			

图8 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-143-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:47:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	228581	100.000	35696	3099	1.170	--
总计		228581	100.000	35696			

图9 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-144-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:50:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:23:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	232668	100.000	36407	3102	1.167	--
总计		232668	100.000	36407			

图10 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-145-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 14:53:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	223821	100.000	34909	3098	1.170	--
总计		223821	100.000	34909			

图11 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-146-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 14:57:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:23:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	219675	100.000	34357	3104	1.168	--
总计		219675	100.000	34357			

图12 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-147-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:00:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	308007	100.000	48180	3104	1.166	--
总计		308007	100.000	48180			

图13 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-148-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:04:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	306988	100.000	48055	3103	1.167	--
总计		306988	100.000	48055			

图14 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-149-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:07:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	305809	100.000	47762	3100	1.166	--
总计		305809	100.000	47762			

图15 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-150-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:10:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	308849	100.000	48242	3100	1.167	--
总计		308849	100.000	48242			

图16 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-151-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:14:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	303394	100.000	47364	3101	1.169	--
总计		303394	100.000	47364			

图17 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-152-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:17:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	291831	100.000	45572	3102	1.165	--
总计		291831	100.000	45572			

图18 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-153-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:20:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:23:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	342624	100.000	53493	3099	1.165	--
总计		342624	100.000	53493			

图19 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-154-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:24:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	342182	100.000	53416	3100	1.166	--
总计		342182	100.000	53416			

图20 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-155-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:27:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	341925	100.000	53394	3098	1.164	--
总计		341925	100.000	53394			

图21 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-156-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:31:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:24:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	340276	100.000	53120	3099	1.165	--
总计		340276	100.000	53120			

图22 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-157-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:34:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	333814	100.000	52060	3096	1.165	--
总计		333814	100.000	52060			

图23 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-158-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:37:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	329690	100.000	51473	3096	1.165	--
总计		329690	100.000	51473			

图24 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-159-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:41:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	352688	100.000	55034	3095	1.165	--
总计		352688	100.000	55034			

图25 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-160-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:44:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	358807	100.000	56053	3097	1.164	--
总计		358807	100.000	56053			

图26 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-161-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:48:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	356637	100.000	55608	3091	1.164	--
总计		356637	100.000	55608			

图27 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-162-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:51:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	356068	100.000	55577	3095	1.164	--
总计		356068	100.000	55577			

图28 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-163-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 15:54:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:24:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	347498	100.000	54270	3094	1.164	--
总计		347498	100.000	54270			

图29 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-164-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 15:58:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	338300	100.000	52842	3098	1.162	--
总计		338300	100.000	52842			

图30 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-165-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:01:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:24:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	368263	100.000	57465	3095	1.162	--
总计		368263	100.000	57465			

图31 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-166-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:05:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	380602	100.000	59458	3094	1.162	--
总计		380602	100.000	59458			

图32 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-167-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:08:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	365351	100.000	57014	3089	1.163	--
总计		365351	100.000	57014			

图33 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-168-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:11:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	371761	100.000	58047	3092	1.162	--
总计		371761	100.000	58047			

图34 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-169-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:15:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	358521	100.000	55903	3091	1.161	--
总计		358521	100.000	55903			

图35 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-170-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:18:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	362381	100.000	56530	3091	1.162	--
总计		362381	100.000	56530			

图36 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-171-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:21:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	375514	100.000	58648	3093	1.161	--
总计		375514	100.000	58648			

图37 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-172-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:25:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	399111	100.000	62295	3091	1.161	--
总计		399111	100.000	62295			

图38 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-173-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:28:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:24:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	389354	100.000	60843	3091	1.159	--
总计		389354	100.000	60843			

图39 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-174-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:32:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:24:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	404893	100.000	63261	3093	1.161	--
总计		404893	100.000	63261			

图40 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-175-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:35:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	378279	100.000	59036	3092	1.160	--
总计		378279	100.000	59036			

图41 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-176-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:38:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:25:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	382291	100.000	59573	3091	1.162	--
总计		382291	100.000	59573			

图42 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-177-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:42:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	383352	100.000	51867	2196	1.198	--
总计		383352	100.000	51867			

图43 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-178-2 - cbzj-3001Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:45:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	382660	100.000	51831	2197	1.196	--
总计		382660	100.000	51831			

图44 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-3001A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-179-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 16:49:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:25:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-180-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:52:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	383105	100.000	51910	2198	1.196	--
总计		383105	100.000	51910			

图46 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-181-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:55:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	383356	100.000	51936	2197	1.197	--
总计		383356	100.000	51936			

图47 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-182-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 16:59:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	383323	100.000	51891	2196	1.195	--
总计		383323	100.000	51891			

图48 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-183-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:02:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	382975	100.000	51843	2194	1.196	--
总计		382975	100.000	51843			

图49 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-184-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:06:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	382397	100.000	51813	2196	1.195	--
总计		382397	100.000	51813			

图50 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-185-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:09:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	263607	100.000	41173	3087	1.157	--
总计		263607	100.000	41173			

图51 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-186-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:12:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	262069	100.000	40890	3086	1.159	--
总计		262069	100.000	40890			

图52 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-187-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:16:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	245610	100.000	38324	3081	1.157	--
总计		245610	100.000	38324			

图53 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-188-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:19:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:25:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	253903	100.000	39638	3084	1.159	--
总计		253903	100.000	39638			

图54 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-189-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:23:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	255104	100.000	39856	3087	1.157	--
总计		255104	100.000	39856			

图55 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-190-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:26:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:25:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	260173	100.000	40627	3083	1.156	--
总计		260173	100.000	40627			

图56 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-191-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:29:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	332139	100.000	51868	3086	1.155	--
总计		332139	100.000	51868			

图57 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-192-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:33:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:25:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	330022	100.000	51549	3087	1.156	--
总计		330022	100.000	51549			

图58 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-193-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:36:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	318322	100.000	49690	3083	1.155	--
总计		318322	100.000	49690			

图59 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-194-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:40:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:25:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	328432	100.000	51302	3088	1.156	--
总计		328432	100.000	51302			

图60 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-195-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:43:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	315476	100.000	49296	3086	1.156	--
总计		315476	100.000	49296			

图61 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-196-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:46:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:26:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	332122	100.000	51893	3087	1.155	--
总计		332122	100.000	51893			

图62 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-197-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 17:50:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:26:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	356917	100.000	55760	3086	1.154	--
总计		356917	100.000	55760			

图63 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-198-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:53:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	351325	100.000	54926	3083	1.155	--
总计		351325	100.000	54926			

图64 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-199-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 17:57:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	343483	100.000	53704	3086	1.154	--
总计		343483	100.000	53704			

图65 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-200-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:00:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	355117	100.000	55468	3082	1.155	--
总计		355117	100.000	55468			

图66 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-201-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:03:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	339214	100.000	52972	3085	1.155	--
总计		339214	100.000	52972			

图67 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-202-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:07:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:26:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	356681	100.000	55750	3083	1.153	--
总计		356681	100.000	55750			

图68 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-203-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:10:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:26:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	366238	100.000	57193	3083	1.155	--
总计		366238	100.000	57193			

图69 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-204-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:14:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	360348	100.000	56176	3084	1.154	--
总计		360348	100.000	56176			

图70 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-205-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 18:17:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:26:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	353642	100.000	55185	3085	1.156	--
总计		353642	100.000	55185			

图71 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-206-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:20:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	365892	100.000	57120	3085	1.153	--
总计		365892	100.000	57120			

图72 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-207-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:24:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	344445	100.000	53788	3086	1.153	--
总计		344445	100.000	53788			

图73 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-208-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:27:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	364265	100.000	56845	3085	1.153	--
总计		364265	100.000	56845			

图74 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-209-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:31:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	372144	100.000	58086	3085	1.152	--
总计		372144	100.000	58086			

图75 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-210-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:34:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	365843	100.000	57026	3083	1.153	--
总计		365843	100.000	57026			

图76 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-211-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:37:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	362990	100.000	56610	3086	1.153	--
总计		362990	100.000	56610			

图77 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-212-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:41:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	381430	100.000	59445	3083	1.152	--
总计		381430	100.000	59445			

图78 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-213-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:44:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	350811	100.000	54763	3085	1.152	--
总计		350811	100.000	54763			

图79 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-214-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:48:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	369089	100.000	57624	3085	1.153	--
总计		369089	100.000	57624			

图80 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-215-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:51:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:26:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	382962	100.000	59729	3081	1.152	--
总计		382962	100.000	59729			

图81 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-216-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:54:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	376767	100.000	58712	3079	1.151	--
总计		376767	100.000	58712			

图82 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-217-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 18:58:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	378342	100.000	58888	3079	1.152	--
总计		378342	100.000	58888			

图83 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-218-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:01:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	387367	100.000	60350	3083	1.152	--
总计		387367	100.000	60350			

图84 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-219-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:05:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	374826	100.000	58336	3084	1.152	--
总计		374826	100.000	58336			

图85 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-220-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:08:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:27:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	377124	100.000	58569	3077	1.151	--
总计		377124	100.000	58569			

图86 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-221-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:12:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	383618	100.000	51807	2199	1.189	--
总计		383618	100.000	51807			

图87 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-222-2 - cbzj-2927Ap-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:15:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	383928	100.000	51836	2199	1.189	--
总计		383928	100.000	51836			

图88 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2927A批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-223-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:18:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:27:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2024122121批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-224-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:22:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	383158	100.000	51765	2197	1.188	--
总计		383158	100.000	51765			

图90 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-225-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:25:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	383081	100.000	51748	2197	1.188	--
总计		383081	100.000	51748			

图91 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-226-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:29:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	383147	100.000	51738	2196	1.187	--
总计		383147	100.000	51738			

图92 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-227-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:32:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	383565	100.000	51755	2194	1.188	--
总计		383565	100.000	51755			

图93 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-228-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:35:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	383072	100.000	51762	2197	1.187	--
总计		383072	100.000	51762			

图94 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-229-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:39:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	288592	100.000	44755	3080	1.151	--
总计		288592	100.000	44755			

图95 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-230-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:42:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	286818	100.000	44463	3076	1.150	--
总计		286818	100.000	44463			

图96 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-231-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:45:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	286906	100.000	44502	3075	1.151	--
总计		286906	100.000	44502			

图97 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-232-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:49:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	287892	100.000	44691	3074	1.150	--
总计		287892	100.000	44691			

图98 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-233-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:52:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	294055	100.000	45635	3075	1.151	--
总计		294055	100.000	45635			

图99 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-234-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 19:56:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:27:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	283380	100.000	43995	3076	1.150	--
总计		283380	100.000	43995			

图100 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-235-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 19:59:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	362235	100.000	56311	3073	1.150	--
总计		362235	100.000	56311			

图101 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-236-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:02:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	360435	100.000	56026	3076	1.148	--
总计		360435	100.000	56026			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-237-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:06:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:27:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	360266	100.000	55981	3074	1.149	--
总计		360266	100.000	55981			

图103 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-238-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:09:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	358366	100.000	55727	3073	1.146	--
总计		358366	100.000	55727			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-239-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:12:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	369002	100.000	57267	3073	1.147	--
总计		369002	100.000	57267			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-240-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:16:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	357585	100.000	55492	3070	1.150	--
总计		357585	100.000	55492			

图106 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-241-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:19:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	385380	100.000	59794	3077	1.147	--
总计		385380	100.000	59794			

图107 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-242-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:23:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	381675	100.000	59201	3073	1.147	--
总计		381675	100.000	59201			

图108 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-243-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:26:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	381673	100.000	59132	3070	1.148	--
总计		381673	100.000	59132			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-244-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:29:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	381842	100.000	59328	3074	1.149	--
总计		381842	100.000	59328			

图110 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-245-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:33:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:28:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	392051	100.000	60850	3073	1.148	--
总计		392051	100.000	60850			

图111 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-246-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:36:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:28:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	378707	100.000	58789	3069	1.147	--
总计		378707	100.000	58789			

图112 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-247-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:39:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:28:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	392116	100.000	60939	3073	1.148	--
总计		392116	100.000	60939			

图113 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-248-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:43:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	388660	100.000	60229	3067	1.147	--
总计		388660	100.000	60229			

图114 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-249-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 20:46:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:28:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	387948	100.000	60131	3072	1.148	--
总计		387948	100.000	60131			

图115 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-250-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:50:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	389695	100.000	60394	3069	1.147	--
总计		389695	100.000	60394			

图116 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-251-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:53:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	397684	100.000	61605	3067	1.148	--
总计		397684	100.000	61605			

图117 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-252-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 20:56:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	385191	100.000	59714	3066	1.146	--
总计		385191	100.000	59714			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-253-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:00:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	396888	100.000	61430	3069	1.147	--
总计		396888	100.000	61430			

图119 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-254-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:03:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	390054	100.000	60462	3074	1.146	--
总计		390054	100.000	60462			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-255-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:06:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	390165	100.000	60467	3072	1.145	--
总计		390165	100.000	60467			

图121 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-256-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:10:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	391425	100.000	60599	3069	1.146	--
总计		391425	100.000	60599			

图122 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-257-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:13:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	396622	100.000	61445	3071	1.147	--
总计		396622	100.000	61445			

图123 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-258-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:17:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	390527	100.000	60609	3067	1.145	--
总计		390527	100.000	60609			

图124 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-259-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:20:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:28:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	396959	100.000	61608	3067	1.144	--
总计		396959	100.000	61608			

图125 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-260-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:23:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:29:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	392534	100.000	61003	3072	1.144	--
总计		392534	100.000	61003			

图126 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-261-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:27:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	392896	100.000	61029	3069	1.145	--
总计		392896	100.000	61029			

图127 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-262-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:30:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	391121	100.000	60802	3070	1.143	--
总计		391121	100.000	60802			

图128 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-263-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:33:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	399600	100.000	62135	3073	1.144	--
总计		399600	100.000	62135			

图129 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-264-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 21:37:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:29:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	385399	100.000	59998	3075	1.143	--
总计		385399	100.000	59998			

图130 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-265-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:40:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	384417	100.000	51703	2202	1.181	--
总计		384417	100.000	51703			

图131 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-266-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:44:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	384358	100.000	51725	2201	1.180	--
总计		384358	100.000	51725			

图132 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-267-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:47:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图133 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-268-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:50:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	383065	100.000	51562	2196	1.179	--
总计		383065	100.000	51562			

图134 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-269-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:54:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	382889	100.000	51597	2200	1.177	--
总计		382889	100.000	51597			

图135 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-270-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 21:57:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	382162	100.000	51514	2203	1.179	--
总计		382162	100.000	51514			

图136 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-271-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:01:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	382357	100.000	51449	2201	1.179	--
总计		382357	100.000	51449			

图137 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-272-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:04:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	382412	100.000	51471	2202	1.180	--
总计		382412	100.000	51471			

图138 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-273-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:07:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	293177	100.000	45463	3081	1.142	--
总计		293177	100.000	45463			

图139 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-274-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:11:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	286708	100.000	44457	3073	1.142	--
总计		286708	100.000	44457			

图140 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-275-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:14:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	293102	100.000	45259	3074	1.144	--
总计		293102	100.000	45259			

图141 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-276-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:18:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:29:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	293900	100.000	45466	3074	1.144	--
总计		293900	100.000	45466			

图142 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-277-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:21:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	285697	100.000	44162	3075	1.144	--
总计		285697	100.000	44162			

图143 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-278-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:24:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	290504	100.000	44877	3071	1.142	--
总计		290504	100.000	44877			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-279-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:28:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	355211	100.000	54926	3071	1.141	--
总计		355211	100.000	54926			

图145 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-280-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:31:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	360464	100.000	55700	3075	1.141	--
总计		360464	100.000	55700			

图146 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-281-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:35:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:29:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	363154	100.000	56159	3077	1.141	--
总计		363154	100.000	56159			

图147 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-282-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:38:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:30:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	365783	100.000	56538	3075	1.140	--
总计		365783	100.000	56538			

图148 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-283-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:41:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	367573	100.000	56858	3072	1.140	--
总计		367573	100.000	56858			

图149 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-284-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:45:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:30:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	358816	100.000	55590	3075	1.139	--
总计		358816	100.000	55590			

图150 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-285-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:48:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	373410	100.000	57800	3072	1.140	--
总计		373410	100.000	57800			

图151 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-286-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:51:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	378849	100.000	58645	3073	1.140	--
总计		378849	100.000	58645			

图152 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-287-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 22:55:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	382302	100.000	59204	3074	1.139	--
总计		382302	100.000	59204			

图153 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-288-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 22:58:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:30:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	387489	100.000	59985	3070	1.140	--
总计		387489	100.000	59985			

图154 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-289-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:02:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	357650	100.000	55399	3072	1.139	--
总计		357650	100.000	55399			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-290-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:05:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:30:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	380136	100.000	58888	3075	1.138	--
总计		380136	100.000	58888			

图156 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-291-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:08:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	377512	100.000	58530	3074	1.138	--
总计		377512	100.000	58530			

图157 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-292-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:12:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	384680	100.000	59711	3075	1.137	--
总计		384680	100.000	59711			

图158 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-293-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:15:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	385522	100.000	59777	3071	1.138	--
总计		385522	100.000	59777			

图159 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-294-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:19:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	392633	100.000	60825	3072	1.139	--
总计		392633	100.000	60825			

图160 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-295-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:22:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	381688	100.000	59156	3072	1.139	--
总计		381688	100.000	59156			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-296-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:25:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	384052	100.000	59545	3072	1.136	--
总计		384052	100.000	59545			

图162 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-297-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:29:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:30:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	376628	100.000	58435	3071	1.137	--
总计		376628	100.000	58435			

图163 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-298-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:32:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:30:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	385268	100.000	59772	3070	1.136	--
总计		385268	100.000	59772			

图164 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-299-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:36:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	390897	100.000	60610	3072	1.136	--
总计		390897	100.000	60610			

图165 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-300-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:39:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	394108	100.000	61050	3072	1.137	--
总计		394108	100.000	61050			

图166 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-301-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:42:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	383204	100.000	59396	3072	1.137	--
总计		383204	100.000	59396			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-302-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:46:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	387590	100.000	60037	3073	1.137	--
总计		387590	100.000	60037			

图168 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-303-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:49:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:30:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	379744	100.000	58824	3069	1.136	--
总计		379744	100.000	58824			

图169 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-304-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 23:53:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	387372	100.000	60042	3069	1.137	--
总计		387372	100.000	60042			

图170 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-305-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:56:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	395721	100.000	61299	3068	1.136	--
总计		395721	100.000	61299			

图171 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-306-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/15 23:59:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	396011	100.000	61336	3069	1.135	--
总计		396011	100.000	61336			

图172 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-307-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:03:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	386951	100.000	59897	3070	1.135	--
总计		386951	100.000	59897			

图173 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-308-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:06:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:31:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	392105	100.000	60687	3071	1.136	--
总计		392105	100.000	60687			

图174 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-309-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:10:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	385032	100.000	51605	2203	1.170	--
总计		385032	100.000	51605			

图175 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-310-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:13:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	384594	100.000	51646	2206	1.169	--
总计		384594	100.000	51646			

图176 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-311-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:16:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图177 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-312-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:20:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	382898	100.000	51329	2198	1.170	--
总计		382898	100.000	51329			

图178 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-313-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:23:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	382872	100.000	51356	2198	1.169	--
总计		382872	100.000	51356			

图179 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-314-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:27:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	382796	100.000	51322	2197	1.170	--
总计		382796	100.000	51322			

图180 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-315-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:30:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	382668	100.000	51326	2199	1.169	--
总计		382668	100.000	51326			

图181 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-316-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:33:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	382702	100.000	51333	2200	1.170	--
总计		382702	100.000	51333			

图182 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-317-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:37:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	282106	100.000	43600	3067	1.136	--
总计		282106	100.000	43600			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-318-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:40:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	280609	100.000	43338	3066	1.136	--
总计		280609	100.000	43338			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-319-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:44:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:31:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	283507	100.000	43680	3062	1.136	--
总计		283507	100.000	43680			

图185 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-320-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:47:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	283542	100.000	43795	3063	1.135	--
总计		283542	100.000	43795			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-321-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:50:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	288015	100.000	44426	3067	1.136	--
总计		288015	100.000	44426			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-322-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 00:54:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:31:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	282406	100.000	43660	3062	1.134	--
总计		282406	100.000	43660			

图188 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-323-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 00:57:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	358009	100.000	55257	3065	1.134	--
总计		358009	100.000	55257			

图189 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-324-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:01:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:31:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	354710	100.000	54803	3061	1.134	--
总计		354710	100.000	54803			

图190 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-325-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:04:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:31:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	359330	100.000	55462	3062	1.133	--
总计		359330	100.000	55462			

图191 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-326-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:07:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	362061	100.000	55917	3062	1.133	--
总计		362061	100.000	55917			

图192 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-327-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:11:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	365257	100.000	56339	3063	1.133	--
总计		365257	100.000	56339			

图193 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-328-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:14:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	361989	100.000	55956	3061	1.133	--
总计		361989	100.000	55956			

图194 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-329-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:18:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	381436	100.000	58800	3058	1.132	--
总计		381436	100.000	58800			

图195 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-330-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:21:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	374486	100.000	57749	3062	1.131	--
总计		374486	100.000	57749			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-331-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:24:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	380715	100.000	58728	3062	1.133	--
总计		380715	100.000	58728			

图197 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-332-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:28:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:32:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	385136	100.000	59421	3056	1.132	--
总计		385136	100.000	59421			

图198 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-333-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:31:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:32:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	383968	100.000	59249	3057	1.133	--
总计		383968	100.000	59249			

图199 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-334-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:34:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	385087	100.000	59464	3055	1.132	--
总计		385087	100.000	59464			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-335-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:38:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	387004	100.000	59734	3058	1.131	--
总计		387004	100.000	59734			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-336-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:41:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	380330	100.000	58718	3056	1.132	--
总计		380330	100.000	58718			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-337-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:45:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	393544	100.000	60737	3058	1.132	--
总计		393544	100.000	60737			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-338-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:48:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:32:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	391272	100.000	60409	3057	1.132	--
总计		391272	100.000	60409			

图204 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-339-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 01:51:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:32:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	389206	100.000	60074	3056	1.131	--
总计		389206	100.000	60074			

图205 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-340-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:55:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	391501	100.000	60258	3053	1.131	--
总计		391501	100.000	60258			

图206 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-341-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 01:58:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	388069	100.000	59813	3053	1.131	--
总计		388069	100.000	59813			

图207 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-342-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:02:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	381091	100.000	58777	3058	1.132	--
总计		381091	100.000	58777			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-343-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:05:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	391922	100.000	60380	3057	1.130	--
总计		391922	100.000	60380			

图209 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-344-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:08:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	391520	100.000	60245	3053	1.133	--
总计		391520	100.000	60245			

图210 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-345-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:12:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	390447	100.000	60116	3055	1.131	--
总计		390447	100.000	60116			

图211 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-346-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:15:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:32:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	393100	100.000	60424	3054	1.130	--
总计		393100	100.000	60424			

图212 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-347-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:18:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:33:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	388325	100.000	59642	3051	1.131	--
总计		388325	100.000	59642			

图213 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-348-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:22:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:33:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	385438	100.000	59161	3050	1.130	--
总计		385438	100.000	59161			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-349-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:25:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:33:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	390259	100.000	59991	3057	1.130	--
总计		390259	100.000	59991			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-350-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:29:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:33:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	390261	100.000	59943	3053	1.131	--
总计		390261	100.000	59943			

图216 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-351-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 02:32:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/16 11:33:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	390859	100.000	60032	3049	1.130	--
总计		390859	100.000	60032			

图217 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-352-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:35:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:33:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	392584	100.000	60290	3052	1.130	--
总计		392584	100.000	60290			

图218 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-353-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:39:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:33:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	382421	100.000	51287	2191	1.165	--
总计		382421	100.000	51287			

图219 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 0-20/29-354-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250115-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 02:42:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/16 11:33:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	382929	100.000	51322	2192	1.164	--
总计		382929	100.000	51322			

图220 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2