



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-1-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 14:20:36

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:55:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-2-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 14:24:05

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	22624	100.000	4529	2257	1.344	--
总计		22624	100.000	4529			

图2 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-3-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 14:27:34

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	22790	100.000	4546	2255	1.345	--
总计		22790	100.000	4546			

图3 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-4-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 14:31:03

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	22763	100.000	4540	2246	1.337	--
总计		22763	100.000	4540			

图4 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-5-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 14:34:32

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	22673	100.000	4536	2244	1.339	--
总计		22673	100.000	4536			

图5 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-6-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 14:38:01

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	22864	100.000	4530	2223	1.353	--
总计		22864	100.000	4530			

图6 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-15-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:10:56

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	5494	100.000	1080	1974	1.134	--
总计		5494	100.000	1080			

图7 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-16-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:14:24

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	5691	100.000	1083	1829	1.099	--
总计		5691	100.000	1083			

图8 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-17-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:17:52

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	5641	100.000	1087	1860	1.091	--
总计		5641	100.000	1087			

图9 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-18-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:21:19

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	6703	100.000	1277	1837	1.146	--
总计		6703	100.000	1277			

图10 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-19-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:24:46

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	4686	100.000	901	1871	1.068	--
总计		4686	100.000	901			

图11 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-20-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:28:13

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	6136	100.000	1218	2004	1.183	--
总计		6136	100.000	1218			

图12 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-21-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:31:41

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	12420	100.000	2384	1886	1.250	--
总计		12420	100.000	2384			

图13 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-22-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:35:09

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:56:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	12465	100.000	2438	1955	1.233	--
总计		12465	100.000	2438			

图14 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-23-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:38:37

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	12458	100.000	2416	1924	1.226	--
总计		12458	100.000	2416			

图15 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-24-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:42:06

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	12610	100.000	2406	1874	1.242	--
总计		12610	100.000	2406			

图16 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-25-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:45:34

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	11511	100.000	2253	1938	1.235	--
总计		11511	100.000	2253			

图17 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-26-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:49:02

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	12474	100.000	2415	1915	1.256	--
总计		12474	100.000	2415			

图18 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-27-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:52:32

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	16292	100.000	3134	1897	1.268	--
总计		16292	100.000	3134			

图19 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-28-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:56:02

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	16366	100.000	3133	1876	1.258	--
总计		16366	100.000	3133			

图20 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-29-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:59:30

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	16048	100.000	3076	1877	1.249	--
总计		16048	100.000	3076			

图21 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-30-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:02:58

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	15769	100.000	3056	1929	1.264	--
总计		15769	100.000	3056			

图22 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-31-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:06:26

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	15493	100.000	2976	1916	1.264	--
总计		15493	100.000	2976			

图23 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-32-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:09:54

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	16416	100.000	3129	1870	1.259	--
总计		16416	100.000	3129			

图24 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-33-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:13:23

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	17527	100.000	3376	1921	1.284	--
总计		17527	100.000	3376			

图25 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-34-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:16:51

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	17557	100.000	3392	1908	1.260	--
总计		17557	100.000	3392			

图26 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-35-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:20:20

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	17818	100.000	3448	1913	1.259	--
总计		17818	100.000	3448			

图27 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-36-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:23:48

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	17876	100.000	3413	1885	1.258	--
总计		17876	100.000	3413			

图28 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-37-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:27:16

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	17264	100.000	3335	1915	1.285	--
总计		17264	100.000	3335			

图29 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-38-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:30:44

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	17133	100.000	3328	1934	1.278	--
总计		17133	100.000	3328			

图30 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-39-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:34:12

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	18563	100.000	3634	1947	1.280	--
总计		18563	100.000	3634			

图31 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-40-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:37:40

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	18992	100.000	3661	1910	1.278	--
总计		18992	100.000	3661			

图32 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-41-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:41:09

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.494	19993	100.000	3805	1858	1.261	--
总计		19993	100.000	3805			

图33 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-42-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:44:37

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	19064	100.000	3673	1911	1.276	--
总计		19064	100.000	3673			

图34 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-43-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:48:05

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:57:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	18118	100.000	3527	1939	1.293	--
总计		18118	100.000	3527			

图35 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-44-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:51:33

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	18881	100.000	3651	1923	1.283	--
总计		18881	100.000	3651			

图36 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-45-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:55:01

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	19786	100.000	3847	1943	1.280	--
总计		19786	100.000	3847			

图37 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-46-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:58:29

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	19600	100.000	3831	1950	1.264	--
总计		19600	100.000	3831			

图38 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-47-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:01:57

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.494	20135	100.000	3886	1918	1.272	--
总计		20135	100.000	3886			

图39 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-48-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:05:25

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.494	20004	100.000	3859	1883	1.260	--
总计		20004	100.000	3859			

图40 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-49-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:08:53

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.494	19495	100.000	3748	1886	1.282	--
总计		19495	100.000	3748			

图41 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-50-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:12:21

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	18944	100.000	3656	1915	1.287	--
总计		18944	100.000	3656			

图42 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-51-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:15:49

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.494	20307	100.000	3886	1889	1.277	--
总计		20307	100.000	3886			

图43 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-52-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:19:17

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	20092	100.000	3885	1913	1.275	--
总计		20092	100.000	3885			

图44 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-53-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:22:45

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	21015	100.000	4046	1894	1.272	--
总计		21015	100.000	4046			

图45 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-54-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:26:14

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.494	20426	100.000	3927	1905	1.274	--
总计		20426	100.000	3927			

图46 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-55-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:29:42

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.494	19758	100.000	3804	1905	1.279	--
总计		19758	100.000	3804			

图47 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-56-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:33:10

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	19669	100.000	3794	1904	1.270	--
总计		19669	100.000	3794			

图48 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-57-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:36:39

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	20219	100.000	3891	1900	1.280	--
总计		20219	100.000	3891			

图49 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-58-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:40:08

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	20271	100.000	3896	1899	1.271	--
总计		20271	100.000	3896			

图50 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-59-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:43:38

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	21044	100.000	4045	1892	1.270	--
总计		21044	100.000	4045			

图51 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-60-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:47:07

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	21002	100.000	4007	1868	1.285	--
总计		21002	100.000	4007			

图52 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-61-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:50:36

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	20006	100.000	3852	1912	1.279	--
总计		20006	100.000	3852			

图53 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-62-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:54:05

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.495	19679	100.000	3809	1905	1.282	--
总计		19679	100.000	3809			

图54 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-63-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:57:34

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	21860	100.000	4370	2256	1.340	--
总计		21860	100.000	4370			

图55 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-64-2 - zzp-25011201p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:01:04

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:58:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	21759	100.000	4388	2276	1.338	--
总计		21759	100.000	4388			

图56 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011201批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-73-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:34:02

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:59:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-74-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:37:32

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:59:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.555	22581	100.000	4516	2247	1.335	--
总计		22581	100.000	4516			

图58 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-75-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:41:02

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:59:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.555	22664	100.000	4517	2237	1.352	--
总计		22664	100.000	4517			

图59 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-76-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:44:31

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:59:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.555	22732	100.000	4520	2236	1.337	--
总计		22732	100.000	4520			

图60 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-77-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:48:01

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:59:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.555	22612	100.000	4522	2248	1.338	--
总计		22612	100.000	4522			

图61 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-78-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:51:31

处理时间(V2) : 2025/01/16 11:59:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.555	22522	100.000	4492	2241	1.340	--
总计		22522	100.000	4492			

图62 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-87-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:24:37

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	7062	100.000	1401	1967	1.104	--
总计		7062	100.000	1401			

图63 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-88-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:28:07

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	9205	100.000	1767	1831	1.160	--
总计		9205	100.000	1767			

图64 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-89-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:31:36

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	7103	100.000	1380	1910	1.123	--
总计		7103	100.000	1380			

图65 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-90-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:35:04

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	8925	100.000	1700	1842	1.165	--
总计		8925	100.000	1700			

图66 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-91-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:38:33

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	9283	100.000	1806	1934	1.207	--
总计		9283	100.000	1806			

图67 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-92-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:42:01

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	8180	100.000	1566	1881	1.221	--
总计		8180	100.000	1566			

图68 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-93-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:45:30

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	11392	100.000	2210	1921	1.203	--
总计		11392	100.000	2210			

图69 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-94-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:48:59

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	14507	100.000	2786	1885	1.244	--
总计		14507	100.000	2786			

图70 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-95-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:52:29

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	14110	100.000	2676	1848	1.235	--
总计		14110	100.000	2676			

图71 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-96-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:55:58

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	14401	100.000	2773	1901	1.250	--
总计		14401	100.000	2773			

图72 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-97-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:59:27

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	13972	100.000	2721	1922	1.268	--
总计		13972	100.000	2721			

图73 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-98-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:02:56

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	13635	100.000	2634	1891	1.217	--
总计		13635	100.000	2634			

图74 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-99-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:06:26

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	15432	100.000	2991	1936	1.254	--
总计		15432	100.000	2991			

图75 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-100-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:09:56

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	17424	100.000	3313	1903	1.288	--
总计		17424	100.000	3313			

图76 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-101-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:13:24

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	16548	100.000	3165	1891	1.275	--
总计		16548	100.000	3165			

图77 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-102-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:16:53

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	17481	100.000	3381	1917	1.264	--
总计		17481	100.000	3381			

图78 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-103-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:20:22

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	17180	100.000	3282	1847	1.250	--
总计		17180	100.000	3282			

图79 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-104-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:23:51

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	16347	100.000	3141	1891	1.241	--
总计		16347	100.000	3141			

图80 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-105-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:27:21

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	16529	100.000	3186	1909	1.259	--
总计		16529	100.000	3186			

图81 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-106-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:30:50

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	18488	100.000	3542	1880	1.257	--
总计		18488	100.000	3542			

图82 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-107-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:34:19

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	18259	100.000	3539	1913	1.254	--
总计		18259	100.000	3539			

图83 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-108-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:37:49

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:00:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	18744	100.000	3599	1895	1.260	--
总计		18744	100.000	3599			

图84 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-109-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:41:18

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	17764	100.000	3423	1910	1.277	--
总计		17764	100.000	3423			

图85 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-110-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:44:48

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	17611	100.000	3307	1865	1.307	--
总计		17611	100.000	3307			

图86 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-111-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:48:17

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	17715	100.000	3445	1896	1.245	--
总计		17715	100.000	3445			

图87 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-112-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:51:45

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	18283	100.000	3521	1889	1.247	--
总计		18283	100.000	3521			

图88 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-113-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:55:14

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	19013	100.000	3662	1902	1.262	--
总计		19013	100.000	3662			

图89 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-114-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 20:58:44

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	20031	100.000	3873	1908	1.259	--
总计		20031	100.000	3873			

图90 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-115-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:02:13

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	18902	100.000	3613	1881	1.281	--
总计		18902	100.000	3613			

图91 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-116-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:05:42

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	18362	100.000	3547	1907	1.264	--
总计		18362	100.000	3547			

图92 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-117-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:09:12

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	19696	100.000	3691	1885	1.337	--
总计		19696	100.000	3691			

图93 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-118-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:12:42

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.496	21382	100.000	3968	1837	1.287	--
总计		21382	100.000	3968			

图94 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-119-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:16:12

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	20329	100.000	3867	1909	1.276	--
总计		20329	100.000	3867			

图95 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-120-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:19:42

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	21330	100.000	4081	1886	1.264	--
总计		21330	100.000	4081			

图96 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-121-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:23:10

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	19554	100.000	3773	1909	1.271	--
总计		19554	100.000	3773			

图97 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-122-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:26:40

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	19202	100.000	3708	1917	1.266	--
总计		19202	100.000	3708			

图98 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-123-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:30:10

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	19102	100.000	3697	1930	1.267	--
总计		19102	100.000	3697			

图99 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-124-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:33:40

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	20719	100.000	3965	1887	1.266	--
总计		20719	100.000	3965			

图100 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-125-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:37:10

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	20137	100.000	3902	1921	1.275	--
总计		20137	100.000	3902			

图101 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-126-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:40:40

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	21819	100.000	4157	1866	1.253	--
总计		21819	100.000	4157			

图102 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-127-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:44:10

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	19743	100.000	3794	1896	1.269	--
总计		19743	100.000	3794			

图103 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-128-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:47:39

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	19820	100.000	3791	1881	1.263	--
总计		19820	100.000	3791			

图104 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-129-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:51:09

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:01:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	19343	100.000	3719	1893	1.279	--
总计		19343	100.000	3719			

图105 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-130-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:54:39

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	21521	100.000	4093	1866	1.257	--
总计		21521	100.000	4093			

图106 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-131-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 21:58:09

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	21306	100.000	4074	1863	1.252	--
总计		21306	100.000	4074			

图107 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-132-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:01:39

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	21597	100.000	4117	1869	1.246	--
总计		21597	100.000	4117			

图108 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-133-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:05:09

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	20108	100.000	3843	1899	1.253	--
总计		20108	100.000	3843			

图109 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-134-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:08:38

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	19920	100.000	3787	1877	1.260	--
总计		19920	100.000	3787			

图110 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-135-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:12:07

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	21140	100.000	4209	2248	1.293	--
总计		21140	100.000	4209			

图111 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-136-2 - zzp-25011301p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:15:37

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	21117	100.000	4192	2238	1.294	--
总计		21117	100.000	4192			

图112 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25011301批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-145-2 - zj-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:48:36

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-pH1.2介质
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-146-2 - zj-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:52:05

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	21201	100.000	4246	2252	1.320	--
总计		21201	100.000	4246			

图114 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-147-2 - zj-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:55:32

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	21404	100.000	4262	2252	1.335	--
总计		21404	100.000	4262			

图115 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-148-2 - zj-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 22:59:00

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	21366	100.000	4243	2242	1.331	--
总计		21366	100.000	4243			

图116 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-149-2 - zj-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:02:29

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	21275	100.000	4248	2256	1.324	--
总计		21275	100.000	4248			

图117 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-150-2 - zj-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:05:57

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:02:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	21403	100.000	4243	2236	1.336	--
总计		21403	100.000	4243			

图118 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-159-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:38:53

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	5280	100.000	995	1879	1.061	--
总计		5280	100.000	995			

图119 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-160-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:42:21

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	6678	100.000	1288	1905	1.099	--
总计		6678	100.000	1288			

图120 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-161-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:45:49

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	7095	100.000	1360	1866	1.119	--
总计		7095	100.000	1360			

图121 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-162-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:49:17

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	7142	100.000	1355	1833	1.140	--
总计		7142	100.000	1355			

图122 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-163-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:52:45

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.497	6203	100.000	1174	1814	1.102	--
总计		6203	100.000	1174			

图123 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-164-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:56:13

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	6698	100.000	1302	1952	1.123	--
总计		6698	100.000	1302			

图124 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-165-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/15 23:59:41

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	12444	100.000	2368	1876	1.228	--
总计		12444	100.000	2368			

图125 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-166-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:03:08

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	11977	100.000	2303	1923	1.266	--
总计		11977	100.000	2303			

图126 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-167-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:06:34

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.502	12504	100.000	2414	1941	1.240	--
总计		12504	100.000	2414			

图127 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-168-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:10:02

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.501	12812	100.000	2455	1910	1.238	--
总计		12812	100.000	2455			

图128 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-169-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:13:30

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	12859	100.000	2447	1889	1.270	--
总计		12859	100.000	2447			

图129 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-170-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:16:57

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	12788	100.000	2486	1939	1.254	--
总计		12788	100.000	2486			

图130 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-171-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:20:24

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	16204	100.000	3104	1921	1.269	--
总计		16204	100.000	3104			

图131 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-172-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:23:52

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:03:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	15996	100.000	3067	1901	1.271	--
总计		15996	100.000	3067			

图132 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-173-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:27:20

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.501	15733	100.000	3019	1919	1.262	--
总计		15733	100.000	3019			

图133 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-174-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:30:48

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	15710	100.000	3019	1901	1.267	--
总计		15710	100.000	3019			

图134 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-175-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:34:14

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	15323	100.000	2933	1885	1.253	--
总计		15323	100.000	2933			

图135 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-176-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:37:42

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	15644	100.000	3017	1913	1.278	--
总计		15644	100.000	3017			

图136 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-177-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:41:10

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	18508	100.000	3537	1900	1.279	--
总计		18508	100.000	3537			

图137 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-178-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:44:37

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	17912	100.000	3399	1869	1.293	--
总计		17912	100.000	3399			

图138 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-179-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:48:04

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	18024	100.000	3428	1894	1.275	--
总计		18024	100.000	3428			

图139 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-180-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:51:32

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	17567	100.000	3349	1867	1.246	--
总计		17567	100.000	3349			

图140 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-181-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:54:59

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	17148	100.000	3294	1907	1.276	--
总计		17148	100.000	3294			

图141 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-182-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 00:58:27

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	17121	100.000	3288	1932	1.293	--
总计		17121	100.000	3288			

图142 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-183-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:01:55

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	20399	100.000	3881	1911	1.285	--
总计		20399	100.000	3881			

图143 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-184-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:05:23

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	20280	100.000	3833	1865	1.265	--
总计		20280	100.000	3833			

图144 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-185-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:08:50

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	19807	100.000	3732	1880	1.294	--
总计		19807	100.000	3732			

图145 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-186-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:12:16

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	18864	100.000	3623	1901	1.282	--
总计		18864	100.000	3623			

图146 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-187-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:15:44

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	18664	100.000	3588	1918	1.272	--
总计		18664	100.000	3588			

图147 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-188-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:19:11

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	18968	100.000	3583	1880	1.311	--
总计		18968	100.000	3583			

图148 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-189-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:22:38

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	21652	100.000	4113	1886	1.278	--
总计		21652	100.000	4113			

图149 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-190-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:26:07

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	20951	100.000	4017	1906	1.286	--
总计		20951	100.000	4017			

图150 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-191-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:29:34

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	21029	100.000	4012	1893	1.284	--
总计		21029	100.000	4012			

图151 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-192-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:33:02

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	19402	100.000	3737	1907	1.278	--
总计		19402	100.000	3737			

图152 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-193-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:36:29

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	19627	100.000	3731	1880	1.287	--
总计		19627	100.000	3731			

图153 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-194-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:39:55

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:04:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	19570	100.000	3713	1896	1.302	--
总计		19570	100.000	3713			

图154 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-195-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:43:23

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	22849	100.000	4351	1881	1.277	--
总计		22849	100.000	4351			

图155 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-196-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:46:50

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	21897	100.000	4169	1903	1.297	--
总计		21897	100.000	4169			

图156 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-197-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:50:17

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	21352	100.000	4096	1923	1.290	--
总计		21352	100.000	4096			

图157 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-198-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:53:45

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	20093	100.000	3847	1897	1.301	--
总计		20093	100.000	3847			

图158 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-199-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 01:57:12

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	19970	100.000	3795	1886	1.317	--
总计		19970	100.000	3795			

图159 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-200-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:00:38

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	19597	100.000	3765	1902	1.280	--
总计		19597	100.000	3765			

图160 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-201-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:04:05

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	22737	100.000	4351	1896	1.290	--
总计		22737	100.000	4351			

图161 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-202-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:07:33

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	21542	100.000	4144	1911	1.272	--
总计		21542	100.000	4144			

图162 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-203-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:11:01

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	21790	100.000	4148	1917	1.303	--
总计		21790	100.000	4148			

图163 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-PN4A批-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-204-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:14:29

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	19904	100.000	3813	1917	1.293	--
总计		19904	100.000	3813			

图164 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-205-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:17:58

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.499	19963	100.000	3793	1891	1.302	--
总计		19963	100.000	3793			

图165 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-206-2 - zzp-24122801p-rcqx-pH1.2jz-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:21:24

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.498	19630	100.000	3769	1920	1.300	--
总计		19630	100.000	3769			

图166 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-24122801批-pH1.2介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-207-2 - zj-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:24:53

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	21318	100.000	4320	2365	1.340	--
总计		21318	100.000	4320			

图167 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 0-14/30-208-2 - zj-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250115-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/01/16 02:28:20

处理时间(V2) : 2025/01/16 12:05:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	21279	100.000	4309	2355	1.323	--
总计		21279	100.000	4309			

图168 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
-pH1.2介质
对照品溶液-2-2