




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1101-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-9
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:20:48
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1102-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 17:24:14 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:37 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	98204	100.000	22137	4296	1.150	--
总计		98204	100.000	22137			

图2 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1103-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:27:40

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:40


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97967	100.000	22114	4292	1.151	--
总计		97967	100.000	22114			

图3 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1104-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:31:06

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97922	100.000	22092	4282	1.150	--
总计		97922	100.000	22092			

图4 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1105-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:34:32

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97845	100.000	22079	4289	1.150	--
总计		97845	100.000	22079			

图5 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1106-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:37:58

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:49


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97652	100.000	22071	4288	1.153	--
总计		97652	100.000	22071			

图6 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1107-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-1

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:41:23

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	9639	100.000	2207	4542	1.196	--
总计		9639	100.000	2207			

图7 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1108-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-10

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:44:48

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:55


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	8912	100.000	2040	4493	1.182	--
总计		8912	100.000	2040			

图8 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1109-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-19

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:48:12

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:58


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	7816	100.000	1772	4512	1.200	--
总计		7816	100.000	1772			

图9 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1110-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-28

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:51:37

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	9863	100.000	2246	4520	1.211	--
总计		9863	100.000	2246			

图10 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1111-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-37

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:55:02

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	10042	100.000	2281	4557	1.197	--
总计		10042	100.000	2281			

图11 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1112-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:58:27

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:06


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	10620	100.000	2398	4531	1.169	--
总计		10620	100.000	2398			

图12 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1113-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-2
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:01:51
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	21123	100.000	4916	4629	1.156	--
总计		21123	100.000	4916			

图13 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1114-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-11

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:05:15

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:11


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	20592	100.000	4785	4639	1.158	--
总计		20592	100.000	4785			

图14 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1115-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-20

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:08:40

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:14


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	19865	100.000	4617	4642	1.170	--
总计		19865	100.000	4617			

图15 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1116-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:12:05
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	20958	100.000	4880	4622	1.169	--
总计		20958	100.000	4880			

图16 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1117-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-38
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:15:29
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	21808	100.000	5060	4649	1.164	--
总计		21808	100.000	5060			

图17 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1118-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-47

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:18:54

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	23266	100.000	5424	4641	1.161	--
总计		23266	100.000	5424			

图18 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1119-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-3

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:22:19

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	30225	100.000	7020	4646	1.162	--
总计		30225	100.000	7020			

图19 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1120-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-12
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:25:43
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	30240	100.000	7098	4670	1.160	--
总计		30240	100.000	7098			

图20 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1121-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-21

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:29:07

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	29871	100.000	6964	4647	1.152	--
总计		29871	100.000	6964			

图21 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1122-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-30

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:32:33

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	30668	100.000	7164	4673	1.157	--
总计		30668	100.000	7164			

图22 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1123-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-39
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:35:57 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:36 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	31311	100.000	7283	4651	1.161	--
总计		31311	100.000	7283			

图23 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1124-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-48

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:39:21

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	32035	100.000	7497	4683	1.157	--
总计		32035	100.000	7497			

图24 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1125-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-4
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:42:46
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	37398	100.000	8753	4684	1.152	--
总计		37398	100.000	8753			

图25 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1126-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-13

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:46:11

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:44


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	37252	100.000	8731	4693	1.156	--
总计		37252	100.000	8731			

图26 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1127-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-22
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:49:35 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:47 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	37782	100.000	8832	4676	1.158	--
总计		37782	100.000	8832			

图27 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1128-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-31
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:52:59
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	37447	100.000	8794	4720	1.161	--
总计		37447	100.000	8794			

图28 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1129-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-40

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:56:23

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:52


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	38878	100.000	9105	4683	1.159	--
总计		38878	100.000	9105			

图29 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1130-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-49

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:59:47

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:55


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	38893	100.000	9091	4678	1.160	--
总计		38893	100.000	9091			

图30 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1131-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-5
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:03:11 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	46657	100.000	10947	4697	1.156	--
总计		46657	100.000	10947			

图31 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1132-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-14

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:06:35

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	48648	100.000	11333	4694	1.157	--
总计		48648	100.000	11333			

图32 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1133-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-23

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:09:59

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	49153	100.000	11433	4690	1.155	--
总计		49153	100.000	11433			

图33 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1134-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-32

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:13:23

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	46854	100.000	10956	4678	1.155	--
总计		46854	100.000	10956			

图34 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1135-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-41
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:16:47
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	48414	100.000	11338	4692	1.159	--
总计		48414	100.000	11338			

图35 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1136-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-50
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:20:11 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	47726	100.000	11159	4693	1.156	--
总计		47726	100.000	11159			

图36 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1137-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-6
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:23:35 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	54364	100.000	12712	4707	1.155	--
总计		54364	100.000	12712			

图37 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1138-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-15

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:26:59

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	56832	100.000	13283	4702	1.154	--
总计		56832	100.000	13283			

图38 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1139-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-24
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:30:23
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:21
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	57319	100.000	13408	4717	1.156	--
总计		57319	100.000	13408			

图39 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1140-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-33

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:33:48

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	54963	100.000	12883	4708	1.156	--
总计		54963	100.000	12883			

图40 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1141-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-42

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:37:13

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	57011	100.000	13418	4751	1.154	--
总计		57011	100.000	13418			

图41 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1142-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-51

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:40:37

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:29


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	56364	100.000	13211	4731	1.155	--
总计		56364	100.000	13211			

图42 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1143-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-7

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:44:01

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	61728	100.000	14459	4703	1.156	--
总计		61728	100.000	14459			

图43 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1144-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-16

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:47:25

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:35


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	62537	100.000	14655	4740	1.151	--
总计		62537	100.000	14655			

图44 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1145-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-25

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:50:49

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	64094	100.000	15042	4753	1.155	--
总计		64094	100.000	15042			

图45 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1146-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-34
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:54:13
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:40
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	62212	100.000	14596	4712	1.154	--
总计		62212	100.000	14596			

图46 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1147-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-43

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 19:57:37

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:43


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	63200	100.000	14805	4723	1.153	--
总计		63200	100.000	14805			

图47 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1148-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-52

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:01:02

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	64103	100.000	15102	4763	1.152	--
总计		64103	100.000	15102			

图48 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1149-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-8

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:04:27

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:49


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	69303	100.000	16237	4713	1.153	--
总计		69303	100.000	16237			

图49 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1150-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-17

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:07:52

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:52


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	70605	100.000	16566	4705	1.152	--
总计		70605	100.000	16566			

图50 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1151-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-26

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:11:18

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:55


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	71689	100.000	16829	4736	1.153	--
总计		71689	100.000	16829			

图51 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1152-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-35

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:14:43

处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:58


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	70563	100.000	16502	4707	1.153	--
总计		70563	100.000	16502			

图52 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1153-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-90min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-44

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:18:09

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:00


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	71014	100.000	16733	4758	1.151	--
总计		71014	100.000	16733			

图53 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1154-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-53
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:21:34
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	72228	100.000	16956	4739	1.153	--
总计		72228	100.000	16956			

图54 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1155-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-120min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-1

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:25:00

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:06


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	74083	100.000	17398	4747	1.152	--
总计		74083	100.000	17398			

图55 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1156-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-120min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-10

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:28:26

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:09


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	75999	100.000	17860	4742	1.152	--
总计		75999	100.000	17860			

图56 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1157-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-120min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-19

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:31:52

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	77151	100.000	18080	4721	1.151	--
总计		77151	100.000	18080			

图57 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1158-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-120min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-28

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:35:18

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	76121	100.000	18010	4784	1.152	--
总计		76121	100.000	18010			

图58 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1159-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-120min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-37

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:38:44

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:17


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	77660	100.000	18241	4745	1.152	--
总计		77660	100.000	18241			

图59 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1160-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-120min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:42:08

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:20


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	76140	100.000	17892	4750	1.152	--
总计		76140	100.000	17892			

图60 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1161-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-2

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:45:35

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	79751	100.000	18838	4791	1.151	--
总计		79751	100.000	18838			

图61 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1162-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-11
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:49:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:25 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	77814	100.000	18298	4747	1.153	--
总计		77814	100.000	18298			

图62 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1163-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-20

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:52:27

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	80133	100.000	18871	4758	1.150	--
总计		80133	100.000	18871			

图63 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1164-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-29

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:55:53

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	78533	100.000	18424	4718	1.154	--
总计		78533	100.000	18424			

图64 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1165-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-38

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:59:18

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:34


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	79198	100.000	18690	4762	1.152	--
总计		79198	100.000	18690			

图65 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1166-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-47

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 21:02:44

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:36


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	78001	100.000	18350	4742	1.153	--
总计		78001	100.000	18350			

图66 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1167-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 21:06:10
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	97669	100.000	22136	4298	1.152	--
总计		97669	100.000	22136			

图67 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1168-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-27

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 21:09:36

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:42


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	97722	100.000	22113	4287	1.150	--
总计		97722	100.000	22113			

图68 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-1-1批(15mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2