



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-109/11-919-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-rj.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
: 1-9
: 50 μl
: 2025/01/11 22:03:21
: 2025/01/14 13:58:12
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-920-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:06:47

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	49142	100.000	11243	4296	1.153	--
总计		49142	100.000	11243			

图2 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-109/11-921-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-2.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
: 1-18
: 50 μl
: 2025/01/11 22:10:13
: 2025/01/14 13:58:20
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	49366	100.000	11238	4267	1.154	--
总计		49366	100.000	11238			

图3 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-922-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/11 22:13:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:24 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	49134	100.000	11215	4277	1.148	--
总计		49134	100.000	11215			

图4 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-109/11-923-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-4.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
: 1-18
: 50 μl
: 2025/01/11 22:17:05
: 2025/01/14 13:58:27
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	49228	100.000	11217	4267	1.153	--
总计		49228	100.000	11217			

图5 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-924-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:20:31

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	49175	100.000	11222	4271	1.147	--
总计		49175	100.000	11222			

图6 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-925-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:23:56

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	4651	100.000	1049	4254	1.219	--
总计		4651	100.000	1049			

图7 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-109/11-926-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-5min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
: 1-10
: 50 μl
: 2025/01/11 22:27:21
: 2025/01/14 13:58:36
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	5403	100.000	1213	4350	1.258	--
总计		5403	100.000	1213			

图8 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-927-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:30:47

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	5096	100.000	1136	4151	1.254	--
总计		5096	100.000	1136			

图9 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-928-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:34:13

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	5843	100.000	1295	4289	1.348	--
总计		5843	100.000	1295			

图10 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-929-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:37:37

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	5692	100.000	1260	4286	1.260	--
总计		5692	100.000	1260			

图11 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-109/11-930-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-5min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
: 1-46
: 50 μl
: 2025/01/11 22:41:02
: 2025/01/14 13:58:47
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	5153	100.000	1147	4328	1.388	--
总计		5153	100.000	1147			

图12 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-931-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:44:27

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	12440	100.000	2878	4502	1.165	--
总计		12440	100.000	2878			

图13 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-932-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:47:53

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	13188	100.000	3042	4523	1.185	--
总计		13188	100.000	3042			

图14 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-933-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:51:19

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	13261	100.000	3057	4526	1.191	--
总计		13261	100.000	3057			

图15 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-934-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:54:45

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:58:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	13813	100.000	3209	4554	1.180	--
总计		13813	100.000	3209			

图16 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-935-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 22:58:09

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	14150	100.000	3281	4541	1.176	--
总计		14150	100.000	3281			

图17 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-936-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:01:34

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	13522	100.000	3149	4577	1.190	--
总计		13522	100.000	3149			

图18 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-937-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:05:00

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	18996	100.000	4411	4569	1.178	--
总计		18996	100.000	4411			

图19 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-938-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/11 23:08:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:10 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	18966	100.000	4393	4560	1.182	--
总计		18966	100.000	4393			

图20 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-939-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/11 23:11:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:12 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	18928	100.000	4435	4609	1.158	--
总计		18928	100.000	4435			

图21 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-940-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:15:16

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	20097	100.000	4681	4594	1.167	--
总计		20097	100.000	4681			

图22 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-941-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:18:42

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	20256	100.000	4725	4608	1.166	--
总计		20256	100.000	4725			

图23 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-942-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:22:07

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	19140	100.000	4477	4614	1.178	--
总计		19140	100.000	4477			

图24 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-943-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:25:32

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	22585	100.000	5312	4631	1.163	--
总计		22585	100.000	5312			

图25 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-944-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:28:58

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	22151	100.000	5189	4599	1.171	--
总计		22151	100.000	5189			

图26 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-945-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/11 23:32:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:29 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	22407	100.000	5241	4627	1.166	--
总计		22407	100.000	5241			

图27 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-946-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:35:48

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	22968	100.000	5351	4603	1.171	--
总计		22968	100.000	5351			

图28 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-947-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:39:13

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	23479	100.000	5521	4638	1.164	--
总计		23479	100.000	5521			

图29 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-948-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/11 23:42:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:37 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	22903	100.000	5367	4616	1.167	--
总计		22903	100.000	5367			

图30 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-949-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:46:03

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	28359	100.000	6625	4621	1.168	--
总计		28359	100.000	6625			

图31 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-950-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/11 23:49:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:43 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	28180	100.000	6600	4642	1.164	--
总计		28180	100.000	6600			

图32 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-951-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:52:53

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	28118	100.000	6556	4598	1.165	--
总计		28118	100.000	6556			

图33 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-952-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:56:18

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	28561	100.000	6695	4621	1.169	--
总计		28561	100.000	6695			

图34 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-953-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/11 23:59:43

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	28366	100.000	6659	4610	1.155	--
总计		28366	100.000	6659			

图35 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-954-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:03:08

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	28858	100.000	6804	4656	1.160	--
总计		28858	100.000	6804			

图36 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-955-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:06:33

处理时间(V3) : 2025/01/14 13:59:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	33920	100.000	7980	4649	1.161	--
总计		33920	100.000	7980			

图37 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-956-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/12 00:09:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:00 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	33466	100.000	7882	4649	1.166	--
总计		33466	100.000	7882			

图38 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-957-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:13:23

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	33798	100.000	7927	4611	1.160	--
总计		33798	100.000	7927			

图39 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-109/11-958-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-45min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
: 1-33
: 50 μl
: 2025/01/12 00:16:48
: 2025/01/14 14:00:06
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	33781	100.000	7933	4622	1.162	--
总计		33781	100.000	7933			

图40 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-959-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/12 00:20:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:09 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	32460	100.000	7621	4620	1.160	--
总计		32460	100.000	7621			

图41 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-960-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:23:39

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	34143	100.000	8054	4649	1.159	--
总计		34143	100.000	8054			

图42 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-961-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:27:03

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	37763	100.000	8933	4678	1.155	--
总计		37763	100.000	8933			

图43 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-962-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:30:29

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	36559	100.000	8589	4624	1.157	--
总计		36559	100.000	8589			

图44 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-963-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/12 00:33:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:20 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	36948	100.000	8700	4646	1.158	--
总计		36948	100.000	8700			

图45 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-964-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:37:18

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	37400	100.000	8769	4626	1.162	--
总计		37400	100.000	8769			

图46 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-965-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:40:43

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	36297	100.000	8523	4622	1.154	--
总计		36297	100.000	8523			

图47 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-966-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/12 00:44:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:28 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	38140	100.000	9007	4680	1.156	--
总计		38140	100.000	9007			

图48 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-967-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-90min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:47:33

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	43038	100.000	10133	4660	1.159	--
总计		43038	100.000	10133			

图49 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-968-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-90min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:50:59

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	41369	100.000	9782	4675	1.154	--
总计		41369	100.000	9782			

图50 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-969-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-90min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:54:25

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	43811	100.000	10366	4686	1.156	--
总计		43811	100.000	10366			

图51 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-970-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-90min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 00:57:52

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	42437	100.000	10016	4674	1.159	--
总计		42437	100.000	10016			

图52 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-971-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-90min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:01:19

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	42800	100.000	10116	4672	1.158	--
总计		42800	100.000	10116			

图53 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-972-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-90min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:04:44

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	41927	100.000	9943	4685	1.159	--
总计		41927	100.000	9943			

图54 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-973-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/12 01:08:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:48 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	46366	100.000	10955	4685	1.158	--
总计		46366	100.000	10955			

图55 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-974-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-120min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:11:35

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	44163	100.000	10424	4672	1.156	--
总计		44163	100.000	10424			

图56 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-975-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-120min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:15:01

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	45015	100.000	10642	4676	1.153	--
总计		45015	100.000	10642			

图57 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-976-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-120min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:18:27

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	44859	100.000	10613	4675	1.158	--
总计		44859	100.000	10613			

图58 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-977-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-120min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:21:52

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:00:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	44149	100.000	10445	4679	1.159	--
总计		44149	100.000	10445			

图59 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-978-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-120min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:25:17

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:01:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	44860	100.000	10582	4666	1.156	--
总计		44860	100.000	10582			

图60 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-109/11-979-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p1-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
: 4-4
: 50 μl
: 2025/01/12 01:28:43
: 2025/01/14 14:01:06
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	45985	100.000	10878	4681	1.155	--
总计		45985	100.000	10878			

图61 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-109/11-980-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p2-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
: 4-13
: 50 μl
: 2025/01/12 01:32:09
: 2025/01/14 14:01:08
: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	45701	100.000	10832	4688	1.155	--
总计		45701	100.000	10832			

图62 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-981-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/12 01:35:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V3) : 2025/01/14 14:01:11 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	33746	100.000	7796	4529	1.168	--
总计		33746	100.000	7796			

图63 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-982-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:39:01

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:01:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	46110	100.000	10905	4670	1.156	--
总计		46110	100.000	10905			

图64 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-983-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:42:27

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:01:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	46663	100.000	11022	4679	1.157	--
总计		46663	100.000	11022			

图65 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-984-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:45:53

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:01:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	45649	100.000	10808	4678	1.155	--
总计		45649	100.000	10808			

图66 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-985-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:49:19

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:01:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	49310	100.000	11272	4295	1.155	--
总计		49310	100.000	11272			

图67 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-109/11-986-3 - zzp-25010201-2-2p-rcqx-7.5mg-jf50z-pH1.0jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250111-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2025/01/12 01:52:46

处理时间(V3) : 2025/01/14 14:01:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	49382	100.000	11274	4298	1.154	--
总计		49382	100.000	11274			

图68 托伐普坦口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25010201-2-2批(7.5mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2