




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-1-3 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:47:32
处理时间 (V3): 2025/01/17 11:01:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-2-3 - zzp-25011301-01p-rcqx-ph6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:50:56
处理时间 (V3): 2025/01/17 11:01:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	96835	100.000	15437	2713	1.107	--
总计		96835	100.000	15437			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-3-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:54:21
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	96877	100.000	15420	2709	1.107	--
总计		96877	100.000	15420			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-4-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:57:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	96764	100.000	15458	2716	1.106	--
总计		96764	100.000	15458			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-5-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:01:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	96763	100.000	15451	2720	1.107	--
总计		96763	100.000	15451			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-6-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:04:31
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	96850	100.000	15454	2715	1.106	--
总计		96850	100.000	15454			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-7-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:07:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	38199	100.000	6272	2872	1.102	--
总计		38199	100.000	6272			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-8-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:11:16
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	28228	100.000	4637	2878	1.102	--
总计		28228	100.000	4637			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-9-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:14:39
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	32659	100.000	5363	2865	1.100	--
总计		32659	100.000	5363			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-10-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:18:02
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	42355	100.000	6962	2875	1.102	--
总计		42355	100.000	6962			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-11-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:21:25
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	35635	100.000	5865	2878	1.102	--
总计		35635	100.000	5865			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-12-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:24:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	31801	100.000	5230	2867	1.103	--
总计		31801	100.000	5230			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-13-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:28:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	67885	100.000	11162	2878	1.103	--
总计		67885	100.000	11162			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-14-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:31:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:01:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	58472	100.000	9605	2874	1.104	--
总计		58472	100.000	9605			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-15-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:34:55
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	60295	100.000	9909	2873	1.103	--
总计		60295	100.000	9909			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-16-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:38:18
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	67183	100.000	11046	2879	1.103	--
总计		67183	100.000	11046			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-17-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:41:41
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	63057	100.000	10355	2876	1.103	--
总计		63057	100.000	10355			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-18-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:45:04
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	60076	100.000	9883	2877	1.103	--
总计		60076	100.000	9883			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-19-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:48:25
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	75425	100.000	12387	2870	1.104	--
总计		75425	100.000	12387			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-20-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:51:48
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	72326	100.000	11872	2875	1.104	--
总计		72326	100.000	11872			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-21-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:55:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	78326	100.000	12884	2882	1.105	--
总计		78326	100.000	12884			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-22-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:58:33
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	74156	100.000	12193	2875	1.104	--
总计		74156	100.000	12193			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-23-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:01:56
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	78974	100.000	12993	2883	1.103	--
总计		78974	100.000	12993			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-24-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:05:19
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	75046	100.000	12321	2877	1.104	--
总计		75046	100.000	12321			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-25-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:08:41
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	83850	100.000	13761	2872	1.104	--
总计		83850	100.000	13761			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-26-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:12:04
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	81695	100.000	13445	2883	1.105	--
总计		81695	100.000	13445			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-27-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:15:27
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	86389	100.000	14266	2902	1.101	--
总计		86389	100.000	14266			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-28-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:18:50
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	80446	100.000	13209	2871	1.104	--
总计		80446	100.000	13209			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-29-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:22:13
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	87690	100.000	14415	2878	1.105	--
总计		87690	100.000	14415			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-30-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:25:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	82114	100.000	13503	2886	1.104	--
总计		82114	100.000	13503			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-31-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:28:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	85014	100.000	13967	2875	1.105	--
总计		85014	100.000	13967			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-32-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:32:21
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	86939	100.000	14296	2881	1.105	--
总计		86939	100.000	14296			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-33-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:35:44
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	92517	100.000	15243	2894	1.104	--
总计		92517	100.000	15243			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-34-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:39:07
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:02:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	83090	100.000	13665	2879	1.104	--
总计		83090	100.000	13665			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-35-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:42:30
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:02:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	95866	100.000	15777	2885	1.104	--
总计		95866	100.000	15777			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-36-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:45:53
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	90476	100.000	14890	2887	1.104	--
总计		90476	100.000	14890			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-37-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:49:14
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	88406	100.000	14538	2884	1.103	--
总计		88406	100.000	14538			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-38-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:52:37
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:03:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	91534	100.000	15064	2882	1.104	--
总计		91534	100.000	15064			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-39-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:56:00
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	93652	100.000	15402	2879	1.104	--
总计		93652	100.000	15402			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-40-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:59:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	86801	100.000	14283	2883	1.105	--
总计		86801	100.000	14283			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-41-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:02:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	95031	100.000	15642	2886	1.105	--
总计		95031	100.000	15642			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-42-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:06:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	92078	100.000	15114	2870	1.105	--
总计		92078	100.000	15114			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-43-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:09:29
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	86690	100.000	14231	2867	1.103	--
总计		86690	100.000	14231			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-44-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:12:52
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	91973	100.000	15130	2881	1.104	--
总计		91973	100.000	15130			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-45-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:16:13
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	91816	100.000	15075	2873	1.104	--
总计		91816	100.000	15075			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-46-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:19:36
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	85780	100.000	14103	2877	1.104	--
总计		85780	100.000	14103			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-47-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:22:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	95808	100.000	15748	2879	1.104	--
总计		95808	100.000	15748			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-48-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:26:22
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	92627	100.000	15239	2882	1.105	--
总计		92627	100.000	15239			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-49-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:29:44
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	92467	100.000	15203	2885	1.105	--
总计		92467	100.000	15203			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-50-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:33:08
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	97187	100.000	15999	2886	1.104	--
总计		97187	100.000	15999			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-51-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:36:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	97539	100.000	16040	2882	1.104	--
总计		97539	100.000	16040			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-52-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:39:55
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:03:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	92321	100.000	15144	2871	1.105	--
总计		92321	100.000	15144			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-53-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:43:19
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	98355	100.000	16200	2887	1.104	--
总计		98355	100.000	16200			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-54-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:46:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	94274	100.000	15478	2878	1.105	--
总计		94274	100.000	15478			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-55-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:50:06
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	96506	100.000	15461	2723	1.108	--
总计		96506	100.000	15461			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-56-2 - zzp-25011301-01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:53:29
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	96554	100.000	15478	2715	1.107	--
总计		96554	100.000	15478			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-57-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:56:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:03:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-58-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:00:19
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	96666	100.000	15482	2721	1.107	--
总计		96666	100.000	15482			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-59-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:03:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	96725	100.000	15511	2724	1.108	--
总计		96725	100.000	15511			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-60-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:07:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	96777	100.000	15493	2725	1.108	--
总计		96777	100.000	15493			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-61-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:10:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	96737	100.000	15487	2724	1.109	--
总计		96737	100.000	15487			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-62-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:13:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	96590	100.000	15453	2728	1.108	--
总计		96590	100.000	15453			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-63-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:17:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	35550	100.000	5841	2875	1.104	--
总计		35550	100.000	5841			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-64-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:20:49
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	31831	100.000	5245	2888	1.102	--
总计		31831	100.000	5245			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-65-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:24:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	41088	100.000	6770	2893	1.104	--
总计		41088	100.000	6770			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-66-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:27:34
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	31755	100.000	5236	2887	1.104	--
总计		31755	100.000	5236			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-67-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:30:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	30880	100.000	5098	2901	1.103	--
总计		30880	100.000	5098			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-68-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:34:22
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	34974	100.000	5761	2895	1.104	--
总计		34974	100.000	5761			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-69-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:37:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	60088	100.000	9892	2888	1.107	--
总计		60088	100.000	9892			

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-70-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:41:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	54865	100.000	9042	2889	1.107	--
总计		54865	100.000	9042			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-71-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:44:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	63443	100.000	10443	2889	1.105	--
总计		63443	100.000	10443			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-72-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:47:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	55450	100.000	9128	2888	1.105	--
总计		55450	100.000	9128			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-73-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:51:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	57385	100.000	9453	2894	1.105	--
总计		57385	100.000	9453			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-74-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:54:46
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	58474	100.000	9626	2889	1.105	--
总计		58474	100.000	9626			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-75-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:58:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	68314	100.000	11245	2892	1.107	--
总计		68314	100.000	11245			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-76-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:01:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	67192	100.000	11069	2889	1.106	--
总计		67192	100.000	11069			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-77-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:04:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	74528	100.000	12285	2890	1.108	--
总计		74528	100.000	12285			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-78-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:08:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	69459	100.000	11438	2896	1.106	--
总计		69459	100.000	11438			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-79-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:11:46
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:04:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	70118	100.000	11546	2891	1.105	--
总计		70118	100.000	11546			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-80-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:15:10
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	69572	100.000	11488	2906	1.106	--
总计		69572	100.000	11488			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-81-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:18:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	74610	100.000	12280	2889	1.105	--
总计		74610	100.000	12280			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-82-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:21:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	75760	100.000	12496	2897	1.107	--
总计		75760	100.000	12496			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-83-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:25:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	78102	100.000	12858	2888	1.106	--
总计		78102	100.000	12858			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-84-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:28:46
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:05:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	74481	100.000	12272	2893	1.106	--
总计		74481	100.000	12272			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-85-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:32:10
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	78264	100.000	12881	2891	1.107	--
总计		78264	100.000	12881			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-86-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:35:33
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	74746	100.000	12317	2897	1.106	--
总计		74746	100.000	12317			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-87-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:38:56
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:05:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	77544	100.000	12789	2900	1.107	--
总计		77544	100.000	12789			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-88-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:42:20
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	87156	100.000	14380	2903	1.106	--
总计		87156	100.000	14380			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-89-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:45:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	82740	100.000	13624	2892	1.108	--
总计		82740	100.000	13624			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-90-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:49:10
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	82434	100.000	13585	2895	1.106	--
总计		82434	100.000	13585			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-91-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:52:34
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	83875	100.000	13845	2902	1.107	--
总计		83875	100.000	13845			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-92-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:55:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	81531	100.000	13416	2889	1.108	--
总计		81531	100.000	13416			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-93-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:59:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	85172	100.000	14050	2900	1.107	--
总计		85172	100.000	14050			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-94-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:02:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	87622	100.000	14442	2902	1.107	--
总计		87622	100.000	14442			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-95-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:06:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	85974	100.000	14165	2893	1.108	--
总计		85974	100.000	14165			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-96-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:09:36
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	86152	100.000	14190	2898	1.106	--
总计		86152	100.000	14190			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-97-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:13:00
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	86427	100.000	14248	2894	1.107	--
总计		86427	100.000	14248			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-98-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:16:24
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	84613	100.000	13936	2894	1.108	--
总计		84613	100.000	13936			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-99-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:19:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	90087	100.000	14884	2909	1.107	--
总计		90087	100.000	14884			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-100-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:23:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:05:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	89950	100.000	14828	2901	1.107	--
总计		89950	100.000	14828			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-101-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:26:37
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:05:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	87657	100.000	14488	2912	1.108	--
总计		87657	100.000	14488			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-102-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:30:01
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	90422	100.000	14898	2893	1.107	--
总计		90422	100.000	14898			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-103-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:33:25
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	88408	100.000	14586	2904	1.107	--
总计		88408	100.000	14586			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-104-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:36:49
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	87333	100.000	14410	2903	1.107	--
总计		87333	100.000	14410			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-105-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:40:14
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	88739	100.000	14629	2896	1.107	--
总计		88739	100.000	14629			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-106-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:43:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	92488	100.000	15263	2904	1.108	--
总计		92488	100.000	15263			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-107-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:47:01
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	91226	100.000	15051	2898	1.107	--
总计		91226	100.000	15051			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-108-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:50:26
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:06:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	92193	100.000	15206	2901	1.107	--
总计		92193	100.000	15206			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-109-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:53:50
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	90494	100.000	14927	2903	1.107	--
总计		90494	100.000	14927			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-110-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:57:15
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	93288	100.000	15398	2905	1.106	--
总计		93288	100.000	15398			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-111-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:00:39
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	96778	100.000	15567	2741	1.110	--
总计		96778	100.000	15567			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-112-2 - zzp-25011301-01p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:04:03
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	96797	100.000	15539	2738	1.111	--
总计		96797	100.000	15539			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-低硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-113-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:07:26
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:06:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-114-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:10:49
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	96643	100.000	15528	2735	1.110	--
总计		96643	100.000	15528			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-115-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:14:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	96701	100.000	15524	2735	1.110	--
总计		96701	100.000	15524			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-116-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:17:34
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	96647	100.000	15507	2740	1.110	--
总计		96647	100.000	15507			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-117-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:20:57
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	96590	100.000	15462	2743	1.110	--
总计		96590	100.000	15462			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-118-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:24:21
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:06:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	96421	100.000	15448	2741	1.111	--
总计		96421	100.000	15448			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-119-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:27:43
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	42677	100.000	7039	2899	1.108	--
总计		42677	100.000	7039			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-120-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:31:06
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:06:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	33060	100.000	5458	2904	1.105	--
总计		33060	100.000	5458			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-121-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:34:29
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	41369	100.000	6827	2898	1.105	--
总计		41369	100.000	6827			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-122-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:37:52
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:06:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	25690	100.000	4246	2901	1.106	--
总计		25690	100.000	4246			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-123-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:41:15
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	25923	100.000	4284	2908	1.105	--
总计		25923	100.000	4284			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-124-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:44:38
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	32180	100.000	5318	2909	1.105	--
总计		32180	100.000	5318			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-125-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:47:59
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:07:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	67278	100.000	11098	2899	1.109	--
总计		67278	100.000	11098			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-126-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:51:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	56050	100.000	9261	2907	1.107	--
总计		56050	100.000	9261			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-127-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:54:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	64149	100.000	10599	2911	1.110	--
总计		64149	100.000	10599			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-128-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:58:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	48949	100.000	8089	2910	1.111	--
总计		48949	100.000	8089			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-129-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:01:30
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	49293	100.000	8154	2918	1.109	--
总计		49293	100.000	8154			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-130-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:04:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	60116	100.000	9930	2908	1.108	--
总计		60116	100.000	9930			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-131-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:08:13
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	76504	100.000	12637	2911	1.109	--
总计		76504	100.000	12637			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-132-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:11:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	72850	100.000	12038	2908	1.108	--
总计		72850	100.000	12038			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-133-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:14:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	74850	100.000	12380	2918	1.109	--
总计		74850	100.000	12380			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-134-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:18:21
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	65676	100.000	10861	2916	1.109	--
总计		65676	100.000	10861			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-135-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:21:43
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	63429	100.000	10466	2906	1.109	--
总计		63429	100.000	10466			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-136-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:25:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	70651	100.000	11680	2912	1.109	--
总计		70651	100.000	11680			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-137-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:28:29
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	85386	100.000	14142	2931	1.110	--
总计		85386	100.000	14142			

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-138-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:31:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	79715	100.000	13152	2904	1.110	--
总计		79715	100.000	13152			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-139-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:35:13
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:07:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	79440	100.000	13112	2906	1.110	--
总计		79440	100.000	13112			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-140-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:38:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	74663	100.000	12317	2903	1.109	--
总计		74663	100.000	12317			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-141-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:41:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	74652	100.000	12334	2911	1.109	--
总计		74652	100.000	12334			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-142-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:45:20
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	77058	100.000	12728	2911	1.109	--
总计		77058	100.000	12728			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-143-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:48:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:07:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	96384	100.000	15951	2922	1.110	--
总计		96384	100.000	15951			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-144-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:52:05
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	83261	100.000	13768	2912	1.109	--
总计		83261	100.000	13768			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-145-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:55:28
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	85319	100.000	14086	2904	1.111	--
总计		85319	100.000	14086			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-146-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:58:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	86853	100.000	14355	2913	1.110	--
总计		86853	100.000	14355			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-147-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:02:13
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	87321	100.000	14434	2917	1.111	--
总计		87321	100.000	14434			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-148-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:05:36
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	85767	100.000	14184	2918	1.111	--
总计		85767	100.000	14184			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-149-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:08:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	89538	100.000	14801	2914	1.112	--
总计		89538	100.000	14801			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-150-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:12:19
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	89008	100.000	14714	2914	1.111	--
总计		89008	100.000	14714			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-151-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:15:41
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	87247	100.000	14441	2918	1.110	--
总计		87247	100.000	14441			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-152-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:19:03
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	95395	100.000	15792	2918	1.112	--
总计		95395	100.000	15792			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-153-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:22:26
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	93614	100.000	15472	2910	1.110	--
总计		93614	100.000	15472			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-154-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:25:48
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	85393	100.000	14103	2909	1.111	--
总计		85393	100.000	14103			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-155-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:29:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	99324	100.000	16497	2956	1.111	--
总计		99324	100.000	16497			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-156-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:32:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	88633	100.000	14634	2909	1.112	--
总计		88633	100.000	14634			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-157-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:35:53
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	91554	100.000	15150	2923	1.111	--
总计		91554	100.000	15150			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-158-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:39:16
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	100975	100.000	16698	2924	1.111	--
总计		100975	100.000	16698			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-159-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:42:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	99691	100.000	16487	2918	1.112	--
总计		99691	100.000	16487			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-160-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:45:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	85071	100.000	14046	2916	1.112	--
总计		85071	100.000	14046			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-161-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:49:21
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	102030	100.000	16896	2932	1.113	--
总计		102030	100.000	16896			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-162-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:52:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	94550	100.000	15657	2928	1.111	--
总计		94550	100.000	15657			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-163-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:56:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:08:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	97838	100.000	16178	2924	1.112	--
总计		97838	100.000	16178			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-164-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:59:30
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	103174	100.000	17023	2914	1.113	--
总计		103174	100.000	17023			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-165-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:02:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	100355	100.000	16566	2915	1.112	--
总计		100355	100.000	16566			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-166-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:06:14
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	92044	100.000	15168	2923	1.113	--
总计		92044	100.000	15168			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-167-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:09:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	96684	100.000	15526	2756	1.115	--
总计		96684	100.000	15526			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-168-2 - zzp-25011301-01p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:12:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	96540	100.000	15490	2755	1.114	--
总计		96540	100.000	15490			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-中硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-169-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:16:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-170-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:19:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	97064	100.000	15611	2766	1.115	--
总计		97064	100.000	15611			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-171-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:23:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	97258	100.000	15625	2761	1.113	--
总计		97258	100.000	15625			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-172-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:26:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	96924	100.000	15629	2772	1.114	--
总计		96924	100.000	15629			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-173-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:29:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	97120	100.000	15648	2765	1.114	--
总计		97120	100.000	15648			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-174-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:33:22
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	96855	100.000	15617	2769	1.113	--
总计		96855	100.000	15617			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-175-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:36:46
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	34259	100.000	5620	2919	1.111	--
总计		34259	100.000	5620			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-176-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:40:10
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	42984	100.000	7098	2927	1.109	--
总计		42984	100.000	7098			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-177-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:43:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	39542	100.000	6507	2933	1.113	--
总计		39542	100.000	6507			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-178-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:46:56
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	39344	100.000	6488	2929	1.112	--
总计		39344	100.000	6488			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-179-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:50:18
处理时间 (V2) : 2025/01/17 11:09:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	35712	100.000	5878	2920	1.112	--
总计		35712	100.000	5878			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-180-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:53:41
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	38985	100.000	6436	2926	1.112	--
总计		38985	100.000	6436			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-181-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:57:04
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	56889	100.000	9378	2924	1.113	--
总计		56889	100.000	9378			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-182-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:00:27
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	64526	100.000	10659	2927	1.112	--
总计		64526	100.000	10659			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-183-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:03:49
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	64288	100.000	10585	2920	1.113	--
总计		64288	100.000	10585			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-184-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:07:13
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	63461	100.000	10477	2910	1.111	--
总计		63461	100.000	10477			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-185-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:10:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:09:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	58187	100.000	9605	2926	1.113	--
总计		58187	100.000	9605			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-186-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:13:57
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	64625	100.000	10642	2926	1.111	--
总计		64625	100.000	10642			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-187-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:17:21
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	69074	100.000	11380	2923	1.113	--
总计		69074	100.000	11380			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-188-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:20:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	74527	100.000	12322	2929	1.113	--
总计		74527	100.000	12322			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-189-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:24:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	72112	100.000	11886	2925	1.113	--
总计		72112	100.000	11886			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-190-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:27:31
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	73422	100.000	12141	2923	1.111	--
总计		73422	100.000	12141			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-191-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:30:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	69379	100.000	11402	2923	1.112	--
总计		69379	100.000	11402			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-192-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:34:18
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	74406	100.000	12267	2926	1.113	--
总计		74406	100.000	12267			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-193-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:37:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	75831	100.000	12511	2927	1.113	--
总计		75831	100.000	12511			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-194-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:41:05
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	79097	100.000	13070	2925	1.113	--
总计		79097	100.000	13070			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-195-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:44:29
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	75968	100.000	12538	2917	1.113	--
总计		75968	100.000	12538			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-196-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:47:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	78590	100.000	12957	2929	1.113	--
总计		78590	100.000	12957			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-197-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:51:17
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	71950	100.000	11896	2923	1.112	--
总计		71950	100.000	11896			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-198-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:54:40
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	78315	100.000	12916	2928	1.114	--
总计		78315	100.000	12916			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-199-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:58:03
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	78966	100.000	13024	2925	1.112	--
总计		78966	100.000	13024			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-200-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:01:26
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	82135	100.000	13524	2929	1.112	--
总计		82135	100.000	13524			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-201-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:04:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	82023	100.000	13493	2927	1.114	--
总计		82023	100.000	13493			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-202-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:08:14
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	84301	100.000	13890	2938	1.113	--
总计		84301	100.000	13890			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-203-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:11:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	78074	100.000	12861	2926	1.113	--
总计		78074	100.000	12861			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-204-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:15:01
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	84359	100.000	13897	2935	1.113	--
总计		84359	100.000	13897			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-205-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:18:25
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	82056	100.000	13527	2915	1.114	--
总计		82056	100.000	13527			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-206-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:21:48
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:10:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	84568	100.000	13906	2925	1.114	--
总计		84568	100.000	13906			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-207-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:25:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	82140	100.000	13523	2924	1.113	--
总计		82140	100.000	13523			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-208-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:28:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	85353	100.000	14034	2921	1.113	--
总计		85353	100.000	14034			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-209-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:31:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	77876	100.000	12810	2931	1.113	--
总计		77876	100.000	12810			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-210-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:35:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	82220	100.000	13516	2927	1.113	--
总计		82220	100.000	13516			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-211-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:38:46
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	83936	100.000	13821	2933	1.113	--
总计		83936	100.000	13821			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-212-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:42:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	86302	100.000	14234	2930	1.112	--
总计		86302	100.000	14234			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-213-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:45:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	85181	100.000	14052	2933	1.113	--
总计		85181	100.000	14052			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-214-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:48:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	87573	100.000	14429	2934	1.113	--
总计		87573	100.000	14429			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-215-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:52:22
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	82326	100.000	13589	2935	1.112	--
总计		82326	100.000	13589			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-216-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:55:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	88578	100.000	14611	2933	1.113	--
总计		88578	100.000	14611			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-217-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:59:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	88960	100.000	14639	2918	1.113	--
总计		88960	100.000	14639			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-218-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:02:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	89163	100.000	14635	2920	1.114	--
总计		89163	100.000	14635			

图218 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-219-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:05:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	88600	100.000	14576	2920	1.114	--
总计		88600	100.000	14576			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-220-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:09:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	91131	100.000	15022	2928	1.113	--
总计		91131	100.000	15022			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-221-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:12:46
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	88624	100.000	14606	2931	1.113	--
总计		88624	100.000	14606			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-222-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:16:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	92685	100.000	15271	2937	1.112	--
总计		92685	100.000	15271			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-223-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:19:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	97481	100.000	15709	2771	1.114	--
总计		97481	100.000	15709			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-3/27-224-2 - zzp-25011301-01p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX276-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:22:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:11:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	97384	100.000	15701	2771	1.115	--
总计		97384	100.000	15701			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-01批-高硬度-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2