




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-241-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:47:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-242-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:51:15
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	97529	100.000	16507	2841	1.132	--
总计		97529	100.000	16507			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-243-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:54:39
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.060	97967	100.000	16497	2825	1.130	--
总计		97967	100.000	16497			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-244-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:58:03
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	98015	100.000	16545	2832	1.131	--
总计		98015	100.000	16545			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-245-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:01:27
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.060	98073	100.000	16514	2823	1.132	--
总计		98073	100.000	16514			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-246-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:04:49
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.059	97919	100.000	16485	2825	1.131	--
总计		97919	100.000	16485			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-247-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:08:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	43783	100.000	7699	3099	1.128	--
总计		43783	100.000	7699			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-248-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:11:34
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	37302	100.000	6574	3125	1.133	--
总计		37302	100.000	6574			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-249-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:14:57
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	38949	100.000	6832	3109	1.130	--
总计		38949	100.000	6832			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-250-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:18:20
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	38474	100.000	6720	3102	1.134	--
总计		38474	100.000	6720			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-251-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:21:43
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	48095	100.000	8459	3123	1.133	--
总计		48095	100.000	8459			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-252-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:25:05
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	45179	100.000	7941	3114	1.135	--
总计		45179	100.000	7941			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-253-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:28:27
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	65386	100.000	11470	3104	1.132	--
总计		65386	100.000	11470			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-254-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:31:49
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	59851	100.000	10492	3105	1.135	--
总计		59851	100.000	10492			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-255-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:35:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	61700	100.000	10796	3097	1.132	--
总计		61700	100.000	10796			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-256-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:38:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:21:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	63754	100.000	11203	3100	1.131	--
总计		63754	100.000	11203			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-257-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:41:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	68529	100.000	12089	3120	1.133	--
总计		68529	100.000	12089			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-258-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:45:20
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	66594	100.000	11669	3099	1.134	--
总计		66594	100.000	11669			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-259-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:48:43
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	74183	100.000	13077	3100	1.131	--
总计		74183	100.000	13077			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-260-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:52:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	70175	100.000	12334	3113	1.132	--
总计		70175	100.000	12334			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-261-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:55:29
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	72357	100.000	12777	3123	1.130	--
总计		72357	100.000	12777			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-262-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:58:52
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	73988	100.000	13046	3121	1.132	--
总计		73988	100.000	13046			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-263-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:02:15
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	77506	100.000	13620	3123	1.130	--
总计		77506	100.000	13620			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-264-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:05:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	75130	100.000	13224	3107	1.130	--
总计		75130	100.000	13224			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-265-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:09:00
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	77360	100.000	13591	3091	1.130	--
总计		77360	100.000	13591			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-266-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:12:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	75885	100.000	13320	3103	1.133	--
总计		75885	100.000	13320			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-267-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:15:46
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	79608	100.000	13997	3109	1.131	--
总计		79608	100.000	13997			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-268-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:19:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	79373	100.000	13922	3108	1.132	--
总计		79373	100.000	13922			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-269-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:22:31
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	81876	100.000	14379	3117	1.132	--
总计		81876	100.000	14379			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-270-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:25:53
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	79637	100.000	13995	3119	1.132	--
总计		79637	100.000	13995			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-271-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:29:16
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	80614	100.000	14146	3107	1.131	--
总计		80614	100.000	14146			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-272-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:32:39
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	79382	100.000	13945	3103	1.131	--
总计		79382	100.000	13945			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-273-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:36:02
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	82119	100.000	14438	3111	1.125	--
总计		82119	100.000	14438			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-274-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:39:25
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	83387	100.000	14692	3105	1.131	--
总计		83387	100.000	14692			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-275-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:42:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	85025	100.000	14973	3109	1.133	--
总计		85025	100.000	14973			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-276-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:46:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	81543	100.000	14316	3123	1.129	--
总计		81543	100.000	14316			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-277-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:49:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:22:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	82685	100.000	14506	3110	1.131	--
总计		82685	100.000	14506			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-278-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:52:55
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	82092	100.000	14412	3122	1.132	--
总计		82092	100.000	14412			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-279-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:56:18
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	86447	100.000	15201	3105	1.135	--
总计		86447	100.000	15201			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-280-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:59:40
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	86179	100.000	15187	3113	1.133	--
总计		86179	100.000	15187			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-281-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:03:02
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	87359	100.000	15384	3111	1.137	--
总计		87359	100.000	15384			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-282-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:06:24
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	84346	100.000	14835	3110	1.133	--
总计		84346	100.000	14835			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-283-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:09:46
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	83257	100.000	14600	3102	1.134	--
总计		83257	100.000	14600			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-284-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:13:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	82476	100.000	14514	3111	1.131	--
总计		82476	100.000	14514			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-285-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:16:30
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	85941	100.000	15114	3104	1.133	--
总计		85941	100.000	15114			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-286-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:19:52
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	86849	100.000	15254	3109	1.133	--
总计		86849	100.000	15254			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-287-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:23:14
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	87262	100.000	15359	3130	1.131	--
总计		87262	100.000	15359			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-288-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:26:36
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	85357	100.000	15025	3115	1.131	--
总计		85357	100.000	15025			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-289-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:30:00
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	89912	100.000	15801	3111	1.136	--
总计		89912	100.000	15801			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-290-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:33:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	88345	100.000	15475	3106	1.129	--
总计		88345	100.000	15475			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-291-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:36:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	91569	100.000	16035	3108	1.133	--
总计		91569	100.000	16035			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-292-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:40:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	90076	100.000	15790	3109	1.133	--
总计		90076	100.000	15790			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-293-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:43:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	89694	100.000	15729	3113	1.133	--
总计		89694	100.000	15729			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-294-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:46:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	88496	100.000	15545	3102	1.131	--
总计		88496	100.000	15545			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-295-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:50:21
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	97633	100.000	16481	2836	1.133	--
总计		97633	100.000	16481			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-296-2 - zzp-25011301-02p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:53:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	97731	100.000	16537	2831	1.129	--
总计		97731	100.000	16537			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-297-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:57:10
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-298-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:00:33
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.059	98099	100.000	16565	2845	1.132	--
总计		98099	100.000	16565			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-299-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:03:57
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:23:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.060	97866	100.000	16554	2840	1.130	--
总计		97866	100.000	16554			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-300-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:07:22
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.061	98107	100.000	16599	2845	1.131	--
总计		98107	100.000	16599			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-301-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:10:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.061	98098	100.000	16599	2839	1.134	--
总计		98098	100.000	16599			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-302-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:14:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.063	98328	100.000	16632	2837	1.131	--
总计		98328	100.000	16632			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-303-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:17:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	29136	100.000	5131	3105	1.127	--
总计		29136	100.000	5131			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-304-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:20:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	31949	100.000	5610	3123	1.131	--
总计		31949	100.000	5610			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-305-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:24:22
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	38771	100.000	6800	3103	1.134	--
总计		38771	100.000	6800			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-306-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:27:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	31819	100.000	5606	3116	1.129	--
总计		31819	100.000	5606			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-307-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:31:08
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	34402	100.000	6061	3132	1.134	--
总计		34402	100.000	6061			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-308-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:34:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	30454	100.000	5383	3127	1.132	--
总计		30454	100.000	5383			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-309-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:37:56
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	50587	100.000	8874	3102	1.132	--
总计		50587	100.000	8874			

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-310-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:41:20
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	56707	100.000	10015	3130	1.134	--
总计		56707	100.000	10015			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-311-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:44:44
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	62829	100.000	11047	3119	1.134	--
总计		62829	100.000	11047			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-312-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:48:08
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	55251	100.000	9706	3104	1.128	--
总计		55251	100.000	9706			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-313-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:51:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	62253	100.000	10936	3114	1.134	--
总计		62253	100.000	10936			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-314-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:54:55
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	53744	100.000	9424	3106	1.136	--
总计		53744	100.000	9424			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-315-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:58:18
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	62548	100.000	10975	3102	1.135	--
总计		62548	100.000	10975			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-316-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:01:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	71710	100.000	12647	3125	1.132	--
总计		71710	100.000	12647			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-317-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:05:06
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	77691	100.000	13625	3121	1.134	--
总计		77691	100.000	13625			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-318-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:08:30
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	67519	100.000	11872	3110	1.130	--
总计		67519	100.000	11872			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-319-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:11:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	74602	100.000	13072	3110	1.135	--
总计		74602	100.000	13072			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-320-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:15:16
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:24:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	66106	100.000	11661	3130	1.133	--
总计		66106	100.000	11661			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-321-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:18:40
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	68806	100.000	12062	3105	1.136	--
总计		68806	100.000	12062			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-322-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:22:04
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	76655	100.000	13484	3116	1.131	--
总计		76655	100.000	13484			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-323-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:25:27
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	81308	100.000	14307	3119	1.133	--
总计		81308	100.000	14307			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-324-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:28:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	73554	100.000	12951	3127	1.134	--
总计		73554	100.000	12951			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-325-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:32:15
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	81624	100.000	14340	3119	1.133	--
总计		81624	100.000	14340			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-326-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:35:39
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	73055	100.000	12844	3120	1.135	--
总计		73055	100.000	12844			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-327-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:39:04
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	75187	100.000	13244	3116	1.134	--
总计		75187	100.000	13244			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-328-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:42:28
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	83698	100.000	14703	3116	1.134	--
总计		83698	100.000	14703			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-329-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:45:53
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	84751	100.000	14931	3121	1.137	--
总计		84751	100.000	14931			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-330-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:49:17
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	80445	100.000	14131	3115	1.132	--
总计		80445	100.000	14131			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-331-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:52:41
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	86584	100.000	15202	3112	1.131	--
总计		86584	100.000	15202			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-332-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:56:05
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	81405	100.000	14333	3128	1.133	--
总计		81405	100.000	14333			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-333-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:59:29
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	79698	100.000	13994	3113	1.134	--
总计		79698	100.000	13994			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-334-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:02:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	87392	100.000	15384	3118	1.132	--
总计		87392	100.000	15384			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-335-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:06:18
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	89382	100.000	15726	3114	1.134	--
总计		89382	100.000	15726			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-336-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:09:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	85532	100.000	15030	3115	1.136	--
总计		85532	100.000	15030			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-337-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:13:06
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	92932	100.000	16269	3107	1.135	--
总计		92932	100.000	16269			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-338-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:16:30
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	85533	100.000	15062	3117	1.135	--
总计		85533	100.000	15062			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-339-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:19:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	81109	100.000	14234	3104	1.133	--
总计		81109	100.000	14234			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-340-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:23:19
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	90846	100.000	16018	3116	1.133	--
总计		90846	100.000	16018			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-341-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:26:43
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	90207	100.000	15910	3127	1.133	--
总计		90207	100.000	15910			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-342-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:30:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:25:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	88301	100.000	15535	3112	1.132	--
总计		88301	100.000	15535			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-343-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:33:31
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	95666	100.000	16833	3113	1.133	--
总计		95666	100.000	16833			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-344-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:36:55
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	86927	100.000	15264	3111	1.134	--
总计		86927	100.000	15264			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-345-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:40:18
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	93960	100.000	16588	3126	1.129	--
总计		93960	100.000	16588			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-346-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:43:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	95904	100.000	16891	3115	1.132	--
总计		95904	100.000	16891			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-347-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:47:06
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	95520	100.000	16825	3122	1.136	--
总计		95520	100.000	16825			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-348-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:50:31
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	93106	100.000	16403	3112	1.133	--
总计		93106	100.000	16403			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-349-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:53:55
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	97624	100.000	17195	3117	1.131	--
总计		97624	100.000	17195			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-350-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:57:19
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	94114	100.000	16649	3140	1.133	--
总计		94114	100.000	16649			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-351-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:00:44
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.063	98310	100.000	16633	2843	1.133	--
总计		98310	100.000	16633			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-352-2 - zzp-25011301-02p-dyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:04:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.061	98264	100.000	16627	2843	1.136	--
总计		98264	100.000	16627			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-低硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-353-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:07:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-354-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:10:55
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.061	98241	100.000	16612	2840	1.135	--
总计		98241	100.000	16612			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-355-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:14:18
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.061	98124	100.000	16586	2838	1.134	--
总计		98124	100.000	16586			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-356-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:17:41
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.062	98240	100.000	16601	2833	1.132	--
总计		98240	100.000	16601			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-357-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:21:04
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.061	97921	100.000	16549	2837	1.132	--
总计		97921	100.000	16549			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-358-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:24:27
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.062	97617	100.000	16510	2836	1.131	--
总计		97617	100.000	16510			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-359-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:27:50
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	33394	100.000	5875	3101	1.137	--
总计		33394	100.000	5875			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-360-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:31:13
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	27625	100.000	4872	3124	1.129	--
总计		27625	100.000	4872			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-361-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:34:34
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	25852	100.000	4566	3127	1.134	--
总计		25852	100.000	4566			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-362-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:37:57
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	29530	100.000	5186	3098	1.146	--
总计		29530	100.000	5186			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-363-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:41:19
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:26:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	28063	100.000	4942	3145	1.136	--
总计		28063	100.000	4942			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-364-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:44:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	26396	100.000	4635	3126	1.136	--
总计		26396	100.000	4635			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-365-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:48:03
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	55674	100.000	9816	3120	1.135	--
总计		55674	100.000	9816			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-366-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:51:26
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	55535	100.000	9744	3104	1.137	--
总计		55535	100.000	9744			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-367-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:54:48
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	50727	100.000	8916	3113	1.137	--
总计		50727	100.000	8916			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-368-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:58:10
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	53774	100.000	9470	3117	1.136	--
总计		53774	100.000	9470			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-369-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:01:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	50071	100.000	8867	3136	1.136	--
总计		50071	100.000	8867			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-370-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:04:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	50605	100.000	8915	3132	1.139	--
总计		50605	100.000	8915			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-371-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:08:17
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	68155	100.000	11989	3109	1.132	--
总计		68155	100.000	11989			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-372-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:11:38
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	68292	100.000	12049	3113	1.138	--
总计		68292	100.000	12049			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-373-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:15:00
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	64260	100.000	11347	3121	1.137	--
总计		64260	100.000	11347			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-374-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:18:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	66832	100.000	11774	3117	1.135	--
总计		66832	100.000	11774			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-375-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:21:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	65057	100.000	11494	3136	1.131	--
总计		65057	100.000	11494			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-376-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:25:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	63213	100.000	11159	3133	1.140	--
总计		63213	100.000	11159			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-377-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:28:28
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	74481	100.000	13131	3129	1.136	--
总计		74481	100.000	13131			

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-378-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:31:50
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	75622	100.000	13325	3114	1.135	--
总计		75622	100.000	13325			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-379-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:35:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	71719	100.000	12647	3125	1.135	--
总计		71719	100.000	12647			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-380-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:38:34
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	73610	100.000	12971	3112	1.133	--
总计		73610	100.000	12971			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-381-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:41:55
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	71346	100.000	12600	3128	1.137	--
总计		71346	100.000	12600			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-382-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:45:16
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	71049	100.000	12553	3127	1.134	--
总计		71049	100.000	12553			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-383-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:48:38
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	80578	100.000	14200	3117	1.135	--
总计		80578	100.000	14200			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-384-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:52:00
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	82204	100.000	14507	3127	1.137	--
总计		82204	100.000	14507			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-385-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:55:22
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:27:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	77887	100.000	13737	3118	1.138	--
总计		77887	100.000	13737			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-386-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:58:44
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	80311	100.000	14167	3128	1.134	--
总计		80311	100.000	14167			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-387-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:02:06
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	79984	100.000	14114	3121	1.135	--
总计		79984	100.000	14114			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-388-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:05:28
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	77511	100.000	13679	3125	1.136	--
总计		77511	100.000	13679			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-389-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:08:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	85031	100.000	15008	3116	1.133	--
总计		85031	100.000	15008			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-390-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:12:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	85665	100.000	15081	3114	1.136	--
总计		85665	100.000	15081			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-391-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:15:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	81780	100.000	14427	3124	1.138	--
总计		81780	100.000	14427			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-392-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:19:22
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	84163	100.000	14825	3115	1.134	--
总计		84163	100.000	14825			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-393-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:22:44
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	85647	100.000	15124	3128	1.139	--
总计		85647	100.000	15124			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-394-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:26:05
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	82306	100.000	14495	3121	1.138	--
总计		82306	100.000	14495			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-395-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:29:26
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	85688	100.000	15113	3124	1.139	--
总计		85688	100.000	15113			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-396-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:32:48
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	86643	100.000	15281	3126	1.136	--
总计		86643	100.000	15281			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-397-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:36:08
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	81311	100.000	14308	3110	1.134	--
总计		81311	100.000	14308			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-398-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:39:30
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	83687	100.000	14654	3109	1.137	--
总计		83687	100.000	14654			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-399-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:42:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	84104	100.000	14801	3112	1.138	--
总计		84104	100.000	14801			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-400-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:46:13
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	81594	100.000	14380	3115	1.137	--
总计		81594	100.000	14380			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-401-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:49:36
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	92468	100.000	16371	3132	1.138	--
总计		92468	100.000	16371			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-402-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:52:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	91586	100.000	16105	3125	1.135	--
总计		91586	100.000	16105			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-403-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:56:21
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	89977	100.000	15844	3114	1.138	--
总计		89977	100.000	15844			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-404-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:59:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	90550	100.000	15995	3132	1.135	--
总计		90550	100.000	15995			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-405-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:03:05
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	92068	100.000	16243	3134	1.136	--
总计		92068	100.000	16243			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-406-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:06:26
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:28:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	93456	100.000	16461	3122	1.138	--
总计		93456	100.000	16461			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-407-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:09:48
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	98435	100.000	16711	2856	1.138	--
总计		98435	100.000	16711			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-408-2 - zzp-25011301-02p-zyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:13:11
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	98559	100.000	16739	2865	1.138	--
总计		98559	100.000	16739			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-中硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-409-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:16:36
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-410-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:19:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	98769	100.000	16728	2852	1.138	--
总计		98769	100.000	16728			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-411-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:23:24
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	98597	100.000	16705	2846	1.136	--
总计		98597	100.000	16705			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-412-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:26:48
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	98611	100.000	16708	2850	1.140	--
总计		98611	100.000	16708			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-413-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:30:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	98598	100.000	16727	2858	1.136	--
总计		98598	100.000	16727			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-414-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:33:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.064	98424	100.000	16691	2858	1.137	--
总计		98424	100.000	16691			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-415-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:36:59
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	29579	100.000	5220	3126	1.129	--
总计		29579	100.000	5220			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-416-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:40:23
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	28442	100.000	5025	3139	1.138	--
总计		28442	100.000	5025			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-417-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:43:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	30025	100.000	5290	3107	1.133	--
总计		30025	100.000	5290			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-418-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:47:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	28524	100.000	5053	3129	1.135	--
总计		28524	100.000	5053			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-419-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:50:31
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	33570	100.000	5898	3098	1.128	--
总计		33570	100.000	5898			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-420-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:53:53
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	28540	100.000	5020	3117	1.138	--
总计		28540	100.000	5020			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-421-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:57:15
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	53594	100.000	9428	3117	1.139	--
总计		53594	100.000	9428			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-422-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:00:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	53940	100.000	9530	3132	1.136	--
总计		53940	100.000	9530			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-423-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:04:01
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	60511	100.000	10686	3140	1.138	--
总计		60511	100.000	10686			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-424-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:07:24
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	53517	100.000	9460	3133	1.138	--
总计		53517	100.000	9460			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-425-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:10:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	57020	100.000	10058	3112	1.136	--
总计		57020	100.000	10058			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-426-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:14:07
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	54023	100.000	9518	3125	1.136	--
总计		54023	100.000	9518			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-427-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:17:31
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:29:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	66096	100.000	11654	3123	1.140	--
总计		66096	100.000	11654			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-428-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:20:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	60624	100.000	10625	3094	1.141	--
总计		60624	100.000	10625			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-429-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:24:17
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	74474	100.000	13110	3125	1.140	--
总计		74474	100.000	13110			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-430-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:27:39
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	66382	100.000	11716	3137	1.141	--
总计		66382	100.000	11716			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-431-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:31:03
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	67639	100.000	11949	3129	1.133	--
总计		67639	100.000	11949			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-432-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:34:26
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	66338	100.000	11713	3125	1.140	--
总计		66338	100.000	11713			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-433-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:37:48
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	70956	100.000	12522	3131	1.137	--
总计		70956	100.000	12522			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-434-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:41:12
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	72421	100.000	12766	3126	1.136	--
总计		72421	100.000	12766			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-435-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:44:35
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	83618	100.000	14718	3127	1.139	--
总计		83618	100.000	14718			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-436-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:47:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	73094	100.000	12887	3119	1.137	--
总计		73094	100.000	12887			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-437-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:51:21
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	74759	100.000	13163	3129	1.139	--
总计		74759	100.000	13163			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-438-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:54:45
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	72345	100.000	12771	3124	1.139	--
总计		72345	100.000	12771			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-439-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 00:58:09
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	75734	100.000	13347	3130	1.142	--
总计		75734	100.000	13347			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-440-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:01:32
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	80825	100.000	14218	3117	1.142	--
总计		80825	100.000	14218			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-441-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:04:55
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	90876	100.000	15977	3118	1.142	--
总计		90876	100.000	15977			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-442-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:08:19
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	77779	100.000	13677	3116	1.138	--
总计		77779	100.000	13677			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-443-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:11:43
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	78415	100.000	13813	3125	1.137	--
总计		78415	100.000	13813			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-444-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:15:06
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	78364	100.000	13829	3134	1.139	--
总计		78364	100.000	13829			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-445-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:18:30
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	79207	100.000	13970	3132	1.137	--
总计		79207	100.000	13970			

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-446-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:21:54
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	84508	100.000	14892	3135	1.137	--
总计		84508	100.000	14892			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-447-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:25:18
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	96373	100.000	16985	3128	1.141	--
总计		96373	100.000	16985			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-448-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:28:42
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	83195	100.000	14666	3126	1.139	--
总计		83195	100.000	14666			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-449-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:32:04
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:30:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	80980	100.000	14273	3128	1.138	--
总计		80980	100.000	14273			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-450-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:35:27
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	83636	100.000	14719	3129	1.137	--
总计		83636	100.000	14719			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-451-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:38:51
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	77170	100.000	13560	3122	1.139	--
总计		77170	100.000	13560			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-452-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:42:15
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	84932	100.000	14983	3133	1.138	--
总计		84932	100.000	14983			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-453-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:45:39
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	97726	100.000	17235	3131	1.138	--
总计		97726	100.000	17235			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-454-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:49:02
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	84573	100.000	14849	3133	1.140	--
总计		84573	100.000	14849			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-455-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:52:25
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	84951	100.000	14949	3139	1.139	--
总计		84951	100.000	14949			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-456-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:55:49
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	86274	100.000	15239	3135	1.140	--
总计		86274	100.000	15239			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-457-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 01:59:13
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	83985	100.000	14734	3122	1.139	--
总计		83985	100.000	14734			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-458-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:02:37
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	89704	100.000	15749	3128	1.138	--
总计		89704	100.000	15749			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-459-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:06:00
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	99941	100.000	17583	3120	1.139	--
总计		99941	100.000	17583			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-460-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:09:24
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	87968	100.000	15502	3150	1.137	--
总计		87968	100.000	15502			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-461-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:12:47
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	86252	100.000	15229	3134	1.138	--
总计		86252	100.000	15229			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-462-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:16:10
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	88521	100.000	15624	3128	1.140	--
总计		88521	100.000	15624			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-463-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:19:34
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	97771	100.000	16532	2854	1.140	--
总计		97771	100.000	16532			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 27-4/30-464-2 - zzp-25011301-02p-gyd-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250116-RCQX-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/17 02:22:58
处理时间 (V2): 2025/01/17 11:31:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.066	97787	100.000	16527	2855	1.141	--
总计		97787	100.000	16527			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品25011301-02批-高硬度-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2