




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-453-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:46:30
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-454-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:49:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	382584	100.000	49570	2045	1.369	--
总计		382584	100.000	49570			

图2 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-455-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:53:17
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	382391	100.000	49579	2044	1.367	--
总计		382391	100.000	49579			

图3 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-456-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 13:56:41
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	383269	100.000	49804	2058	1.362	--
总计		383269	100.000	49804			

图4 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-457-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:00:05
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	382338	100.000	49594	2047	1.368	--
总计		382338	100.000	49594			

图5 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-458-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:03:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	382470	100.000	49621	2044	1.368	--
总计		382470	100.000	49621			

图6 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-459-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:06:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	199282	100.000	30191	2999	1.362	--
总计		199282	100.000	30191			

图7 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-460-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:10:15
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	199016	100.000	30056	3004	1.368	--
总计		199016	100.000	30056			

图8 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-461-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:13:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	202410	100.000	30614	3001	1.364	--
总计		202410	100.000	30614			

图9 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-462-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:17:00
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	204216	100.000	30901	3005	1.364	--
总计		204216	100.000	30901			

图10 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-463-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:20:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	210016	100.000	31822	3009	1.359	--
总计		210016	100.000	31822			

图11 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-464-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:23:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	202741	100.000	30645	3000	1.366	--
总计		202741	100.000	30645			

图12 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-465-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:27:10
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	266724	100.000	40449	2997	1.364	--
总计		266724	100.000	40449			

图13 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-466-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:30:33
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	267682	100.000	40549	3000	1.363	--
总计		267682	100.000	40549			

图14 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-467-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:33:56
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	263996	100.000	39920	2996	1.367	--
总计		263996	100.000	39920			

图15 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-468-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 14:37:17
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:26:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	279921	100.000	42467	3004	1.361	--
总计		279921	100.000	42467			

图16 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-469-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:40:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	280492	100.000	42469	3001	1.363	--
总计		280492	100.000	42469			

图17 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-470-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:44:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	277043	100.000	41974	3001	1.365	--
总计		277043	100.000	41974			

图18 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-471-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:47:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:26:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	298357	100.000	45151	3001	1.361	--
总计		298357	100.000	45151			

图19 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-472-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:50:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	300419	100.000	45466	3001	1.361	--
总计		300419	100.000	45466			

图20 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-473-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:54:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	290141	100.000	43925	3003	1.365	--
总计		290141	100.000	43925			

图21 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-474-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:57:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	313462	100.000	47577	3001	1.364	--
总计		313462	100.000	47577			

图22 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-475-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:00:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	313100	100.000	47455	2999	1.364	--
总计		313100	100.000	47455			

图23 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-476-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:04:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	310438	100.000	46998	2998	1.365	--
总计		310438	100.000	46998			

图24 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-477-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:07:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	314227	100.000	47564	3003	1.363	--
总计		314227	100.000	47564			

图25 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-478-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:11:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	315860	100.000	47834	3002	1.361	--
总计		315860	100.000	47834			

图26 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-479-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:14:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	305391	100.000	46163	3001	1.367	--
总计		305391	100.000	46163			

图27 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-480-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:17:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	332500	100.000	50275	3004	1.366	--
总计		332500	100.000	50275			

图28 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-481-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:21:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	331660	100.000	50234	3002	1.365	--
总计		331660	100.000	50234			

图29 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-482-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:24:38
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:27:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	329190	100.000	49858	3000	1.366	--
总计		329190	100.000	49858			

图30 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-483-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:28:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	328964	100.000	49832	3005	1.363	--
总计		328964	100.000	49832			

图31 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-484-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:31:25
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:27:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	332119	100.000	50272	3006	1.365	--
总计		332119	100.000	50272			

图32 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-485-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:34:48
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:27:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	317723	100.000	48171	3003	1.362	--
总计		317723	100.000	48171			

图33 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-486-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 15:38:10
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:27:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	349580	100.000	52952	3004	1.364	--
总计		349580	100.000	52952			

图34 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-487-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:41:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	349157	100.000	52844	3002	1.365	--
总计		349157	100.000	52844			

图35 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-488-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:44:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	351064	100.000	53069	3003	1.364	--
总计		351064	100.000	53069			

图36 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-489-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:48:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	338226	100.000	51210	3004	1.363	--
总计		338226	100.000	51210			

图37 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-490-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:51:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	343444	100.000	51983	3005	1.364	--
总计		343444	100.000	51983			

图38 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-491-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:55:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	327505	100.000	49546	3002	1.364	--
总计		327505	100.000	49546			

图39 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-492-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:58:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:27:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	360897	100.000	54668	3004	1.361	--
总计		360897	100.000	54668			

图40 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-493-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:01:47
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:27:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	362084	100.000	54868	3002	1.365	--
总计		362084	100.000	54868			

图41 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-494-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:05:10
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	361935	100.000	54829	3003	1.365	--
总计		361935	100.000	54829			

图42 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-495-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:08:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	344497	100.000	52092	3001	1.363	--
总计		344497	100.000	52092			

图43 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-496-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:11:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	349593	100.000	52979	3003	1.364	--
总计		349593	100.000	52979			

图44 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-497-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:15:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	334134	100.000	50580	3001	1.366	--
总计		334134	100.000	50580			

图45 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-498-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:18:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	368508	100.000	55805	3002	1.364	--
总计		368508	100.000	55805			

图46 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-499-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:22:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	368519	100.000	55854	3003	1.362	--
总计		368519	100.000	55854			

图47 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-500-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:25:28
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	367523	100.000	55581	3001	1.364	--
总计		367523	100.000	55581			

图48 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-501-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:28:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	392437	100.000	59446	3004	1.366	--
总计		392437	100.000	59446			

图49 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-502-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:32:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	387209	100.000	58614	3003	1.365	--
总计		387209	100.000	58614			

图50 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-503-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:35:39
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	388483	100.000	58757	3001	1.365	--
总计		388483	100.000	58757			

图51 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-504-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:39:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	388638	100.000	58810	3004	1.366	--
总计		388638	100.000	58810			

图52 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-505-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:42:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	388474	100.000	58753	3006	1.366	--
总计		388474	100.000	58753			

图53 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-506-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:45:51
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	392514	100.000	59334	3005	1.366	--
总计		392514	100.000	59334			

图54 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-507-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:50:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	382638	100.000	49682	2052	1.367	--
总计		382638	100.000	49682			

图55 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-508-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:53:30
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	382562	100.000	49907	2069	1.360	--
总计		382562	100.000	49907			

图56 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-509-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 16:56:55
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-510-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:00:19
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	382526	100.000	49644	2049	1.366	--
总计		382526	100.000	49644			

图58 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-511-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:03:44
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	381886	100.000	49505	2052	1.365	--
总计		381886	100.000	49505			

图59 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-512-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:07:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	382430	100.000	49639	2052	1.366	--
总计		382430	100.000	49639			

图60 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-513-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:10:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:28:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	382278	100.000	49600	2052	1.365	--
总计		382278	100.000	49600			

图61 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-514-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:14:00
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	382264	100.000	49590	2051	1.367	--
总计		382264	100.000	49590			

图62 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-515-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:17:24
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	208447	100.000	31617	3013	1.360	--
总计		208447	100.000	31617			

图63 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-516-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:20:48
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:28:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	203274	100.000	30809	3013	1.363	--
总计		203274	100.000	30809			

图64 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-517-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:24:12
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:29:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	209242	100.000	31710	3011	1.361	--
总计		209242	100.000	31710			

图65 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-518-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:27:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	198624	100.000	30159	3009	1.364	--
总计		198624	100.000	30159			

图66 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-519-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:30:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	219937	100.000	33358	3009	1.364	--
总计		219937	100.000	33358			

图67 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-520-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:34:22
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:29:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	211169	100.000	32069	3010	1.363	--
总计		211169	100.000	32069			

图68 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-521-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:37:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	278741	100.000	42306	3010	1.364	--
总计		278741	100.000	42306			

图69 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-522-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:41:10
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:29:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	269314	100.000	40864	3010	1.364	--
总计		269314	100.000	40864			

图70 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-523-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:44:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	278057	100.000	42205	3010	1.362	--
总计		278057	100.000	42205			

图71 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-524-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:47:58
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:29:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	269308	100.000	40867	3015	1.365	--
总计		269308	100.000	40867			

图72 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-525-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:51:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	288826	100.000	43857	3012	1.363	--
总计		288826	100.000	43857			

图73 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-526-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:54:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	281528	100.000	42768	3013	1.363	--
总计		281528	100.000	42768			

图74 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-527-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 17:58:09
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:29:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	307921	100.000	46739	3009	1.365	--
总计		307921	100.000	46739			

图75 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-528-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:01:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	299075	100.000	45416	3015	1.364	--
总计		299075	100.000	45416			

图76 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-529-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:04:57
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:29:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	314522	100.000	47768	3015	1.362	--
总计		314522	100.000	47768			

图77 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-530-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:08:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	303501	100.000	46057	3009	1.367	--
总计		303501	100.000	46057			

图78 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-531-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:11:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	319522	100.000	48480	3010	1.365	--
总计		319522	100.000	48480			

图79 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-532-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:15:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	315217	100.000	47839	3008	1.366	--
总计		315217	100.000	47839			

图80 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-533-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:18:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	324677	100.000	49327	3015	1.363	--
总计		324677	100.000	49327			

图81 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-534-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:21:58
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:29:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	314190	100.000	47663	3008	1.365	--
总计		314190	100.000	47663			

图82 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-535-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:25:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	333285	100.000	50593	3013	1.365	--
总计		333285	100.000	50593			

图83 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-536-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:28:45
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:29:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	320546	100.000	48715	3014	1.365	--
总计		320546	100.000	48715			

图84 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-537-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:32:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:29:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	333683	100.000	50696	3013	1.363	--
总计		333683	100.000	50696			

图85 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-538-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:35:33
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:30:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	334500	100.000	50808	3012	1.363	--
总计		334500	100.000	50808			

图86 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-539-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:38:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	344922	100.000	52371	3013	1.366	--
总计		344922	100.000	52371			

图87 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-540-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:42:23
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:30:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	327255	100.000	49731	3013	1.364	--
总计		327255	100.000	49731			

图88 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-541-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 18:45:47
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:30:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	348121	100.000	52898	3013	1.364	--
总计		348121	100.000	52898			

图89 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-542-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:49:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	337415	100.000	51238	3013	1.364	--
总计		337415	100.000	51238			

图90 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-543-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:52:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	350392	100.000	53163	3009	1.366	--
总计		350392	100.000	53163			

图91 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-544-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:55:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	351109	100.000	53291	3011	1.365	--
总计		351109	100.000	53291			

图92 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-545-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:59:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	363863	100.000	55200	3007	1.365	--
总计		363863	100.000	55200			

图93 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-546-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:02:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	336800	100.000	51085	3008	1.368	--
总计		336800	100.000	51085			

图94 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-547-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:06:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	360246	100.000	54645	3007	1.366	--
总计		360246	100.000	54645			

图95 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-548-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:09:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	350075	100.000	53057	3006	1.367	--
总计		350075	100.000	53057			

图96 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-549-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:13:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	362441	100.000	55065	3011	1.363	--
总计		362441	100.000	55065			

图97 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-550-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:16:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	361136	100.000	54829	3008	1.363	--
总计		361136	100.000	54829			

图98 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-551-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:19:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	371895	100.000	56475	3008	1.365	--
总计		371895	100.000	56475			

图99 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-552-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:23:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	343336	100.000	52105	3007	1.366	--
总计		343336	100.000	52105			

图100 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-553-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:26:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	366955	100.000	55727	3013	1.366	--
总计		366955	100.000	55727			

图101 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-554-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:30:03
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:30:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	354860	100.000	53855	3009	1.365	--
总计		354860	100.000	53855			

图102 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-555-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:33:27
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:30:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	370556	100.000	56248	3009	1.365	--
总计		370556	100.000	56248			

图103 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-556-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:36:50
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:30:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	371954	100.000	56411	3009	1.366	--
总计		371954	100.000	56411			

图104 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-557-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:40:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	389458	100.000	59105	3011	1.365	--
总计		389458	100.000	59105			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-558-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:43:40
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:30:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	388508	100.000	58950	3010	1.366	--
总计		388508	100.000	58950			

图106 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-559-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 19:47:05
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:30:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	391235	100.000	59328	3007	1.366	--
总计		391235	100.000	59328			

图107 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-560-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:50:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:30:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	383474	100.000	58143	3008	1.365	--
总计		383474	100.000	58143			

图108 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-561-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:53:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	389114	100.000	58991	3008	1.368	--
总计		389114	100.000	58991			

图109 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-562-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:57:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	387970	100.000	58869	3009	1.365	--
总计		387970	100.000	58869			

图110 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-563-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:00:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	383321	100.000	49834	2065	1.364	--
总计		383321	100.000	49834			


图111 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-564-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:04:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	383195	100.000	49868	2065	1.363	--
总计		383195	100.000	49868			

图112 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-565-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:07:30
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:31:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质
溶剂




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-566-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:10:53
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:31:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	382196	100.000	49701	2060	1.363	--
总计		382196	100.000	49701			

图114 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-567-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:14:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	382506	100.000	49709	2057	1.361	--
总计		382506	100.000	49709			

图115 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-568-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:17:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	382682	100.000	49692	2055	1.365	--
总计		382682	100.000	49692			

图116 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-569-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:21:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	382587	100.000	49682	2056	1.363	--
总计		382587	100.000	49682			

图117 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-570-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:24:25
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:31:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	383032	100.000	49691	2054	1.363	--
总计		383032	100.000	49691			

图118 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-571-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:27:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	204763	100.000	31045	3011	1.370	--
总计		204763	100.000	31045			

图119 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-572-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:31:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	201198	100.000	30553	3008	1.364	--
总计		201198	100.000	30553			

图120 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-573-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:34:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	202864	100.000	30795	3018	1.363	--
总计		202864	100.000	30795			

图121 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-574-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:37:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	204745	100.000	31018	3012	1.369	--
总计		204745	100.000	31018			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-575-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:41:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	191376	100.000	29019	3010	1.365	--
总计		191376	100.000	29019			

图123 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-576-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:44:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	197517	100.000	29933	3016	1.365	--
总计		197517	100.000	29933			

图124 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-577-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:48:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	270193	100.000	40865	3009	1.368	--
总计		270193	100.000	40865			

图125 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-578-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 20:51:25
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:31:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	274327	100.000	41470	3007	1.368	--
总计		274327	100.000	41470			

图126 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-579-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:54:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	268063	100.000	40504	3015	1.365	--
总计		268063	100.000	40504			

图127 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-580-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:58:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	268123	100.000	40518	3015	1.365	--
总计		268123	100.000	40518			

图128 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-581-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:01:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	267128	100.000	40394	3014	1.367	--
总计		267128	100.000	40394			

图129 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-582-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:04:55
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:31:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	269343	100.000	40692	3012	1.368	--
总计		269343	100.000	40692			

图130 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-583-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:08:17
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	296876	100.000	44821	3009	1.367	--
总计		296876	100.000	44821			

图131 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-584-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:11:39
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	306054	100.000	46100	3006	1.370	--
总计		306054	100.000	46100			

图132 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-585-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:15:02
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	300371	100.000	45305	3006	1.366	--
总计		300371	100.000	45305			

图133 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-586-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:18:25
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	299828	100.000	45248	3014	1.367	--
总计		299828	100.000	45248			

图134 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-587-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:21:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	282941	100.000	42680	3014	1.366	--
总计		282941	100.000	42680			

图135 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-588-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:25:08
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	296736	100.000	44753	3017	1.368	--
总计		296736	100.000	44753			

图136 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-589-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:28:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	312684	100.000	47147	3015	1.367	--
总计		312684	100.000	47147			

图137 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-590-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:31:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	321110	100.000	48417	3012	1.369	--
总计		321110	100.000	48417			

图138 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-591-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:35:15
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	316898	100.000	47818	3014	1.370	--
总计		316898	100.000	47818			

图139 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-592-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:38:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	311386	100.000	47021	3013	1.367	--
总计		311386	100.000	47021			

图140 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-593-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:41:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	297364	100.000	44979	3016	1.368	--
总计		297364	100.000	44979			

图141 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-594-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:45:22
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	311374	100.000	47062	3016	1.366	--
总计		311374	100.000	47062			

图142 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-595-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:48:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	328617	100.000	49573	3015	1.370	--
总计		328617	100.000	49573			

图143 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-596-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:52:06
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	337385	100.000	50970	3015	1.369	--
总计		337385	100.000	50970			

图144 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-597-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 21:55:29
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	332992	100.000	50255	3014	1.369	--
总计		332992	100.000	50255			

图145 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-598-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:58:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	327652	100.000	49423	3013	1.371	--
总计		327652	100.000	49423			

图146 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-599-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:02:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	311974	100.000	47162	3014	1.365	--
总计		311974	100.000	47162			

图147 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-600-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:05:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	321766	100.000	48673	3015	1.367	--
总计		321766	100.000	48673			

图148 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-601-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:08:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	339950	100.000	51368	3012	1.367	--
总计		339950	100.000	51368			

图149 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-602-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:12:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	351971	100.000	53300	3019	1.366	--
总计		351971	100.000	53300			

图150 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-603-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:15:41
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	343843	100.000	51985	3014	1.367	--
总计		343843	100.000	51985			

图151 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-604-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:19:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	336854	100.000	50935	3015	1.369	--
总计		336854	100.000	50935			

图152 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-605-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:22:25
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	321336	100.000	48658	3024	1.364	--
总计		321336	100.000	48658			

图153 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-606-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:25:46
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:32:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	330312	100.000	49978	3016	1.367	--
总计		330312	100.000	49978			

图154 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-607-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:29:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	345832	100.000	52353	3017	1.367	--
总计		345832	100.000	52353			

图155 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-608-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:32:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	359360	100.000	54414	3020	1.368	--
总计		359360	100.000	54414			

图156 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-609-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:35:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	348413	100.000	52751	3016	1.368	--
总计		348413	100.000	52751			

图157 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-610-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:39:15
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:33:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	344132	100.000	52082	3018	1.366	--
总计		344132	100.000	52082			

图158 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-611-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:42:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	324981	100.000	49244	3022	1.367	--
总计		324981	100.000	49244			

图159 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-612-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:45:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	333806	100.000	50567	3019	1.367	--
总计		333806	100.000	50567			

图160 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-613-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:49:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	391271	100.000	59232	3016	1.368	--
总计		391271	100.000	59232			

图161 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-614-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:52:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	391791	100.000	59286	3015	1.369	--
总计		391791	100.000	59286			

图162 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-615-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:56:07
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:33:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	386716	100.000	58451	3011	1.371	--
总计		386716	100.000	58451			

图163 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-616-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 22:59:30
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:33:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	386355	100.000	58490	3020	1.366	--
总计		386355	100.000	58490			

图164 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-617-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:02:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	382539	100.000	57904	3022	1.369	--
总计		382539	100.000	57904			

图165 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-618-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:06:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	382727	100.000	57904	3018	1.369	--
总计		382727	100.000	57904			

图166 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-619-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:09:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	383199	100.000	49783	2071	1.360	--
总计		383199	100.000	49783			

图167 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-6/18-620-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/16 23:13:02
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:33:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.0ml/min
波长:275nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	383423	100.000	49937	2086	1.360	--
总计		383423	100.000	49937			

图168 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2