




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-357-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:46:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-358-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:50:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	382371	100.000	50156	2025	1.181	--
总计		382371	100.000	50156			

图2 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-359-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:53:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	382481	100.000	50141	2025	1.182	--
总计		382481	100.000	50141			

图3 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-360-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:56:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	382915	100.000	50106	2026	1.184	--
总计		382915	100.000	50106			

图4 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-361-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:00:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	382836	100.000	50110	2028	1.183	--
总计		382836	100.000	50110			

图5 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-362-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:03:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	382424	100.000	50099	2026	1.181	--
总计		382424	100.000	50099			

图6 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-363-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:07:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:35:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	202124	100.000	31484	3029	1.133	--
总计		202124	100.000	31484			

图7 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-364-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:10:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	196839	100.000	30629	3021	1.131	--
总计		196839	100.000	30629			

图8 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-365-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:13:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	199239	100.000	31019	3026	1.134	--
总计		199239	100.000	31019			

图9 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-366-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:17:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	203616	100.000	31723	3020	1.129	--
总计		203616	100.000	31723			

图10 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-367-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:20:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:35:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	205660	100.000	32042	3027	1.132	--
总计		205660	100.000	32042			

图11 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-368-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:24:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:35:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	203909	100.000	31764	3026	1.133	--
总计		203909	100.000	31764			

图12 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-369-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:27:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	277288	100.000	43134	3023	1.132	--
总计		277288	100.000	43134			

图13 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-370-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:30:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	270827	100.000	42112	3025	1.131	--
总计		270827	100.000	42112			

图14 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-371-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:34:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	270653	100.000	42053	3019	1.131	--
总计		270653	100.000	42053			

图15 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-372-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:37:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	277019	100.000	43145	3024	1.130	--
总计		277019	100.000	43145			

图16 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-373-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:41:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	282272	100.000	43940	3022	1.129	--
总计		282272	100.000	43940			

图17 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-374-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:44:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	278791	100.000	43386	3025	1.131	--
总计		278791	100.000	43386			

图18 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-375-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:47:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	315786	100.000	49113	3020	1.130	--
总计		315786	100.000	49113			

图19 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-376-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:51:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	302449	100.000	47099	3023	1.128	--
总计		302449	100.000	47099			

图20 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-377-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:54:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	302152	100.000	46997	3022	1.128	--
总计		302152	100.000	46997			

图21 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-378-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:57:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	310905	100.000	48388	3021	1.128	--
总计		310905	100.000	48388			

图22 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-379-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:01:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	316904	100.000	49300	3020	1.127	--
总计		316904	100.000	49300			

图23 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-380-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:04:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:35:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	320569	100.000	49834	3017	1.128	--
总计		320569	100.000	49834			

图24 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-381-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:08:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	337445	100.000	52387	3015	1.128	--
总计		337445	100.000	52387			

图25 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-382-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:11:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	320674	100.000	49885	3018	1.127	--
总计		320674	100.000	49885			

图26 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-383-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:14:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	320250	100.000	49774	3013	1.128	--
总计		320250	100.000	49774			

图27 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-384-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:18:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	335335	100.000	52125	3015	1.127	--
总计		335335	100.000	52125			

图28 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-385-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:21:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	335560	100.000	52128	3014	1.127	--
总计		335560	100.000	52128			

图29 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-386-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:25:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	342443	100.000	53261	3015	1.127	--
总计		342443	100.000	53261			

图30 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-387-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:28:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	355551	100.000	55269	3015	1.126	--
总计		355551	100.000	55269			

图31 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-388-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:31:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	336763	100.000	52327	3013	1.126	--
总计		336763	100.000	52327			

图32 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-389-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:35:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	338532	100.000	52528	3008	1.126	--
总计		338532	100.000	52528			

图33 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-390-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:38:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:36:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	358548	100.000	55640	3009	1.126	--
总计		358548	100.000	55640			

图34 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-391-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:41:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	354475	100.000	55094	3011	1.125	--
总计		354475	100.000	55094			

图35 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-392-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:45:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	362673	100.000	56311	3008	1.127	--
总计		362673	100.000	56311			

图36 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-393-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:48:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	366306	100.000	56953	3010	1.125	--
总计		366306	100.000	56953			

图37 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-394-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:52:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	346907	100.000	53823	3003	1.125	--
总计		346907	100.000	53823			

图38 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-395-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:55:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	347429	100.000	53990	3007	1.125	--
总计		347429	100.000	53990			

图39 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-396-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:58:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	372390	100.000	57817	3004	1.124	--
总计		372390	100.000	57817			

图40 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-397-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:02:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	363437	100.000	56415	3003	1.125	--
总计		363437	100.000	56415			

图41 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-398-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:05:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	374526	100.000	58087	3000	1.125	--
总计		374526	100.000	58087			

图42 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-399-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:08:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	373166	100.000	57897	3000	1.124	--
总计		373166	100.000	57897			

图43 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-400-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:12:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	352359	100.000	54716	3004	1.125	--
总计		352359	100.000	54716			

图44 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-401-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:15:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	352093	100.000	54683	3004	1.122	--
总计		352093	100.000	54683			

图45 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-402-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:19:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	379186	100.000	58783	2999	1.124	--
总计		379186	100.000	58783			

图46 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-403-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:22:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	367813	100.000	57093	3002	1.123	--
总计		367813	100.000	57093			

图47 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-404-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:25:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	379444	100.000	58882	3001	1.123	--
总计		379444	100.000	58882			

图48 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-405-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:29:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	389069	100.000	60392	3001	1.122	--
总计		389069	100.000	60392			

图49 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-406-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:32:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	394793	100.000	61255	2999	1.122	--
总计		394793	100.000	61255			

图50 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-407-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:36:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	384543	100.000	59596	2995	1.124	--
总计		384543	100.000	59596			

图51 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-408-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:39:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	387586	100.000	60059	2995	1.123	--
总计		387586	100.000	60059			

图52 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-409-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:42:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	386998	100.000	59990	2996	1.122	--
总计		386998	100.000	59990			

图53 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-410-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:46:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	387728	100.000	60096	2996	1.123	--
总计		387728	100.000	60096			

图54 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-411-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:49:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	382044	100.000	50078	2022	1.172	--
总计		382044	100.000	50078			

图55 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-412-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:53:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	382202	100.000	50076	2020	1.172	--
总计		382202	100.000	50076			

图56 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-413-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:56:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:37:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-414-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:59:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	381742	100.000	50027	2020	1.171	--
总计		381742	100.000	50027			

图58 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-415-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:03:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	381819	100.000	49993	2021	1.171	--
总计		381819	100.000	49993			

图59 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-416-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:06:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	381775	100.000	50014	2021	1.171	--
总计		381775	100.000	50014			

图60 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-417-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:10:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	381960	100.000	50032	2021	1.172	--
总计		381960	100.000	50032			

图61 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-418-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:13:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	381782	100.000	49992	2019	1.171	--
总计		381782	100.000	49992			

图62 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-419-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:16:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	224252	100.000	34706	2989	1.123	--
总计		224252	100.000	34706			

图63 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-420-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:20:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	226539	100.000	35106	2991	1.121	--
总计		226539	100.000	35106			

图64 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-421-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:23:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	218342	100.000	33825	2988	1.120	--
总计		218342	100.000	33825			

图65 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-422-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:27:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	219108	100.000	33978	2993	1.121	--
总计		219108	100.000	33978			

图66 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-423-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:30:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	223572	100.000	34604	2985	1.119	--
总计		223572	100.000	34604			

图67 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-424-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:33:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	224369	100.000	34741	2985	1.120	--
总计		224369	100.000	34741			

图68 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-425-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:37:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	299821	100.000	46369	2984	1.119	--
总计		299821	100.000	46369			

图69 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-426-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:40:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:37:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	311583	100.000	48174	2982	1.119	--
总计		311583	100.000	48174			

图70 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-427-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:44:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:37:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	301373	100.000	46604	2982	1.120	--
总计		301373	100.000	46604			

图71 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-428-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:47:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	309872	100.000	47874	2985	1.120	--
总计		309872	100.000	47874			

图72 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-429-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:50:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	311775	100.000	48217	2981	1.119	--
总计		311775	100.000	48217			

图73 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-430-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:54:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	305857	100.000	47230	2981	1.120	--
总计		305857	100.000	47230			

图74 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-431-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:57:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	333977	100.000	51597	2983	1.118	--
总计		333977	100.000	51597			

图75 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-432-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:01:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	351042	100.000	54161	2981	1.118	--
总计		351042	100.000	54161			

图76 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-433-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:04:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	343450	100.000	53081	2984	1.118	--
总计		343450	100.000	53081			

图77 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-434-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:07:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	349489	100.000	53940	2982	1.119	--
总计		349489	100.000	53940			

图78 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-435-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:11:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	350355	100.000	54058	2980	1.117	--
总计		350355	100.000	54058			

图79 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-436-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:14:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	340776	100.000	52619	2980	1.118	--
总计		340776	100.000	52619			

图80 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-437-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:18:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	347748	100.000	53627	2982	1.118	--
总计		347748	100.000	53627			

图81 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-438-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:21:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	369629	100.000	56957	2982	1.118	--
总计		369629	100.000	56957			

图82 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-439-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:25:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	364304	100.000	56198	2979	1.118	--
总计		364304	100.000	56198			

图83 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-440-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:28:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	369599	100.000	57018	2977	1.118	--
总计		369599	100.000	57018			

图84 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-441-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:31:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	370139	100.000	57149	2980	1.117	--
总计		370139	100.000	57149			

图85 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-442-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:35:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	357085	100.000	55072	2977	1.117	--
总计		357085	100.000	55072			

图86 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-443-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:38:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	358881	100.000	55235	2975	1.116	--
总计		358881	100.000	55235			

图87 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-444-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:42:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:38:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	384293	100.000	59205	2978	1.115	--
总计		384293	100.000	59205			

图88 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-445-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:45:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	381653	100.000	58796	2973	1.117	--
总计		381653	100.000	58796			

图89 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-446-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:48:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	384757	100.000	59401	2977	1.117	--
总计		384757	100.000	59401			

图90 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-447-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:52:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:38:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	384146	100.000	59134	2970	1.117	--
总计		384146	100.000	59134			

图91 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-448-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:55:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	372677	100.000	57359	2967	1.114	--
总计		372677	100.000	57359			

图92 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-449-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:59:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:38:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	361331	100.000	55529	2969	1.115	--
总计		361331	100.000	55529			

图93 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-450-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:02:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	391472	100.000	60211	2962	1.115	--
总计		391472	100.000	60211			

图94 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-451-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:05:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	388449	100.000	59782	2968	1.115	--
总计		388449	100.000	59782			

图95 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-452-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:09:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	391111	100.000	60227	2970	1.116	--
总计		391111	100.000	60227			

图96 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-453-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:12:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	391905	100.000	60346	2972	1.115	--
总计		391905	100.000	60346			

图97 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-454-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:16:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	380877	100.000	58591	2969	1.114	--
总计		380877	100.000	58591			

图98 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-455-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:19:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	363692	100.000	56017	2971	1.116	--
总计		363692	100.000	56017			

图99 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-456-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:22:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	393189	100.000	60524	2969	1.115	--
总计		393189	100.000	60524			

图100 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-457-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:26:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	388689	100.000	59798	2972	1.114	--
总计		388689	100.000	59798			

图101 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-458-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:29:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	392463	100.000	60450	2975	1.115	--
总计		392463	100.000	60450			

图102 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-459-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:33:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	392802	100.000	60499	2970	1.114	--
总计		392802	100.000	60499			

图103 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-460-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:36:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	383770	100.000	59051	2970	1.115	--
总计		383770	100.000	59051			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-461-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:39:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	387247	100.000	59552	2972	1.115	--
总计		387247	100.000	59552			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-462-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:43:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	394848	100.000	60736	2970	1.115	--
总计		394848	100.000	60736			

图106 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-463-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:46:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	388807	100.000	59804	2969	1.114	--
总计		388807	100.000	59804			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-464-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:50:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	393584	100.000	60518	2967	1.115	--
总计		393584	100.000	60518			

图108 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-465-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:53:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	396549	100.000	60936	2966	1.114	--
总计		396549	100.000	60936			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-466-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:57:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	389362	100.000	59855	2968	1.114	--
总计		389362	100.000	59855			

图110 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-467-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:00:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	382699	100.000	49971	2016	1.163	--
总计		382699	100.000	49971			

图111 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-468-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:03:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	382828	100.000	50002	2016	1.163	--
总计		382828	100.000	50002			

图112 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-469-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:07:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:39:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-470-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:10:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	383176	100.000	49992	2016	1.162	--
总计		383176	100.000	49992			

图114 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-471-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:14:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:39:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	382957	100.000	49990	2016	1.163	--
总计		382957	100.000	49990			

图115 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-472-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:17:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	383186	100.000	49981	2019	1.162	--
总计		383186	100.000	49981			

图116 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-473-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:20:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	383063	100.000	49967	2017	1.162	--
总计		383063	100.000	49967			

图117 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-474-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:24:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	383283	100.000	49988	2016	1.163	--
总计		383283	100.000	49988			

图118 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-475-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:27:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:40:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	196554	100.000	30181	2966	1.114	--
总计		196554	100.000	30181			

图119 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-476-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:30:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	198263	100.000	30510	2970	1.111	--
总计		198263	100.000	30510			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-477-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:34:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:40:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	201018	100.000	30898	2968	1.114	--
总计		201018	100.000	30898			

图121 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-478-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:37:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:40:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	213395	100.000	32844	2976	1.111	--
总计		213395	100.000	32844			

图122 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-479-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:41:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	201670	100.000	31106	2974	1.112	--
总计		201670	100.000	31106			

图123 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-480-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:44:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:40:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	202446	100.000	31236	2972	1.111	--
总计		202446	100.000	31236			

图124 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-481-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:47:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	267140	100.000	41081	2969	1.113	--
总计		267140	100.000	41081			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-482-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:51:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	264210	100.000	40616	2970	1.111	--
总计		264210	100.000	40616			

图126 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-483-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:54:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	271637	100.000	41861	2967	1.112	--
总计		271637	100.000	41861			

图127 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-484-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:57:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	299478	100.000	46134	2968	1.111	--
总计		299478	100.000	46134			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-485-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:01:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	278735	100.000	42906	2969	1.112	--
总计		278735	100.000	42906			

图129 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-486-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:04:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	275133	100.000	42342	2970	1.113	--
总计		275133	100.000	42342			

图130 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-487-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:08:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:40:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	300070	100.000	46232	2971	1.110	--
总计		300070	100.000	46232			

图131 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-488-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:11:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	294491	100.000	45345	2970	1.112	--
总计		294491	100.000	45345			

图132 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-489-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:14:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	306361	100.000	47158	2970	1.111	--
总计		306361	100.000	47158			

图133 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-490-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:18:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:40:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	340435	100.000	52431	2971	1.112	--
总计		340435	100.000	52431			

图134 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-491-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:21:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	313245	100.000	48194	2969	1.111	--
总计		313245	100.000	48194			

图135 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-492-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:25:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:40:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	306031	100.000	47113	2973	1.111	--
总计		306031	100.000	47113			

图136 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-493-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:28:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	321027	100.000	49474	2975	1.110	--
总计		321027	100.000	49474			

图137 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-494-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:31:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:40:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	309964	100.000	47649	2969	1.112	--
总计		309964	100.000	47649			

图138 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-495-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:35:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	324557	100.000	49928	2972	1.111	--
总计		324557	100.000	49928			

图139 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-496-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:38:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:41:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	362317	100.000	55768	2971	1.111	--
总计		362317	100.000	55768			

图140 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-497-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:41:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	339870	100.000	52268	2969	1.110	--
总计		339870	100.000	52268			

图141 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-498-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:45:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	324286	100.000	49883	2967	1.110	--
总计		324286	100.000	49883			

图142 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-499-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:48:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	341398	100.000	52453	2973	1.111	--
总计		341398	100.000	52453			

图143 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-500-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:51:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	327146	100.000	50294	2976	1.110	--
总计		327146	100.000	50294			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-501-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:55:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	346256	100.000	53237	2969	1.111	--
总计		346256	100.000	53237			

图145 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-502-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:58:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	382733	100.000	58822	2969	1.110	--
总计		382733	100.000	58822			

图146 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-503-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:02:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	355099	100.000	54567	2971	1.109	--
总计		355099	100.000	54567			

图147 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-504-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:05:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	342843	100.000	52645	2970	1.110	--
总计		342843	100.000	52645			

图148 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-505-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:08:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	360834	100.000	55337	2970	1.111	--
总计		360834	100.000	55337			

图149 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-506-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:12:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	343340	100.000	52762	2974	1.111	--
总计		343340	100.000	52762			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-507-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:15:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	362239	100.000	55606	2973	1.110	--
总计		362239	100.000	55606			

图151 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-508-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:18:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	390451	100.000	59980	2974	1.111	--
总计		390451	100.000	59980			

图152 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-509-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:22:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	371032	100.000	56868	2975	1.110	--
总计		371032	100.000	56868			

图153 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-510-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:25:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	358083	100.000	54981	2972	1.110	--
总计		358083	100.000	54981			

图154 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-511-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:28:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	370582	100.000	56812	2974	1.110	--
总计		370582	100.000	56812			

图155 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-512-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:32:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	350765	100.000	53864	2975	1.110	--
总计		350765	100.000	53864			

图156 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-513-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:35:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	372717	100.000	57107	2975	1.111	--
总计		372717	100.000	57107			

图157 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-514-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:39:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	393122	100.000	60292	2976	1.110	--
总计		393122	100.000	60292			

图158 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-515-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:42:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:41:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	377328	100.000	57849	2968	1.109	--
总计		377328	100.000	57849			

图159 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-516-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:45:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:41:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	369201	100.000	56576	2973	1.111	--
总计		369201	100.000	56576			

图160 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-517-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:49:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:42:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	396710	100.000	60702	2973	1.110	--
总计		396710	100.000	60702			

图161 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-518-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:52:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:42:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	395010	100.000	60411	2974	1.109	--
总计		395010	100.000	60411			

图162 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-519-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:55:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:42:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	385915	100.000	59008	2974	1.111	--
总计		385915	100.000	59008			

图163 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-520-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:59:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:42:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	392646	100.000	60119	2973	1.109	--
总计		392646	100.000	60119			

图164 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-521-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 23:02:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:42:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	384896	100.000	58889	2977	1.110	--
总计		384896	100.000	58889			

图165 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-522-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 23:06:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:42:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	384941	100.000	58964	2978	1.110	--
总计		384941	100.000	58964			

图166 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-523-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 23:09:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:42:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	384874	100.000	50265	2041	1.154	--
总计		384874	100.000	50265			

图167 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 18-7/29-524-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250116-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 23:12:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/17 09:42:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	384866	100.000	50263	2039	1.156	--
总计		384866	100.000	50263			

图168 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2