



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)
柱温: 40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1409-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-zjtj33y-rcd-rj.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 22 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:24:21
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1410-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 11:28:45

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:26

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.348	149358	100.000	24382	7030	1.030	--
总计		149358	100.000	24382			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1411-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 11:33:08

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.348	149345	100.000	24354	7010	1.032	--
总计		149345	100.000	24354			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1412-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 11:37:31

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	149250	100.000	24337	7012	1.032	--
总计		149250	100.000	24337			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1413-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 11:41:55

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	148954	100.000	24292	7008	1.037	--
总计		148954	100.000	24292			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1414-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 11:46:19

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:37

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.348	149241	100.000	24257	6987	1.035	--
总计		149241	100.000	24257			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1415-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 11:50:42

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	108408	100.000	18989	8323	1.022	--
总计		108408	100.000	18989			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1416-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 11:55:05

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	108187	100.000	18961	8320	1.024	--
总计		108187	100.000	18961			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1417-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 11:59:28

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	122578	100.000	21518	8330	1.021	--
总计		122578	100.000	21518			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1418-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:03:51

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	122763	100.000	21545	8333	1.021	--
总计		122763	100.000	21545			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1419-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 12:08:14

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	131591	100.000	23111	8327	1.022	--
总计		131591	100.000	23111			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1420-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 12:12:37

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	131868	100.000	23105	8300	1.024	--
总计		131868	100.000	23105			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1421-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:17:00

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	133807	100.000	23505	8313	1.025	--
总计		133807	100.000	23505			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1422-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:21:23

处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	134004	100.000	23504	8326	1.025	--
总计		134004	100.000	23504			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1423-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 12:25:46

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	136252	100.000	23924	8323	1.026	--
总计		136252	100.000	23924			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1424-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 12:30:09

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	136398	100.000	23937	8324	1.024	--
总计		136398	100.000	23937			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1425-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:34:33

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	121636	100.000	21339	8323	1.027	--
总计		121636	100.000	21339			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1426-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:38:56

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	121803	100.000	21337	8294	1.025	--
总计		121803	100.000	21337			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1427-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:43:19

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	141163	100.000	24673	8308	1.026	--
总计		141163	100.000	24673			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1428-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:47:42

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.367	141037	100.000	24638	8316	1.026	--
总计		141037	100.000	24638			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1429-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:52:05

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	139876	100.000	24527	8306	1.025	--
总计		139876	100.000	24527			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1430-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 12:56:28

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	140137	100.000	24555	8326	1.028	--
总计		140137	100.000	24555			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1431-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:00:53

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	138845	100.000	24344	8340	1.028	--
总计		138845	100.000	24344			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1432-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:05:16

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	138830	100.000	24363	8324	1.027	--
总计		138830	100.000	24363			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1433-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:09:39

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	137778	100.000	24190	8332	1.028	--
总计		137778	100.000	24190			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1434-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:14:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	137898	100.000	24193	8331	1.028	--
总计		137898	100.000	24193			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1435-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:18:25

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	144103	100.000	25256	8337	1.026	--
总计		144103	100.000	25256			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1436-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:22:49

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	144420	100.000	25290	8334	1.028	--
总计		144420	100.000	25290			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1437-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:27:12

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	146761	100.000	25720	8328	1.029	--
总计		146761	100.000	25720			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1438-2 - zzp-2022032501p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:31:35

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	146759	100.000	25672	8335	1.028	--
总计		146759	100.000	25672			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1439-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:35:58

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	100978	100.000	17666	8328	1.031	--
总计		100978	100.000	17666			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1440-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:40:21

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	100986	100.000	17686	8322	1.029	--
总计		100986	100.000	17686			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1441-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:44:44

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	121668	100.000	21324	8330	1.028	--
总计		121668	100.000	21324			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1442-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:49:06

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	121614	100.000	21275	8337	1.027	--
总计		121614	100.000	21275			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1443-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:53:29

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	106378	100.000	18653	8335	1.029	--
总计		106378	100.000	18653			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1444-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 13:57:51

处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	106598	100.000	18657	8322	1.028	--
总计		106598	100.000	18657			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1445-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 14:02:14

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.375	99726	100.000	17451	8374	1.030	--
总计		99726	100.000	17451			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1446-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:06:36

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	100051	100.000	17531	8339	1.029	--
总计		100051	100.000	17531			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1447-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 14:10:59

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:05

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	112667	100.000	19712	8342	1.032	--
总计		112667	100.000	19712			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1448-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 14:15:22

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:07

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	112416	100.000	19727	8362	1.028	--
总计		112416	100.000	19727			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1449-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:19:45

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	130969	100.000	22970	8366	1.032	--
总计		130969	100.000	22970			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1450-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:24:07

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	131029	100.000	22931	8351	1.032	--
总计		131029	100.000	22931			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1451-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 14:28:30

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	141860	100.000	24825	8323	1.030	--
总计		141860	100.000	24825			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1452-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 14:32:53

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	141751	100.000	24832	8346	1.031	--
总计		141751	100.000	24832			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1453-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 14:37:17

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	139428	100.000	24468	8351	1.032	--
总计		139428	100.000	24468			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1454-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 14:41:41

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	139628	100.000	24480	8335	1.031	--
总计		139628	100.000	24480			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1455-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 14:46:05

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	140795	100.000	24632	8319	1.033	--
总计		140795	100.000	24632			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1456-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 14:50:28

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	140428	100.000	24636	8349	1.031	--
总计		140428	100.000	24636			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1457-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 14:54:51

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	138955	100.000	24368	8334	1.032	--
总计		138955	100.000	24368			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1458-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:59:14

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	138987	100.000	24355	8350	1.031	--
总计		138987	100.000	24355			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1459-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:03:37

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	143230	100.000	25111	8346	1.033	--
总计		143230	100.000	25111			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1460-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:08:00

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	143051	100.000	25104	8348	1.031	--
总计		143051	100.000	25104			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1461-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:12:23

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	140840	100.000	24726	8356	1.031	--
总计		140840	100.000	24726			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1462-2 - zzp-2022032601p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:16:46

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	140605	100.000	24703	8351	1.031	--
总计		140605	100.000	24703			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1463-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:21:10

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	139232	100.000	24411	8353	1.032	--
总计		139232	100.000	24411			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1464-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 15:25:33

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	139114	100.000	24346	8338	1.032	--
总计		139114	100.000	24346			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1465-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:29:57

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	101784	100.000	17842	8326	1.031	--
总计		101784	100.000	17842			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1466-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 15:34:20

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	101522	100.000	17828	8356	1.035	--
总计		101522	100.000	17828			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1467-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:38:43

处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	121661	100.000	21301	8317	1.030	--
总计		121661	100.000	21301			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1468-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:43:06

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	121486	100.000	21290	8338	1.034	--
总计		121486	100.000	21290			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1469-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 15:47:29

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	131390	100.000	23017	8358	1.034	--
总计		131390	100.000	23017			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1470-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 15:51:52

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	131293	100.000	23033	8371	1.034	--
总计		131293	100.000	23033			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1471-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 15:56:14

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	118351	100.000	20731	8352	1.036	--
总计		118351	100.000	20731			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1472-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:00:36

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	118272	100.000	20766	8368	1.036	--
总计		118272	100.000	20766			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1473-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 16:04:59

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	125185	100.000	21959	8356	1.036	--
总计		125185	100.000	21959			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1474-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:09:22

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	124828	100.000	21860	8366	1.038	--
总计		124828	100.000	21860			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1475-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:13:46

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.086	142351	100.000	26983	8208	1.054	--
总计		142351	100.000	26983			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1476-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 16:18:09

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.072	142380	100.000	27056	8141	1.055	--
总计		142380	100.000	27056			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1477-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 16:30:19

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.069	140785	100.000	26650	8122	1.054	--
总计		140785	100.000	26650			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1478-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:34:43

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.066	140248	100.000	26649	8151	1.055	--
总计		140248	100.000	26649			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1479-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 16:39:07

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	141230	100.000	26892	8119	1.054	--
总计		141230	100.000	26892			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1480-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:43:29

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	141212	100.000	26788	8117	1.056	--
总计		141212	100.000	26788			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1481-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 16:47:52

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	146853	100.000	27868	8126	1.057	--
总计		146853	100.000	27868			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1482-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 16:52:15

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:39

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.056	145196	100.000	27733	8133	1.056	--
总计		145196	100.000	27733			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1483-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 16:56:38

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.053	143094	100.000	27322	8128	1.056	--
总计		143094	100.000	27322			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1484-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 17:01:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.050	143195	100.000	27248	8136	1.056	--
总计		143195	100.000	27248			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1485-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 17:05:25

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.048	143887	100.000	27592	8158	1.058	--
总计		143887	100.000	27592			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1486-2 - zzp-2022032701p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 17:09:48

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.047	144454	100.000	27679	8139	1.060	--
总计		144454	100.000	27679			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1487-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:14:12

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.027	149583	100.000	26252	6770	1.079	--
总计		149583	100.000	26252			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1488-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:18:36

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.024	149076	100.000	26306	6760	1.075	--
总计		149076	100.000	26306			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1489-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-zjtj33y-rcd-rj.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 17:23:01

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:57

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1490-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:27:26

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	292093	100.000	51778	6775	1.077	--
总计		292093	100.000	51778			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1491-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:31:52

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	292550	100.000	51763	6770	1.076	--
总计		292550	100.000	51763			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1492-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 17:36:17

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	292629	100.000	51629	6773	1.077	--
总计		292629	100.000	51629			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1493-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:40:42

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	292168	100.000	51738	6777	1.079	--
总计		292168	100.000	51738			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1494-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:45:07

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	292447	100.000	51801	6773	1.080	--
总计		292447	100.000	51801			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1495-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:49:31

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.029	270728	100.000	52242	8170	1.068	--
总计		270728	100.000	52242			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1496-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 17:53:55

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.026	271462	100.000	52030	8159	1.067	--
总计		271462	100.000	52030			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1497-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 17:58:20

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	256961	100.000	49430	8194	1.068	--
总计		256961	100.000	49430			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1498-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 18:02:45

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	257037	100.000	49638	8158	1.069	--
总计		257037	100.000	49638			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1499-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 18:07:09

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:22

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	259966	100.000	50364	8188	1.070	--
总计		259966	100.000	50364			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1500-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 18:11:33

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	260972	100.000	50082	8157	1.071	--
总计		260972	100.000	50082			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1501-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 18:15:57

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	156181	100.000	30034	8158	1.074	--
总计		156181	100.000	30034			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1502-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 18:20:21

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	155690	100.000	30200	8157	1.070	--
总计		155690	100.000	30200			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1503-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 18:24:45

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:33

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.009	171964	100.000	33123	8147	1.071	--
总计		171964	100.000	33123			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1504-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 18:29:10

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:35

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	171794	100.000	33350	8145	1.071	--
总计		171794	100.000	33350			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1505-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 18:33:34

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.001	171724	100.000	33110	8115	1.072	--
总计		171724	100.000	33110			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1506-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 18:37:58

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	171561	100.000	33377	8145	1.072	--
总计		171561	100.000	33377			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1507-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 18:42:22

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.995	279681	100.000	54347	8134	1.073	--
总计		279681	100.000	54347			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1508-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 18:46:47

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.992	279661	100.000	54010	8110	1.072	--
总计		279661	100.000	54010			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1509-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 18:51:11

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.990	295567	100.000	57427	8121	1.073	--
总计		295567	100.000	57427			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1510-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 18:55:35

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.988	295100	100.000	57505	8121	1.072	--
总计		295100	100.000	57505			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1511-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 18:59:59

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.985	289009	100.000	55981	8111	1.073	--
总计		289009	100.000	55981			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1512-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:04:24

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	289371	100.000	55968	8095	1.073	--
总计		289371	100.000	55968			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1513-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:08:49

处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	273542	100.000	53426	8116	1.074	--
总计		273542	100.000	53426			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1514-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:13:13

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	273386	100.000	53464	8131	1.076	--
总计		273386	100.000	53464			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1515-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:17:37

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	282474	100.000	55032	8122	1.074	--
总计		282474	100.000	55032			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1516-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:22:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	282659	100.000	54818	8100	1.075	--
总计		282659	100.000	54818			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1517-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 19:26:26

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:09

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.975	279140	100.000	54365	8100	1.076	--
总计		279140	100.000	54365			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1518-2 - zzp-2022032201p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 19:30:51

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	278818	100.000	54558	8116	1.075	--
总计		278818	100.000	54558			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1519-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:35:16

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.972	143249	100.000	28048	8111	1.075	--
总计		143249	100.000	28048			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1520-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:39:40

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.970	143484	100.000	28008	8080	1.075	--
总计		143484	100.000	28008			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1521-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 19:44:05

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:20

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	254296	100.000	49673	8103	1.075	--
总计		254296	100.000	49673			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1522-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 19:48:29

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:22

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	254771	100.000	49510	8095	1.076	--
总计		254771	100.000	49510			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1523-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:52:52

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	233147	100.000	45352	8089	1.075	--
总计		233147	100.000	45352			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1524-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:57:16

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	233370	100.000	45664	8094	1.079	--
总计		233370	100.000	45664			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1525-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:01:41

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	208560	100.000	40843	8092	1.077	--
总计		208560	100.000	40843			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1526-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 20:06:06

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:32

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	208426	100.000	40848	8090	1.075	--
总计		208426	100.000	40848			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1527-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 20:10:30

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	196980	100.000	38588	8077	1.076	--
总计		196980	100.000	38588			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1528-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 20:14:54

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	196581	100.000	38630	8122	1.077	--
总计		196581	100.000	38630			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1529-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:19:18

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	195305	100.000	38329	8108	1.076	--
总计		195305	100.000	38329			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1530-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 20:23:42

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	195380	100.000	38241	8094	1.075	--
总计		195380	100.000	38241			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1531-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 20:28:06

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	263818	100.000	51551	8078	1.076	--
总计		263818	100.000	51551			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1532-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:32:31

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	263595	100.000	51517	8091	1.076	--
总计		263595	100.000	51517			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1533-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:36:56

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	289307	100.000	56417	8086	1.077	--
总计		289307	100.000	56417			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1534-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:41:20

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	289314	100.000	56375	8087	1.078	--
总计		289314	100.000	56375			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1535-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 20:45:44

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	284628	100.000	55425	8074	1.078	--
总计		284628	100.000	55425			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1536-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:50:09

处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	284485	100.000	55362	8069	1.077	--
总计		284485	100.000	55362			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1537-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 20:54:33

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	274190	100.000	53506	8103	1.079	--
总计		274190	100.000	53506			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1538-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 20:58:58

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.958	274804	100.000	53802	8106	1.080	--
总计		274804	100.000	53802			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1539-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:03:23

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.957	280077	100.000	55020	8129	1.082	--
总计		280077	100.000	55020			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1540-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 21:07:47

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.957	280103	100.000	55098	8127	1.081	--
总计		280103	100.000	55098			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1541-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 21:12:11

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.955	279387	100.000	54970	8119	1.082	--
总计		279387	100.000	54970			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1542-2 - zzp-2022032301p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:16:35

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.956	278857	100.000	54976	8140	1.083	--
总计		278857	100.000	54976			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1543-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:21:00

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.956	269343	100.000	53161	8156	1.084	--
总计		269343	100.000	53161			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1544-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:25:25

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.955	269488	100.000	53187	8146	1.085	--
总计		269488	100.000	53187			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1545-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:29:50

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.955	276196	100.000	54541	8168	1.084	--
总计		276196	100.000	54541			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1546-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 21:34:15

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.954	276048	100.000	54548	8177	1.086	--
总计		276048	100.000	54548			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1547-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:38:40

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.954	254805	100.000	50375	8169	1.087	--
总计		254805	100.000	50375			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1548-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:43:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.952	255510	100.000	50225	8168	1.086	--
总计		255510	100.000	50225			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1549-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 21:47:29

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.952	237885	100.000	46877	8189	1.088	--
总计		237885	100.000	46877			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1550-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:51:53

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	238454	100.000	46855	8176	1.088	--
总计		238454	100.000	46855			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1551-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:56:18

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	236816	100.000	46514	8200	1.089	--
总计		236816	100.000	46514			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1552-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:00:43

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	236708	100.000	46851	8180	1.089	--
总计		236708	100.000	46851			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1553-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:05:07

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	237867	100.000	47127	8190	1.091	--
总计		237867	100.000	47127			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1554-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:09:31

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	238344	100.000	47272	8199	1.090	--
总计		238344	100.000	47272			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1555-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 22:13:56

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:47

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	283074	100.000	56167	8205	1.091	--
总计		283074	100.000	56167			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1556-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:18:21

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	282997	100.000	55995	8205	1.091	--
总计		282997	100.000	55995			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1557-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 22:22:45

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:52

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	301997	100.000	59545	8202	1.093	--
总计		301997	100.000	59545			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1558-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:27:10

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	302315	100.000	60111	8201	1.094	--
总计		302315	100.000	60111			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1559-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:31:35

处理时间(V2): 2025/01/18 09:33:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	283626	100.000	56379	8188	1.093	--
总计		283626	100.000	56379			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1560-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:36:00

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	283970	100.000	56377	8195	1.095	--
总计		283970	100.000	56377			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1561-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:40:25

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	279243	100.000	55464	8198	1.094	--
总计		279243	100.000	55464			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1562-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:44:49

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	279055	100.000	55370	8212	1.096	--
总计		279055	100.000	55370			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1563-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:49:14

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	283335	100.000	56119	8186	1.095	--
总计		283335	100.000	56119			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1564-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:53:39

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	284378	100.000	56287	8185	1.096	--
总计		284378	100.000	56287			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1565-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/17 22:58:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	282638	100.000	56112	8193	1.096	--
总计		282638	100.000	56112			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1566-2 - zzp-2022032401p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:02:29

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	283107	100.000	56223	8199	1.096	--
总计		283107	100.000	56223			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)
柱温: 40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1567-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 22 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:06:54
处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	295596	100.000	54370	6871	1.105	--
总计		295596	100.000	54370			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1568-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:11:17

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	295891	100.000	54400	6861	1.106	--
总计		295891	100.000	54400			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1569-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-zjtj33y-rcd-rj.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/17 23:15:41

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:24

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1570-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:20:05

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	593347	100.000	108371	6845	1.107	--
总计		593347	100.000	108371			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1571-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:24:28

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	593703	100.000	108730	6851	1.106	--
总计		593703	100.000	108730			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1572-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:28:51

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	592871	100.000	108494	6851	1.107	--
总计		592871	100.000	108494			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1573-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:33:14

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	593644	100.000	108623	6835	1.106	--
总计		593644	100.000	108623			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1574-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:37:38

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	592623	100.000	108515	6860	1.107	--
总计		592623	100.000	108515			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1575-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:42:01

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	328046	100.000	64884	8231	1.098	--
总计		328046	100.000	64884			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1576-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:46:24

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	330183	100.000	65394	8218	1.099	--
总计		330183	100.000	65394			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1577-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:50:47

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	535929	100.000	106513	8205	1.098	--
总计		535929	100.000	106513			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1578-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:55:10

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	535404	100.000	106478	8211	1.098	--
总计		535404	100.000	106478			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1579-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:59:32

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	304377	100.000	60593	8195	1.098	--
总计		304377	100.000	60593			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1580-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:03:54

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	304486	100.000	60428	8217	1.099	--
总计		304486	100.000	60428			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1581-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:08:17

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	525220	100.000	104178	8218	1.100	--
总计		525220	100.000	104178			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1582-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:12:40

处理时间(V2): 2025/01/18 09:34:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	525552	100.000	104347	8213	1.099	--
总计		525552	100.000	104347			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1583-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:17:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	457234	100.000	91042	8207	1.100	--
总计		457234	100.000	91042			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1584-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:21:25

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	457961	100.000	90743	8209	1.100	--
总计		457961	100.000	90743			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1585-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:25:48

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	301890	100.000	60067	8215	1.100	--
总计		301890	100.000	60067			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1586-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:30:11

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	301744	100.000	59946	8215	1.100	--
总计		301744	100.000	59946			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1587-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 00:34:34

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	537167	100.000	106662	8223	1.100	--
总计		537167	100.000	106662			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1588-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:38:56

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	543145	100.000	107828	8231	1.100	--
总计		543145	100.000	107828			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1589-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 00:43:19

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	570941	100.000	113398	8225	1.100	--
总计		570941	100.000	113398			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1590-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 00:47:41

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	571080	100.000	113138	8214	1.100	--
总计		571080	100.000	113138			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1591-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:52:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	521074	100.000	103502	8222	1.101	--
总计		521074	100.000	103502			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1592-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/18 00:56:26

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:23

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	521075	100.000	103509	8228	1.101	--
总计		521075	100.000	103509			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1593-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 01:00:48

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	544477	100.000	108129	8225	1.101	--
总计		544477	100.000	108129			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1594-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/18 01:05:10

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:28

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	544971	100.000	108093	8218	1.102	--
总计		544971	100.000	108093			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1595-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:09:32

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	577618	100.000	114641	8229	1.101	--
总计		577618	100.000	114641			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1596-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:13:55

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	577605	100.000	114970	8207	1.101	--
总计		577605	100.000	114970			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1597-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:18:19

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	519164	100.000	103224	8236	1.100	--
总计		519164	100.000	103224			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1598-2 - zzp-2022031901p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:22:41

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	518738	100.000	103253	8219	1.100	--
总计		518738	100.000	103253			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1599-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:27:03

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	510060	100.000	101441	8231	1.101	--
总计		510060	100.000	101441			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1600-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:31:26

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	509916	100.000	101453	8235	1.102	--
总计		509916	100.000	101453			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1601-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 01:35:48

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	519178	100.000	103199	8232	1.101	--
总计		519178	100.000	103199			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1602-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 01:40:10

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	519508	100.000	103265	8221	1.102	--
总计		519508	100.000	103265			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1603-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:44:33

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	517118	100.000	102875	8207	1.102	--
总计		517118	100.000	102875			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1604-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:48:55

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	516567	100.000	102841	8222	1.103	--
总计		516567	100.000	102841			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1605-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:53:17

处理时间(V2): 2025/01/18 09:35:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	516075	100.000	102565	8244	1.104	--
总计		516075	100.000	102565			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1606-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:57:40

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	516789	100.000	102898	8214	1.102	--
总计		516789	100.000	102898			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1607-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:02:03

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	358743	100.000	71398	8214	1.101	--
总计		358743	100.000	71398			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1608-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:06:25

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	358020	100.000	71424	8234	1.102	--
总计		358020	100.000	71424			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1609-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:10:47

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	514008	100.000	102417	8211	1.102	--
总计		514008	100.000	102417			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1610-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:15:10

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	514582	100.000	102404	8205	1.102	--
总计		514582	100.000	102404			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1611-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:19:33

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	551257	100.000	109886	8218	1.102	--
总计		551257	100.000	109886			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1612-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:23:55

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	551099	100.000	109857	8204	1.102	--
总计		551099	100.000	109857			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1613-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:28:18

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	556747	100.000	111052	8226	1.102	--
总计		556747	100.000	111052			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1614-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/18 02:32:40

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:22

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	557272	100.000	111045	8215	1.102	--
总计		557272	100.000	111045			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1615-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:37:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	558056	100.000	111229	8223	1.102	--
总计		558056	100.000	111229			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1616-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/18 02:41:25

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:27

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	557833	100.000	111192	8232	1.103	--
总计		557833	100.000	111192			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1617-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:45:48

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	559172	100.000	111389	8233	1.103	--
总计		559172	100.000	111389			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1618-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 02:50:10

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	560292	100.000	111434	8209	1.103	--
总计		560292	100.000	111434			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1619-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:54:33

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	529470	100.000	105541	8229	1.102	--
总计		529470	100.000	105541			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1620-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:58:56

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	529722	100.000	105419	8221	1.104	--
总计		529722	100.000	105419			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1621-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:03:18

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	570996	100.000	113802	8224	1.103	--
总计		570996	100.000	113802			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1622-2 - zzp-2022032001p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:07:40

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	570698	100.000	113749	8218	1.104	--
总计		570698	100.000	113749			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1623-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:12:03

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	418731	100.000	83468	8216	1.103	--
总计		418731	100.000	83468			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1624-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:16:26

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	409808	100.000	81453	8218	1.103	--
总计		409808	100.000	81453			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1625-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:20:48

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	487991	100.000	97291	8219	1.103	--
总计		487991	100.000	97291			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1626-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 03:25:11

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	487612	100.000	97250	8226	1.103	--
总计		487612	100.000	97250			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1627-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:29:34

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	513391	100.000	102314	8214	1.102	--
总计		513391	100.000	102314			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1628-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:33:56

处理时间(V2): 2025/01/18 09:36:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	513146	100.000	102282	8221	1.103	--
总计		513146	100.000	102282			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1629-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:38:18

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	423685	100.000	84435	8216	1.104	--
总计		423685	100.000	84435			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1630-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:42:40

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	423522	100.000	84369	8209	1.104	--
总计		423522	100.000	84369			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1631-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:47:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	488379	100.000	97438	8224	1.103	--
总计		488379	100.000	97438			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1632-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:51:24

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	484852	100.000	96656	8213	1.103	--
总计		484852	100.000	96656			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1633-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/18 03:55:46

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:11

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	457229	100.000	91025	8224	1.105	--
总计		457229	100.000	91025			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1634-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:00:08

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	456683	100.000	91053	8230	1.105	--
总计		456683	100.000	91053			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1635-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:04:31

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	552016	100.000	109879	8216	1.104	--
总计		552016	100.000	109879			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1636-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:08:54

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	552104	100.000	109950	8200	1.105	--
总计		552104	100.000	109950			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1637-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:13:16

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	556582	100.000	110969	8223	1.104	--
总计		556582	100.000	110969			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1638-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:17:39

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	556053	100.000	110831	8217	1.104	--
总计		556053	100.000	110831			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1639-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:22:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	530812	100.000	105830	8217	1.104	--
总计		530812	100.000	105830			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1640-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:26:24

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	530733	100.000	105788	8229	1.105	--
总计		530733	100.000	105788			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1641-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 22 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/18 04:30:47

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:32

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	528777	100.000	105379	8224	1.105	--
总计		528777	100.000	105379			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1642-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:35:09

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	528993	100.000	105376	8204	1.105	--
总计		528993	100.000	105376			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1643-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:39:31

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	531853	100.000	106078	8229	1.106	--
总计		531853	100.000	106078			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1644-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 22μl

进样时间: 2025/01/18 04:43:53

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	532601	100.000	106155	8223	1.105	--
总计		532601	100.000	106155			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1645-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:48:15

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	529142	100.000	105336	8217	1.106	--
总计		529142	100.000	105336			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1646-2 - zzp-2022032101p-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:52:36

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	529407	100.000	105390	8228	1.106	--
总计		529407	100.000	105390			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1647-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:56:59

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.911	593256	100.000	109366	6889	1.115	--
总计		593256	100.000	109366			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-32/10-1648-2 - zzp-zjtj33y-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-zjtj33y-rcd-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX259.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 22 μ l

进样时间: 2025/01/18 05:01:22

处理时间(V2): 2025/01/18 09:37:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.912	595242	100.000	109832	6890	1.113	--
总计		595242	100.000	109832			