




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-971-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:28:40
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-972-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:32:04
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	98146	100.000	13565	2368	1.086	--
总计		98146	100.000	13565			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-973-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:35:28
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	98329	100.000	13590	2377	1.091	--
总计		98329	100.000	13590			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-974-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:38:51
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	98318	100.000	13573	2366	1.087	--
总计		98318	100.000	13573			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-975-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:42:15
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	98251	100.000	13567	2376	1.093	--
总计		98251	100.000	13567			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-976-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:45:39
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	98369	100.000	13579	2385	1.094	--
总计		98369	100.000	13579			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-977-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:49:02
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	33200	100.000	4714	2515	1.081	--
总计		33200	100.000	4714			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-978-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:52:25
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	31056	100.000	4426	2489	1.077	--
总计		31056	100.000	4426			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-979-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:55:49
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	14623	100.000	2079	2498	1.077	--
总计		14623	100.000	2079			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-980-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 11:59:12
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	22856	100.000	3273	2501	1.087	--
总计		22856	100.000	3273			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-981-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:02:35
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	19583	100.000	2781	2538	1.077	--
总计		19583	100.000	2781			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-982-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:05:57
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	27639	100.000	3923	2484	1.096	--
总计		27639	100.000	3923			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-983-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:09:20
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:09:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	69084	100.000	9770	2513	1.085	--
总计		69084	100.000	9770			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-984-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:12:43
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	68489	100.000	9705	2512	1.091	--
总计		68489	100.000	9705			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-985-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:16:06
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:09:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	48851	100.000	6939	2510	1.094	--
总计		48851	100.000	6939			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-986-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:19:28
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	66758	100.000	9485	2518	1.092	--
总计		66758	100.000	9485			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-987-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:22:50
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	58197	100.000	8284	2526	1.091	--
总计		58197	100.000	8284			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-988-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:26:13
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	67104	100.000	9504	2507	1.083	--
总计		67104	100.000	9504			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-989-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:29:35
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	83427	100.000	11833	2513	1.087	--
总计		83427	100.000	11833			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-990-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:32:57
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	81967	100.000	11677	2526	1.093	--
总计		81967	100.000	11677			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-991-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:36:20
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	73156	100.000	10388	2520	1.095	--
总计		73156	100.000	10388			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-992-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:39:43
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	82876	100.000	11733	2507	1.091	--
总计		82876	100.000	11733			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-993-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:43:06
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	81321	100.000	11542	2517	1.088	--
总计		81321	100.000	11542			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-994-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:46:28
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	83033	100.000	11791	2527	1.093	--
总计		83033	100.000	11791			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-995-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:49:50
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	88065	100.000	12485	2510	1.092	--
总计		88065	100.000	12485			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-996-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:53:12
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	89384	100.000	12714	2524	1.092	--
总计		89384	100.000	12714			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-997-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:56:35
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	84354	100.000	11998	2526	1.091	--
总计		84354	100.000	11998			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-998-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 12:59:58
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87255	100.000	12375	2522	1.090	--
总计		87255	100.000	12375			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-999-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:03:21
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	86908	100.000	12371	2543	1.087	--
总计		86908	100.000	12371			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1000-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:06:44
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	87344	100.000	12366	2510	1.090	--
总计		87344	100.000	12366			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1001-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:10:07
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	90190	100.000	12813	2528	1.091	--
总计		90190	100.000	12813			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1002-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:13:30
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	91654	100.000	13036	2525	1.089	--
总计		91654	100.000	13036			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1003-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:16:53
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	93875	100.000	13318	2521	1.092	--
总计		93875	100.000	13318			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1004-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:20:16
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	91526	100.000	13020	2529	1.090	--
总计		91526	100.000	13020			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1005-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:23:39
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	95105	100.000	13550	2522	1.090	--
总计		95105	100.000	13550			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1006-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:27:01
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	92686	100.000	13189	2532	1.091	--
总计		92686	100.000	13189			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1007-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:30:24
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:10:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	88125	100.000	12510	2522	1.090	--
总计		88125	100.000	12510			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1008-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:33:47
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	92876	100.000	13253	2538	1.091	--
总计		92876	100.000	13253			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1009-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:37:10
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	93493	100.000	13305	2528	1.092	--
总计		93493	100.000	13305			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1010-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:40:33
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	91454	100.000	13041	2534	1.089	--
总计		91454	100.000	13041			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1011-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:43:56
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	91615	100.000	13030	2525	1.090	--
总计		91615	100.000	13030			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1012-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:47:18
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	93529	100.000	13308	2532	1.088	--
总计		93529	100.000	13308			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1013-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:50:41
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	87824	100.000	12445	2521	1.094	--
总计		87824	100.000	12445			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1014-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:54:04
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	86921	100.000	12362	2524	1.093	--
总计		86921	100.000	12362			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1015-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 13:57:27
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	94009	100.000	13372	2535	1.093	--
总计		94009	100.000	13372			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1016-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:00:50
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	91500	100.000	13028	2537	1.088	--
总计		91500	100.000	13028			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1017-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:04:14
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	93472	100.000	13300	2530	1.094	--
总计		93472	100.000	13300			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1018-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:07:36
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	95592	100.000	13626	2538	1.091	--
总计		95592	100.000	13626			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1019-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:11:00
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	91878	100.000	13080	2535	1.090	--
总计		91878	100.000	13080			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1020-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:14:24
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	91468	100.000	13065	2535	1.090	--
总计		91468	100.000	13065			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1021-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:17:47
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	90962	100.000	12982	2549	1.087	--
总计		90962	100.000	12982			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1022-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:21:11
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	91345	100.000	13005	2532	1.092	--
总计		91345	100.000	13005			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1023-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:24:34
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	94560	100.000	13493	2540	1.093	--
总计		94560	100.000	13493			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1024-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:27:57
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	90734	100.000	12947	2539	1.093	--
总计		90734	100.000	12947			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1025-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:31:21
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	88571	100.000	12652	2541	1.088	--
总计		88571	100.000	12652			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1026-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:34:45
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	91819	100.000	13099	2543	1.092	--
总计		91819	100.000	13099			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1027-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:38:09
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	88813	100.000	12663	2549	1.090	--
总计		88813	100.000	12663			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1028-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:41:34
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:11:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	90328	100.000	12875	2550	1.094	--
总计		90328	100.000	12875			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1029-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:44:58
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	93578	100.000	13365	2555	1.093	--
总计		93578	100.000	13365			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1030-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:48:22
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	92789	100.000	13264	2548	1.094	--
总计		92789	100.000	13264			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1031-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:51:46
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	90088	100.000	12855	2545	1.089	--
总计		90088	100.000	12855			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1032-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:55:10
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	87601	100.000	12514	2554	1.091	--
总计		87601	100.000	12514			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1033-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 14:58:34
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	90732	100.000	12987	2554	1.091	--
总计		90732	100.000	12987			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1034-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 15:01:58
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	88409	100.000	12613	2555	1.093	--
总计		88409	100.000	12613			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1035-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 15:05:22
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	91663	100.000	13109	2556	1.090	--
总计		91663	100.000	13109			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1036-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 15:08:46
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	89343	100.000	12745	2550	1.094	--
总计		89343	100.000	12745			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1037-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 15:12:10
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	98263	100.000	13742	2427	1.094	--
总计		98263	100.000	13742			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-24/26-1038-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250118-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/18 15:15:33
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:12:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	98400	100.000	13737	2425	1.092	--
总计		98400	100.000	13737			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2