



盐酸贝那普利片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100768-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.08	849586	853899	854387	851325	851087	852057	0.24
2	10.12	848559	851705				850132	0.27

单位质量响应值		RSD%	判断
84529.46	84005.14	0.44	数据可信

溶出曲线测定

盐酸贝那普利片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-X3462批-pH2.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	841153	-	841153	99.022	97.78	1.12	99.02	97.78	1.12
	2	816686	-	816686	96.142			96.14		
	3	827875	-	827875	97.459			97.46		
	4	830842	-	830842	97.808			97.81		
	5	826766	-	826766	97.328			97.33		
	6	840514	-	840514	98.947			98.95		
10min	1	835287	-	835287	98.331	97.55	0.91	98.63	97.84	0.92
	2	817390	-	817390	96.225			96.51		
	3	829337	-	829337	97.631			97.92		
	4	829181	-	829181	97.613			97.91		
	5	823045	-	823045	96.890			97.18		
	6	837660	-	837660	98.611			98.91		
15min	1	834627	-	834627	98.254	97.22	0.98	98.85	97.81	0.98
	2	813522	-	813522	95.769			96.35		
	3	823293	-	823293	96.920			97.50		
	4	827832	-	827832	97.454			98.04		
	5	821762	-	821762	96.739			97.32		
	6	834165	-	834165	98.199			98.79		
20min	1	829525	-	829525	97.653	96.86	0.87	98.54	97.74	0.87
	2	811241	-	811241	95.501			96.37		
	3	822654	-	822654	96.844			97.72		
	4	824245	-	824245	97.032			97.91		
	5	818902	-	818902	96.403			97.28		
	6	830352	-	830352	97.751			98.64		
30min	1	831640	-	831640	97.902	96.95	0.94	99.08	98.12	0.94
	2	812036	-	812036	95.594			96.75		
	3	822419	-	822419	96.817			97.98		
	4	824439	-	824439	97.054			98.22		
	5	818704	-	818704	96.379			97.54		
	6	832001	-	832001	97.945			99.13		
45min	1	827209	-	827209	97.381	96.47	0.92	98.85	97.93	0.92
	2	808211	-	808211	95.144			96.58		
	3	818904	-	818904	96.403			97.86		
	4	820644	-	820644	96.608			98.07		
	5	814168	-	814168	95.845			97.30		
	6	827690	-	827690	97.437			98.91		
60min	1	824528	-	824528	97.065	96.12	0.94	98.83	97.86	0.94
	2	804705	-	804705	94.731			96.45		
	3	816544	-	816544	96.125			97.87		
	4	817467	-	817467	96.234			97.98		
	5	811435	-	811435	95.524			97.26		
	6	824182	-	824182	97.024			98.79		
极限	1	820657	-	820657	96.609	95.68	0.90	98.67	97.72	0.90
	2	801188	-	801188	94.317			96.32		
	3	812082	-	812082	95.600			97.63		
	4	813498	-	813498	95.766			97.81		
	5	809247	-	809247	95.266			97.29		
	6	820100	-	820100	96.544			98.60		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



盐酸贝那普利片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100768-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.08	840779	841759	841562	841658	841491	841450	0.05
2	10.12	842145	838506				840326	0.31
单位质量响应值			RSD%	判断				
83477.18			0.38	数据可信				

溶出曲线测定

盐酸贝那普利片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-X3462批-pH2.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	825960	-	825960	98.413	97.89	0.70	98.41	97.89	0.70
	2	824602	-	824602	98.252			98.25		
	3	811241	-	811241	96.660			96.66		
	4	821361	-	821361	97.866			97.87		
	5	819847	-	819847	97.685			97.69		
	6	826418	-	826418	98.468			98.47		
10min	1	831759	-	831759	99.104	97.65	0.96	99.40	97.95	0.96
	2	822178	-	822178	97.963			98.26		
	3	807926	-	807926	96.265			96.55		
	4	818237	-	818237	97.493			97.79		
	5	816518	-	816518	97.288			97.58		
	6	820874	-	820874	97.808			98.10		
15min	1	828333	-	828333	98.696	97.35	1.00	99.29	97.94	0.99
	2	823105	-	823105	98.073			98.66		
	3	805623	-	805623	95.990			96.57		
	4	815362	-	815362	97.151			97.74		
	5	811665	-	811665	96.710			97.30		
	6	818188	-	818188	97.487			98.08		
20min	1	825588	-	825588	98.369	96.94	1.03	99.26	97.82	1.03
	2	819151	-	819151	97.602			98.49		
	3	801704	-	801704	95.523			96.39		
	4	810993	-	810993	96.630			97.51		
	5	808716	-	808716	96.359			97.23		
	6	815666	-	815666	97.187			98.07		
30min	1	823955	-	823955	98.175	97.08	0.95	99.36	98.25	0.95
	2	820344	-	820344	97.744			98.92		
	3	801957	-	801957	95.554			96.71		
	4	813890	-	813890	96.975			98.14		
	5	811169	-	811169	96.651			97.82		
	6	817246	-	817246	97.375			98.55		
45min	1	821330	-	821330	97.862	96.75	1.08	99.34	98.21	1.08
	2	820891	-	820891	97.810			99.28		
	3	799545	-	799545	95.266			96.71		
	4	808271	-	808271	96.306			97.76		
	5	806109	-	806109	96.048			97.50		
	6	815788	-	815788	97.202			98.67		
60min	1	818395	-	818395	97.512	96.28	1.16	99.28	98.04	1.16
	2	818832	-	818832	97.564			99.33		
	3	795390	-	795390	94.771			96.50		
	4	804785	-	804785	95.890			97.64		
	5	801662	-	801662	95.518			97.26		
	6	809491	-	809491	96.451			98.21		
极限	1	815757	-	815757	97.198	95.96	1.15	99.26	98.00	1.15
	2	816775	-	816775	97.319			99.37		
	3	793322	-	793322	94.525			96.53		
	4	802702	-	802702	95.642			97.68		
	5	799429	-	799429	95.252			97.28		
	6	804355	-	804355	95.839			97.89		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



盐酸贝那普利片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100768-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.08	848986	848673	849000	848913	849452	849005	0.04
2	10.12	851138	851810				851474	0.06
单位质量响应值			RSD%	判断				
84226.69			0.08	数据可信				

溶出曲线测定

盐酸贝那普利片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-X3462批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	860639	-	860639	101.417	98.92	2.36	101.42	98.92	2.36
	2	841359	-	841359	99.145			99.15		
	3	822244	-	822244	96.893			96.89		
	4	865072	-	865072	101.940			101.94		
	5	818829	-	818829	96.491			96.49		
	6	828535	-	828535	97.634			97.63		
10min	1	866448	-	866448	102.102	99.79	2.03	102.41	100.09	2.03
	2	842058	-	842058	99.228			99.53		
	3	834596	-	834596	98.348			98.64		
	4	870352	-	870352	102.562			102.87		
	5	831195	-	831195	97.948			98.24		
	6	836217	-	836217	98.540			98.83		
15min	1	863549	-	863549	101.760	99.51	2.04	102.37	100.10	2.04
	2	842401	-	842401	99.268			99.86		
	3	831748	-	831748	98.013			98.60		
	4	867825	-	867825	102.264			102.88		
	5	828534	-	828534	97.634			98.22		
	6	832426	-	832426	98.093			98.68		
20min	1	860114	-	860114	101.356	99.19	1.93	102.27	100.08	1.93
	2	839863	-	839863	98.969			99.86		
	3	829918	-	829918	97.797			98.68		
	4	863451	-	863451	101.749			102.67		
	5	826530	-	826530	97.398			98.27		
	6	830521	-	830521	97.868			98.75		
30min	1	856574	-	856574	100.938	98.75	1.95	102.16	99.95	1.96
	2	836218	-	836218	98.540			99.73		
	3	826621	-	826621	97.409			98.58		
	4	859833	-	859833	101.322			102.55		
	5	821696	-	821696	96.828			98.00		
	6	827310	-	827310	97.490			98.67		
45min	1	853746	-	853746	100.605	98.28	1.94	102.13	99.77	1.94
	2	831577	-	831577	97.993			99.48		
	3	823237	-	823237	97.010			98.48		
	4	854391	-	854391	100.681			102.21		
	5	818381	-	818381	96.438			97.90		
	6	822805	-	822805	96.959			98.43		
60min	1	848147	-	848147	99.945	97.83	1.87	101.77	99.61	1.87
	2	826847	-	826847	97.435			99.21		
	3	818363	-	818363	96.436			98.19		
	4	851002	-	851002	100.282			102.11		
	5	815883	-	815883	96.143			97.89		
	6	821043	-	821043	96.751			98.51		
极限	1	845392	-	845392	99.621	97.48	1.97	101.75	99.56	1.97
	2	824991	-	824991	97.217			99.29		
	3	814384	-	814384	95.967			98.01		
	4	849252	-	849252	100.076			102.21		
	5	811486	-	811486	95.625			97.66		
	6	817997	-	817997	96.392			98.44		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



盐酸贝那普利片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100768-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.08	849795	849221	849526	850151	849493	849637	0.05
2	10.12	853052	852359				852706	0.06
单位质量响应值			RSD%	判断				
84289.38			0.03	数据可信				

溶出曲线测定

盐酸贝那普利片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-X3462批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	827366	-	827366	97.390	98.25	1.03	97.39	98.26	1.03
	2	846122	-	846122	99.598			99.60		
	3	826810	-	826810	97.324			97.32		
	4	828904	-	828904	97.571			97.57		
	5	844019	-	844019	99.350			99.35		
	6	835061	-	835061	98.296			98.30		
10min	1	835553	-	835553	98.354	99.07	1.30	98.65	99.36	1.30
	2	848407	-	848407	99.867			100.17		
	3	830283	-	830283	97.733			98.03		
	4	835216	-	835216	98.314			98.61		
	5	860044	-	860044	101.236			101.53		
	6	840212	-	840212	98.902			99.20		
15min	1	832347	-	832347	97.976	98.79	1.33	98.56	99.38	1.32
	2	846345	-	846345	99.624			100.22		
	3	828156	-	828156	97.483			98.07		
	4	831792	-	831792	97.911			98.50		
	5	857632	-	857632	100.952			101.55		
	6	839118	-	839118	98.773			99.36		
20min	1	829626	-	829626	97.656	98.29	1.30	98.54	99.18	1.30
	2	844340	-	844340	99.388			100.29		
	3	824439	-	824439	97.045			97.92		
	4	827253	-	827253	97.377			98.26		
	5	851930	-	851930	100.281			101.19		
	6	832444	-	832444	97.988			98.88		
30min	1	823198	-	823198	96.899	97.90	1.37	98.07	99.08	1.37
	2	842299	-	842299	99.148			100.34		
	3	821851	-	821851	96.741			97.91		
	4	823350	-	823350	96.917			98.09		
	5	848825	-	848825	99.916			101.12		
	6	830460	-	830460	97.754			98.94		
45min	1	821768	-	821768	96.731	97.57	1.38	98.20	99.04	1.38
	2	840636	-	840636	98.952			100.44		
	3	816136	-	816136	96.068			97.53		
	4	822053	-	822053	96.764			98.23		
	5	844812	-	844812	99.443			100.95		
	6	827770	-	827770	97.437			98.91		
60min	1	817397	-	817397	96.216	96.92	1.49	97.97	98.69	1.49
	2	836572	-	836572	98.473			100.26		
	3	810579	-	810579	95.414			97.16		
	4	816134	-	816134	96.068			97.82		
	5	840727	-	840727	98.963			100.77		
	6	818906	-	818906	96.394			98.16		
极限	1	813112	-	813112	95.712	96.54	1.56	97.76	98.61	1.56
	2	834274	-	834274	98.203			100.29		
	3	804502	-	804502	94.698			96.73		
	4	811929	-	811929	95.573			97.62		
	5	836090	-	836090	98.417			100.52		
	6	821197	-	821197	96.664			98.72		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



盐酸贝那普利片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100768-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.08	842131	841141	841954	842177	842391	841959	0.06
2	10.12	841470	839164				840317	0.20
单位质量响应值				RSD%	判断			
83527.68				0.42	数据可信			

溶出曲线测定

盐酸贝那普利片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-X3462批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	823162	-	823162	98.051	99.00	1.51	98.05	99.00	1.51
	2	834576	-	834576	99.411			99.41		
	3	831504	-	831504	99.045			99.04		
	4	834644	-	834644	99.419			99.42		
	5	850032	-	850032	101.252			101.25		
	6	812722	-	812722	96.808			96.81		
10min	1	823356	-	823356	98.074	99.11	1.72	98.37	99.40	1.72
	2	835400	-	835400	99.509			99.81		
	3	827890	-	827890	98.614			98.91		
	4	837397	-	837397	99.747			100.04		
	5	855038	-	855038	101.848			102.15		
	6	813010	-	813010	96.842			97.13		
15min	1	820951	-	820951	97.788	98.70	1.70	98.38	99.30	1.69
	2	834099	-	834099	99.354			99.95		
	3	825849	-	825849	98.371			98.96		
	4	829198	-	829198	98.770			99.37		
	5	851782	-	851782	101.460			102.07		
	6	809967	-	809967	96.479			97.06		
20min	1	817082	-	817082	97.327	98.36	1.67	98.21	99.25	1.67
	2	830098	-	830098	98.877			99.77		
	3	821579	-	821579	97.863			98.75		
	4	828931	-	828931	98.738			99.63		
	5	848645	-	848645	101.086			102.00		
	6	808416	-	808416	96.295			97.16		
30min	1	813337	-	813337	96.881	98.06	1.70	98.05	99.24	1.70
	2	828746	-	828746	98.716			99.91		
	3	820450	-	820450	97.728			98.91		
	4	826547	-	826547	98.454			99.64		
	5	845381	-	845381	100.698			101.91		
	6	804796	-	804796	95.863			97.02		
45min	1	812082	-	812082	96.731	97.69	1.64	98.20	99.17	1.64
	2	825948	-	825948	98.383			99.87		
	3	815130	-	815130	97.094			98.57		
	4	824904	-	824904	98.259			99.74		
	5	840638	-	840638	100.133			101.65		
	6	801948	-	801948	95.524			96.97		
60min	1	808073	-	808073	96.254	97.35	1.73	98.01	99.12	1.73
	2	822634	-	822634	97.988			99.77		
	3	813918	-	813918	96.950			98.72		
	4	821178	-	821178	97.815			99.59		
	5	839600	-	839600	100.009			101.83		
	6	798311	-	798311	95.091			96.82		
极限	1	803708	-	803708	95.734	96.94	1.75	97.78	99.01	1.75
	2	819290	-	819290	97.590			99.67		
	3	808965	-	808965	96.360			98.42		
	4	817321	-	817321	97.355			99.43		
	5	837187	-	837187	99.722			101.84		
	6	796605	-	796605	94.888			96.91		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



盐酸贝那普利片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100768-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.08	839841	838922	838120	838885	838686	838891	0.08
2	10.12	846950	846511				846730	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
83223.31				0.38	数据可信			

溶出曲线测定

盐酸贝那普利片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-X3462批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	805263	-	805263	95.730	97.89	1.77	95.73	97.89	1.77
	2	829905	-	829905	98.659			98.66		
	3	843982	-	843982	100.333			100.33		
	4	832816	-	832816	99.005			99.01		
	5	814345	-	814345	96.809			96.81		
	6	814138	-	814138	96.785			96.78		
10min	1	842255	-	842255	100.127	98.77	1.58	100.41	99.06	1.57
	2	833633	-	833633	99.102			99.40		
	3	847027	-	847027	100.695			101.00		
	4	830441	-	830441	98.723			99.02		
	5	815739	-	815739	96.975			97.27		
	6	815828	-	815828	96.986			97.28		
15min	1	841226	-	841226	100.005	98.53	1.65	100.59	99.12	1.65
	2	832514	-	832514	98.969			99.56		
	3	845265	-	845265	100.485			101.09		
	4	827375	-	827375	98.358			98.95		
	5	813132	-	813132	96.665			97.25		
	6	813176	-	813176	96.670			97.25		
20min	1	841733	-	841733	100.065	98.18	1.73	100.95	99.06	1.72
	2	828193	-	828193	98.456			99.35		
	3	841241	-	841241	100.007			100.91		
	4	824160	-	824160	97.976			98.86		
	5	808419	-	808419	96.105			96.98		
	6	811299	-	811299	96.447			97.32		
30min	1	842395	-	842395	100.144	97.83	1.83	101.33	99.01	1.82
	2	824311	-	824311	97.994			99.18		
	3	837007	-	837007	99.503			100.71		
	4	820789	-	820789	97.575			98.76		
	5	805924	-	805924	95.808			96.97		
	6	807078	-	807078	95.945			97.11		
45min	1	837759	-	837759	99.593	97.46	1.80	101.08	98.94	1.79
	2	822829	-	822829	97.818			99.30		
	3	834764	-	834764	99.237			100.74		
	4	815824	-	815824	96.985			98.46		
	5	803824	-	803824	95.559			97.01		
	6	803975	-	803975	95.576			97.02		
60min	1	839845	-	839845	99.841	97.18	1.96	101.63	98.94	1.95
	2	817153	-	817153	97.143			98.92		
	3	831757	-	831757	98.879			100.68		
	4	814206	-	814206	96.793			98.56		
	5	800024	-	800024	95.107			96.84		
	6	801626	-	801626	95.297			97.03		
极限	1	841026	-	841026	99.981	96.82	2.12	102.07	98.88	2.11
	2	813882	-	813882	96.754			98.82		
	3	827529	-	827529	98.377			100.47		
	4	809291	-	809291	96.208			98.26		
	5	799221	-	799221	95.011			97.03		
	6	795749	-	795749	94.599			96.62		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



SMF-216


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-567-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/18 11:47:09
处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 237nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
溶剂



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-568-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/18 11:52:35
处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.302	849586	100.000	107333	6942	1.066	--
总计		849586	100.000	107333			

图2 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-569-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 11:58:00

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.301	853899	100.000	107235	6863	1.067	--
总计		853899	100.000	107235			

图3 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-570-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:03:26

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:36

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.326	854387	100.000	107422	6961	1.066	--
总计		854387	100.000	107422			

图4 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-571-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:08:50

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:39

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.312	851325	100.000	107558	6951	1.068	--
总计		851325	100.000	107558			

图5 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-572-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:14:16

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:41

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.307	851087	100.000	107437	6939	1.068	--
总计		851087	100.000	107437			

图6 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-573-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:19:40

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:44

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	841153	100.000	117523	8590	1.024	--
总计		841153	100.000	117523			

图7 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-574-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 12:25:05

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:47

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	816686	100.000	114291	8587	1.026	--
总计		816686	100.000	114291			

图8 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-575-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 12:30:30

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:49

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	827875	100.000	116373	8637	1.028	--
总计		827875	100.000	116373			

图9 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-576-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:35:55

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:53

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	830842	100.000	116279	8597	1.028	--
总计		830842	100.000	116279			

图10 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-577-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:41:20

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	826766	100.000	115802	8599	1.029	--
总计		826766	100.000	115802			

图11 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-578-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:46:44

处理时间(V3): 2025/01/20 08:46:59

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	840514	100.000	117589	8588	1.028	--
总计		840514	100.000	117589			

图12 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-579-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:52:09

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	835287	100.000	116754	8590	1.029	--
总计		835287	100.000	116754			

图13 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-580-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:57:34

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:04

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	817390	100.000	114129	8574	1.030	--
总计		817390	100.000	114129			

图14 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-581-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:02:59

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:06

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	829337	100.000	115255	8582	1.023	--
总计		829337	100.000	115255			

图15 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-582-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:08:24

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:09

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	829181	100.000	115903	8589	1.031	--
总计		829181	100.000	115903			

图16 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-583-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:13:49

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:12

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	823045	100.000	115093	8586	1.032	--
总计		823045	100.000	115093			

图17 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-584-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:19:13

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:15

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	837660	100.000	117010	8575	1.032	--
总计		837660	100.000	117010			

图18 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-585-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:24:39

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:17

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	834627	100.000	116733	8577	1.032	--
总计		834627	100.000	116733			

图19 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-586-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:30:03

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	813522	100.000	113915	8591	1.032	--
总计		813522	100.000	113915			

图20 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-587-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:35:27

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	823293	100.000	115620	8607	1.033	--
总计		823293	100.000	115620			

图21 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-588-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:40:52

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:25

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	827832	100.000	115726	8570	1.032	--
总计		827832	100.000	115726			

图22 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-589-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 13:46:16

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:28

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	821762	100.000	115086	8578	1.032	--
总计		821762	100.000	115086			

图23 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-590-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:51:40

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	834165	100.000	116737	8571	1.032	--
总计		834165	100.000	116737			

图24 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-591-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:57:05

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:33

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	829525	100.000	116135	8566	1.033	--
总计		829525	100.000	116135			

图25 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-592-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:02:30

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:36

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	811241	100.000	113482	8562	1.033	--
总计		811241	100.000	113482			

图26 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-593-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:07:54

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:39

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	822654	100.000	115369	8575	1.034	--
总计		822654	100.000	115369			

图27 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-594-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 14:13:19

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:42

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	824245	100.000	115227	8553	1.034	--
总计		824245	100.000	115227			

图28 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-595-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 14:18:44

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:45

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.331	818902	100.000	114492	8552	1.034	--
总计		818902	100.000	114492			

图29 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-596-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:24:08

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:47

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	830352	100.000	116103	8561	1.034	--
总计		830352	100.000	116103			

图30 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-597-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:29:32

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	831640	100.000	116285	8565	1.035	--
总计		831640	100.000	116285			

图31 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-598-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:34:57

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:53

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.332	812036	100.000	113485	8568	1.035	--
总计		812036	100.000	113485			

图32 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-599-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:40:22

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:55

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	822419	100.000	115219	8596	1.036	--
总计		822419	100.000	115219			

图33 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-600-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:45:47

处理时间(V3): 2025/01/20 08:47:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	824439	100.000	115060	8563	1.036	--
总计		824439	100.000	115060			

图34 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-601-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:51:10

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:00

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.335	818704	100.000	114218	8566	1.035	--
总计		818704	100.000	114218			

图35 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-602-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:56:34

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:03

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	832001	100.000	116044	8589	1.035	--
总计		832001	100.000	116044			

图36 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-603-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:01:59

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:06

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	827209	100.000	115481	8564	1.036	--
总计		827209	100.000	115481			

图37 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-604-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:07:24

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:09

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.335	808211	100.000	112758	8571	1.036	--
总计		808211	100.000	112758			

图38 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-605-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:12:49

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:11

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	818904	100.000	114509	8597	1.037	--
总计		818904	100.000	114509			

图39 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-606-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:18:14

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:14

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	820644	100.000	114440	8575	1.036	--
总计		820644	100.000	114440			

图40 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-607-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:23:38

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:16

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	814168	100.000	113599	8583	1.037	--
总计		814168	100.000	113599			

图41 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-608-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:29:03

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:19

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.335	827690	100.000	115500	8577	1.037	--
总计		827690	100.000	115500			

图42 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-609-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:34:29

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:22

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	824528	100.000	115074	8567	1.038	--
总计		824528	100.000	115074			

图43 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-610-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:39:54

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:25

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	804705	100.000	112412	8576	1.038	--
总计		804705	100.000	112412			

图44 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-611-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:45:20

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:27

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	816544	100.000	114170	8587	1.039	--
总计		816544	100.000	114170			

图45 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-612-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:50:43

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:30

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	817467	100.000	114028	8581	1.038	--
总计		817467	100.000	114028			

图46 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-613-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:56:07

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:33

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.333	811435	100.000	113301	8572	1.038	--
总计		811435	100.000	113301			

图47 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-614-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:01:32

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:36

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.334	824182	100.000	115017	8567	1.039	--
总计		824182	100.000	115017			

图48 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-615-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:06:58

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:39

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.335	820657	100.000	114579	8588	1.039	--
总计		820657	100.000	114579			

图49 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-616-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:12:22

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:42

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.335	801188	100.000	111801	8574	1.039	--
总计		801188	100.000	111801			

图50 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-617-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:17:48

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:44

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.336	812082	100.000	113694	8600	1.039	--
总计		812082	100.000	113694			

图51 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-618-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:23:14

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:47

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.337	813498	100.000	113741	8573	1.038	--
总计		813498	100.000	113741			

图52 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-619-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:28:39

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.335	809247	100.000	112992	8571	1.038	--
总计		809247	100.000	112992			

图53 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-620-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:34:04

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:52

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.336	820100	100.000	114642	8579	1.038	--
总计		820100	100.000	114642			

图54 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-621-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:39:29

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:55

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.299	848559	100.000	107449	6923	1.082	--
总计		848559	100.000	107449			

图55 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-71/24-622-3 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:44:56

处理时间(V3): 2025/01/20 08:48:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.299	851705	100.000	107513	6908	1.082	--
总计		851705	100.000	107513			

图56 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$SMF-216 - 25-4/25-453-1 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 11:29:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V1): 2025/01/18 11:34:11 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
溶剂



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-455-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 11:45:43

处理时间(V2): 2025/01/20 08:53:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.431	840779	100.000	106156	7273	1.048	--
总计		840779	100.000	106156			

图58 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-456-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 11:51:09

处理时间(V2): 2025/01/20 08:53:46

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.364	841759	100.000	105018	6903	1.047	--
总计		841759	100.000	105018			

图59 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-457-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 11:56:34

处理时间(V2): 2025/01/20 08:53:49

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.359	841562	100.000	104737	6886	1.047	--
总计		841562	100.000	104737			

图60 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-458-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:02:00

处理时间(V2): 2025/01/20 08:53:51

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.360	841658	100.000	104802	6894	1.047	--
总计		841658	100.000	104802			

图61 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-459-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:07:26

处理时间(V2): 2025/01/20 08:53:54

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	841491	100.000	105045	6887	1.047	--
总计		841491	100.000	105045			

图62 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-496-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:28:45

处理时间(V2): 2025/01/20 08:53:57

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	825960	100.000	113348	8402	0.999	--
总计		825960	100.000	113348			

图63 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-461-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:18:15

处理时间(V2): 2025/01/20 08:53:59

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	824602	100.000	112589	8391	0.998	--
总计		824602	100.000	112589			

图64 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-462-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:23:40

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	811241	100.000	110738	8389	0.997	--
总计		811241	100.000	110738			

图65 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-463-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:29:05

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	821361	100.000	112362	8419	0.997	--
总计		821361	100.000	112362			

图66 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-464-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 12:34:30

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:07

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	819847	100.000	112015	8396	0.997	--
总计		819847	100.000	112015			

图67 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-465-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:39:54

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:10

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	826418	100.000	113027	8403	0.997	--
总计		826418	100.000	113027			

图68 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-466-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:45:19

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:13

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	831759	100.000	113844	8384	0.997	--
总计		831759	100.000	113844			

图69 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-467-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:50:44

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:15

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	822178	100.000	112718	8442	0.997	--
总计		822178	100.000	112718			

图70 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-468-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 12:56:10

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:18

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	807926	100.000	110578	8404	0.997	--
总计		807926	100.000	110578			

图71 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-469-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:01:34

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:21

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	818237	100.000	111792	8400	0.997	--
总计		818237	100.000	111792			

图72 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-470-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:06:58

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	816518	100.000	111819	8407	0.998	--
总计		816518	100.000	111819			

图73 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-471-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:12:22

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	820874	100.000	112239	8417	0.998	--
总计		820874	100.000	112239			

图74 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-472-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/18 13:17:48
处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	828333	100.000	113432	8390	0.998	--
总计		828333	100.000	113432			

图75 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-473-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:23:11

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	823105	100.000	112514	8394	0.998	--
总计		823105	100.000	112514			

图76 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-474-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:28:36

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	805623	100.000	110104	8397	0.997	--
总计		805623	100.000	110104			

图77 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-475-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:34:01

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:37

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	815362	100.000	111747	8417	0.998	--
总计		815362	100.000	111747			

图78 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-476-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:39:26

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	811665	100.000	111022	8425	0.998	--
总计		811665	100.000	111022			

图79 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-477-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:44:49

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	818188	100.000	111988	8420	0.999	--
总计		818188	100.000	111988			

图80 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-478-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:50:14

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:45

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	825588	100.000	112929	8411	0.998	--
总计		825588	100.000	112929			

图81 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-479-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 13:55:38

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:48

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	819151	100.000	112047	8417	0.999	--
总计		819151	100.000	112047			

图82 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-480-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:01:04

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	801704	100.000	109897	8389	0.999	--
总计		801704	100.000	109897			

图83 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-481-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:06:28

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:53

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	810993	100.000	111221	8443	0.998	--
总计		810993	100.000	111221			

图84 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-482-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:11:52

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	808716	100.000	110907	8398	0.998	--
总计		808716	100.000	110907			

图85 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-483-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:17:16

处理时间(V2): 2025/01/20 08:54:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	815666	100.000	111768	8429	0.999	--
总计		815666	100.000	111768			

图86 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-484-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:22:40

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	823955	100.000	113215	8466	0.999	--
总计		823955	100.000	113215			

图87 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-485-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:28:05

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:04

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	820344	100.000	112145	8419	0.997	--
总计		820344	100.000	112145			

图88 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-486-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:33:31

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:06

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	801957	100.000	109866	8442	0.998	--
总计		801957	100.000	109866			

图89 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-487-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:38:56

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:09

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.391	813890	100.000	111499	8405	0.999	--
总计		813890	100.000	111499			

图90 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-488-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:44:20

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:12

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	811169	100.000	111197	8402	0.998	--
总计		811169	100.000	111197			

图91 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-489-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:49:43

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:15

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	817246	100.000	111829	8410	0.999	--
总计		817246	100.000	111829			

图92 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-490-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 14:55:07

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:18

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.391	821330	100.000	112429	8404	0.999	--
总计		821330	100.000	112429			

图93 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-491-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:00:32

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	820891	100.000	112560	8401	0.998	--
总计		820891	100.000	112560			

图94 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-492-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:06:00

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	799545	100.000	109510	8424	0.999	--
总计		799545	100.000	109510			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-493-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:11:25

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	808271	100.000	110638	8417	0.999	--
总计		808271	100.000	110638			

图96 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-494-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:16:50

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:28

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.391	806109	100.000	110374	8406	0.998	--
总计		806109	100.000	110374			

图97 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-495-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:22:14

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	815788	100.000	111462	8409	0.999	--
总计		815788	100.000	111462			

图98 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-497-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:37:52

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:33

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	818395	100.000	112248	8423	0.999	--
总计		818395	100.000	112248			

图99 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-498-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:43:17

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:36

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.387	818832	100.000	112251	8388	0.998	--
总计		818832	100.000	112251			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-499-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:48:42

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:39

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	795390	100.000	108658	8405	0.998	--
总计		795390	100.000	108658			

图101 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-500-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:54:06

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:41

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.391	804785	100.000	110505	8438	0.999	--
总计		804785	100.000	110505			

图102 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-501-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 15:59:31

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:44

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	801662	100.000	110057	8426	0.999	--
总计		801662	100.000	110057			

图103 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-502-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:04:54

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:47

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	809491	100.000	111024	8435	0.999	--
总计		809491	100.000	111024			

图104 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-503-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:10:20

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	815757	100.000	111672	8410	0.998	--
总计		815757	100.000	111672			

图105 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-504-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:15:46

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:52

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	816775	100.000	111737	8406	0.998	--
总计		816775	100.000	111737			

图106 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-505-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:21:13

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:55

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	793322	100.000	108729	8406	0.999	--
总计		793322	100.000	108729			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-506-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:26:37

处理时间(V2): 2025/01/20 08:55:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	802702	100.000	110017	8404	0.999	--
总计		802702	100.000	110017			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-507-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:32:03

处理时间(V2): 2025/01/20 08:56:00

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	799429	100.000	109357	8416	0.999	--
总计		799429	100.000	109357			

图109 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-508-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:37:29

处理时间(V2): 2025/01/20 08:56:03

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	804355	100.000	110234	8444	0.999	--
总计		804355	100.000	110234			

图110 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-509-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:42:54

处理时间(V2): 2025/01/20 08:56:06

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	842145	100.000	104967	6893	1.045	--
总计		842145	100.000	104967			

图111 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-72/25-510-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/18 16:48:20
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:56:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 237nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.360	838506	100.000	104777	6935	1.046	--
总计		838506	100.000	104777			

图112 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-623-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:50:22

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:22

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-624-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:55:47

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:25

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.299	848986	100.000	107191	6897	1.083	--
总计		848986	100.000	107191			

图114 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-625-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:01:13

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:28

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.299	848673	100.000	107148	6902	1.082	--
总计		848673	100.000	107148			

图115 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-626-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:06:41

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.299	849000	100.000	107145	6899	1.082	--
总计		849000	100.000	107145			

图116 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-627-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:12:07

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.300	848913	100.000	107099	6895	1.082	--
总计		848913	100.000	107099			

图117 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-628-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:17:35

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:36

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.300	849452	100.000	107110	6899	1.081	--
总计		849452	100.000	107110			

图118 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-629-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:23:00

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:39

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	860639	100.000	120316	8619	1.037	--
总计		860639	100.000	120316			

图119 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-630-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:28:27

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:42

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	841359	100.000	117491	8607	1.037	--
总计		841359	100.000	117491			

图120 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-631-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:33:52

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:44

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	822244	100.000	115022	8626	1.038	--
总计		822244	100.000	115022			

图121 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-632-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:39:18

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:47

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	865072	100.000	120976	8610	1.038	--
总计		865072	100.000	120976			

图122 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-633-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:44:44

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	818829	100.000	114376	8605	1.037	--
总计		818829	100.000	114376			

图123 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-634-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:50:10

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:52

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	828535	100.000	115842	8598	1.037	--
总计		828535	100.000	115842			

图124 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-635-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:55:36

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:55

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	866448	100.000	121084	8600	1.038	--
总计		866448	100.000	121084			

图125 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-636-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:01:02

处理时间(V2): 2025/01/20 08:57:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.342	842058	100.000	117480	8603	1.038	--
总计		842058	100.000	117480			

图126 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-637-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 18:06:28

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	834596	100.000	116619	8605	1.038	--
总计		834596	100.000	116619			

图127 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-638-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:11:54

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:04

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	870352	100.000	121641	8598	1.038	--
总计		870352	100.000	121641			

图128 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-639-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:17:20

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:06

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	831195	100.000	116192	8587	1.039	--
总计		831195	100.000	116192			

图129 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-640-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:22:46

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:09

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.342	836217	100.000	116653	8609	1.039	--
总计		836217	100.000	116653			

图130 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-641-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:28:12

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:12

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.339	863549	100.000	120729	8593	1.039	--
总计		863549	100.000	120729			

图131 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-642-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:33:37

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:15

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	842401	100.000	117834	8607	1.038	--
总计		842401	100.000	117834			

图132 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-643-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:39:03

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:17

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.339	831748	100.000	116331	8602	1.038	--
总计		831748	100.000	116331			

图133 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-644-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:44:30

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	867825	100.000	121331	8599	1.039	--
总计		867825	100.000	121331			

图134 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-645-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:49:56

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	828534	100.000	115842	8596	1.039	--
总计		828534	100.000	115842			

图135 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-646-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:55:22

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.340	832426	100.000	116322	8586	1.039	--
总计		832426	100.000	116322			

图136 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-647-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:00:48

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:28

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	860114	100.000	120088	8591	1.039	--
总计		860114	100.000	120088			

图137 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-648-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:06:13

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	839863	100.000	117270	8602	1.039	--
总计		839863	100.000	117270			

图138 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-649-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:11:40

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	829918	100.000	115792	8596	1.040	--
总计		829918	100.000	115792			

图139 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-650-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:17:06

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:36

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.341	863451	100.000	120563	8608	1.040	--
总计		863451	100.000	120563			

图140 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-651-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:22:31

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:39

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.343	826530	100.000	115082	8593	1.040	--
总计		826530	100.000	115082			

图141 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-652-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:27:55

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:42

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.345	830521	100.000	115998	8612	1.040	--
总计		830521	100.000	115998			

图142 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-653-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:33:22

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:44

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.345	856574	100.000	119704	8603	1.041	--
总计		856574	100.000	119704			

图143 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-654-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:38:49

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:47

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.346	836218	100.000	116888	8611	1.041	--
总计		836218	100.000	116888			

图144 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-655-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:44:14

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.346	826621	100.000	115561	8617	1.041	--
总计		826621	100.000	115561			

图145 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-656-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:49:41

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:52

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.346	859833	100.000	120214	8613	1.042	--
总计		859833	100.000	120214			

图146 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-657-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:55:07

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:55

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.347	821696	100.000	114935	8623	1.042	--
总计		821696	100.000	114935			

图147 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-658-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:00:32

处理时间(V2): 2025/01/20 08:58:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.347	827310	100.000	115643	8617	1.042	--
总计		827310	100.000	115643			

图148 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-659-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:05:58

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.346	853746	100.000	119363	8617	1.042	--
总计		853746	100.000	119363			

图149 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-660-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:11:24

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:03

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.347	831577	100.000	116351	8624	1.043	--
总计		831577	100.000	116351			

图150 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-661-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:16:50

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:06

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.348	823237	100.000	115122	8629	1.042	--
总计		823237	100.000	115122			

图151 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-662-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:22:16

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:09

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.349	854391	100.000	119309	8626	1.043	--
总计		854391	100.000	119309			

图152 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-663-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:27:43

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:12

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.350	818381	100.000	114130	8630	1.043	--
总计		818381	100.000	114130			

图153 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-664-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:33:10

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:14

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.349	822805	100.000	114932	8632	1.043	--
总计		822805	100.000	114932			

图154 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-665-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:38:36

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:17

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.349	848147	100.000	118427	8623	1.043	--
总计		848147	100.000	118427			

图155 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-666-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:44:03

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.350	826847	100.000	115326	8631	1.044	--
总计		826847	100.000	115326			

图156 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-667-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:49:29

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.350	818363	100.000	114128	8627	1.043	--
总计		818363	100.000	114128			

图157 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-668-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:54:56

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:25

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.351	851002	100.000	118577	8629	1.043	--
总计		851002	100.000	118577			

图158 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-669-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:00:22

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:28

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.350	815883	100.000	113666	8611	1.044	--
总计		815883	100.000	113666			

图159 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-670-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:05:48

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.352	821043	100.000	114440	8625	1.044	--
总计		821043	100.000	114440			

图160 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-671-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:11:15

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.351	845392	100.000	117768	8623	1.043	--
总计		845392	100.000	117768			

图161 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-672-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:16:42

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:37

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.352	824991	100.000	114990	8624	1.044	--
总计		824991	100.000	114990			

图162 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-673-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 21:22:08

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:39

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.353	814384	100.000	113748	8635	1.044	--
总计		814384	100.000	113748			

图163 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-674-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:27:34

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:42

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	849252	100.000	118578	8623	1.044	--
总计		849252	100.000	118578			

图164 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-675-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:33:02

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:45

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.354	811486	100.000	113291	8621	1.044	--
总计		811486	100.000	113291			

图165 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-676-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:38:28

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:48

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.354	817997	100.000	114278	8631	1.044	--
总计		817997	100.000	114278			

图166 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-677-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:43:54

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.313	851138	100.000	107586	6935	1.087	--
总计		851138	100.000	107586			

图167 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-678-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:49:21

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:53

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.313	851810	100.000	107661	6943	1.086	--
总计		851810	100.000	107661			

图168 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-679-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:54:46

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-680-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:00:11

处理时间(V2): 2025/01/20 08:59:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.312	849795	100.000	107301	6930	1.088	--
总计		849795	100.000	107301			

图170 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-681-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:05:36

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.313	849221	100.000	107349	6945	1.087	--
总计		849221	100.000	107349			

图171 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-682-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:11:01

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:04

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.314	849526	100.000	107332	6952	1.088	--
总计		849526	100.000	107332			

图172 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-683-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:16:26

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:07

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.313	850151	100.000	107413	6938	1.088	--
总计		850151	100.000	107413			

图173 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-684-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/18 22:21:51
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:00:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 237nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.314	849493	100.000	107381	6948	1.088	--
总计		849493	100.000	107381			

图174 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-685-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:27:16

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:12

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	827366	100.000	115521	8629	1.045	--
总计		827366	100.000	115521			

图175 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-686-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:32:40

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:15

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	846122	100.000	118179	8622	1.046	--
总计		846122	100.000	118179			

图176 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-687-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:38:05

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:18

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.354	826810	100.000	115463	8622	1.045	--
总计		826810	100.000	115463			

图177 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-688-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:43:30

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	828904	100.000	115760	8630	1.046	--
总计		828904	100.000	115760			

图178 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-689-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:48:54

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	844019	100.000	117824	8618	1.046	--
总计		844019	100.000	117824			

图179 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-690-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:54:19

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	835061	100.000	116611	8622	1.046	--
总计		835061	100.000	116611			

图180 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-691-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:59:43

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:29

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	835553	100.000	116658	8629	1.046	--
总计		835553	100.000	116658			

图181 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-692-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:05:08

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	848407	100.000	118424	8630	1.046	--
总计		848407	100.000	118424			

图182 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-693-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 23:10:32

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	830283	100.000	115870	8608	1.046	--
总计		830283	100.000	115870			

图183 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-694-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:15:56

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:37

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	835216	100.000	116498	8608	1.046	--
总计		835216	100.000	116498			

图184 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-695-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:21:20

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	860044	100.000	120001	8616	1.046	--
总计		860044	100.000	120001			

图185 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-696-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:26:43

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	840212	100.000	117158	8614	1.046	--
总计		840212	100.000	117158			

图186 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-697-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:32:08

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:45

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	832347	100.000	116131	8609	1.047	--
总计		832347	100.000	116131			

图187 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-698-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:37:33

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:48

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	846345	100.000	118053	8604	1.047	--
总计		846345	100.000	118053			

图188 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-699-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:42:57

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:51

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	828156	100.000	115526	8615	1.047	--
总计		828156	100.000	115526			

图189 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-700-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:48:21

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:54

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	831792	100.000	116029	8618	1.047	--
总计		831792	100.000	116029			

图190 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-701-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:53:44

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	857632	100.000	119600	8611	1.048	--
总计		857632	100.000	119600			

图191 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-702-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:59:09

处理时间(V2): 2025/01/20 09:00:59

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	839118	100.000	117082	8623	1.047	--
总计		839118	100.000	117082			

图192 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-703-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:04:33

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.355	829626	100.000	115722	8603	1.048	--
总计		829626	100.000	115722			

图193 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-704-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:09:56

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:04

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	844340	100.000	117749	8609	1.047	--
总计		844340	100.000	117749			

图194 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-705-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:15:19

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:07

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	824439	100.000	114926	8609	1.048	--
总计		824439	100.000	114926			

图195 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-706-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:20:43

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:10

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	827253	100.000	115309	8601	1.048	--
总计		827253	100.000	115309			

图196 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-707-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:26:07

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:12

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	851930	100.000	118628	8614	1.048	--
总计		851930	100.000	118628			

图197 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-708-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:31:32

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:15

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	832444	100.000	115887	8607	1.048	--
总计		832444	100.000	115887			

图198 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-709-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:36:56

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:18

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	823198	100.000	114678	8599	1.048	--
总计		823198	100.000	114678			

图199 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-710-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:42:19

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	842299	100.000	117264	8592	1.047	--
总计		842299	100.000	117264			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-711-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:47:44

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	821851	100.000	114565	8614	1.047	--
总计		821851	100.000	114565			

图201 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-712-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:53:08

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	823350	100.000	114603	8588	1.048	--
总计		823350	100.000	114603			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-713-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:58:31

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:28

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	848825	100.000	118240	8586	1.047	--
总计		848825	100.000	118240			

图203 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-714-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:03:56

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	830460	100.000	115753	8604	1.048	--
总计		830460	100.000	115753			

图204 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-715-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:09:20

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	821768	100.000	114547	8599	1.048	--
总计		821768	100.000	114547			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-716-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:14:44

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:37

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.356	840636	100.000	117140	8598	1.047	--
总计		840636	100.000	117140			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-717-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:20:08

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	816136	100.000	113717	8604	1.048	--
总计		816136	100.000	113717			

图207 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-718-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:25:32

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	822053	100.000	114408	8596	1.048	--
总计		822053	100.000	114408			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-719-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:30:55

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:46

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	844812	100.000	117360	8601	1.048	--
总计		844812	100.000	117360			

图209 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-720-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:36:18

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:48

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	827770	100.000	115145	8613	1.048	--
总计		827770	100.000	115145			

图210 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-721-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:41:42

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:51

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	817397	100.000	113680	8613	1.048	--
总计		817397	100.000	113680			

图211 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-722-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:47:05

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:54

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.359	836572	100.000	116123	8611	1.049	--
总计		836572	100.000	116123			

图212 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-723-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:52:29

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	810579	100.000	112637	8604	1.048	--
总计		810579	100.000	112637			

图213 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-724-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:59:01

处理时间(V2): 2025/01/20 09:01:59

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	816134	100.000	113440	8596	1.048	--
总计		816134	100.000	113440			

图214 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-725-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:04:25

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	840727	100.000	116917	8603	1.048	--
总计		840727	100.000	116917			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-726-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:09:49

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	818906	100.000	113874	8597	1.048	--
总计		818906	100.000	113874			

图216 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-727-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:15:14

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:08

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.358	813112	100.000	113072	8598	1.048	--
总计		813112	100.000	113072			

图217 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-728-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:20:39

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:11

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.359	834274	100.000	115886	8606	1.048	--
总计		834274	100.000	115886			

图218 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-729-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:26:03

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:13

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.360	804502	100.000	111882	8631	1.048	--
总计		804502	100.000	111882			

图219 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-730-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:31:27

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:16

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.360	811929	100.000	112805	8606	1.047	--
总计		811929	100.000	112805			

图220 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-731-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:36:52

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:19

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.360	836090	100.000	116181	8605	1.048	--
总计		836090	100.000	116181			

图221 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-732-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:42:16

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:21

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.360	821197	100.000	114024	8591	1.048	--
总计		821197	100.000	114024			

图222 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-733-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:47:41

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:24

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.320	853052	100.000	107492	6927	1.088	--
总计		853052	100.000	107492			

图223 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-73/24-734-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:53:05

处理时间(V2): 2025/01/20 09:02:27

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.320	852359	100.000	107470	6938	1.089	--
总计		852359	100.000	107470			

图224 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-511-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 16:53:46

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-512-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 16:59:13

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:08

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	842131	100.000	105120	6890	1.045	--
总计		842131	100.000	105120			

图226 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-513-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:04:41

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:11

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	841141	100.000	105172	6906	1.044	--
总计		841141	100.000	105172			

图227 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-514-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:10:07

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:14

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.359	841954	100.000	104932	6899	1.045	--
总计		841954	100.000	104932			

图228 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-515-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:15:33

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:17

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	842177	100.000	105133	6895	1.045	--
总计		842177	100.000	105133			

图229 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-516-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:20:58

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.357	842391	100.000	105164	6896	1.045	--
总计		842391	100.000	105164			

图230 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-517-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:26:24

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:22

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.388	823162	100.000	112518	8336	0.999	--
总计		823162	100.000	112518			

图231 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-518-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:31:50

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:25

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	834576	100.000	114073	8343	0.999	--
总计		834576	100.000	114073			

图232 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-519-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:37:16

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:28

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	831504	100.000	113746	8357	0.999	--
总计		831504	100.000	113746			

图233 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-520-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:42:42

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:30

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.385	834644	100.000	113867	8330	0.998	--
总计		834644	100.000	113867			

图234 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-521-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:48:08

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:33

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	850032	100.000	116344	8369	0.999	--
总计		850032	100.000	116344			

图235 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-522-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:53:33

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:35

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.388	812722	100.000	111305	8370	0.999	--
总计		812722	100.000	111305			

图236 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-523-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 17:58:59

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:38

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	823356	100.000	112811	8380	0.999	--
总计		823356	100.000	112811			

图237 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-524-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:04:25

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:41

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	835400	100.000	114538	8388	0.999	--
总计		835400	100.000	114538			

图238 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-525-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:09:50

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:44

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	827890	100.000	113339	8372	0.999	--
总计		827890	100.000	113339			

图239 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-526-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:15:15

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:47

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	837397	100.000	114517	8351	0.999	--
总计		837397	100.000	114517			

图240 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-527-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:20:42

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:49

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	855038	100.000	116929	8369	0.999	--
总计		855038	100.000	116929			

图241 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-528-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:26:07

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:52

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	813010	100.000	111131	8358	0.999	--
总计		813010	100.000	111131			

图242 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-529-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:31:32

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:55

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.388	820951	100.000	112372	8358	0.999	--
总计		820951	100.000	112372			

图243 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-530-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:36:58

处理时间(V2): 2025/01/20 09:05:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.388	834099	100.000	114129	8350	0.999	--
总计		834099	100.000	114129			

图244 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-531-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:42:24

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:00

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	825849	100.000	112896	8360	0.999	--
总计		825849	100.000	112896			

图245 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-532-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:47:50

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:03

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	829198	100.000	113792	8409	1.000	--
总计		829198	100.000	113792			

图246 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-533-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:53:17

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:06

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	851782	100.000	116609	8360	0.999	--
总计		851782	100.000	116609			

图247 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-534-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 18:58:43

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:08

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	809967	100.000	110726	8362	0.999	--
总计		809967	100.000	110726			

图248 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-535-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:04:08

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:11

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.388	817082	100.000	111846	8357	0.999	--
总计		817082	100.000	111846			

图249 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-536-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:09:34

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:14

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	830098	100.000	113766	8389	1.000	--
总计		830098	100.000	113766			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-537-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:14:59

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:16

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	821579	100.000	112555	8372	0.999	--
总计		821579	100.000	112555			

图251 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-538-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:20:26

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:19

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.388	828931	100.000	113714	8395	1.000	--
总计		828931	100.000	113714			

图252 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-539-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:25:51

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:22

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	848645	100.000	116291	8385	0.999	--
总计		848645	100.000	116291			

图253 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-540-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:31:18

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:24

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	808416	100.000	110816	8383	1.001	--
总计		808416	100.000	110816			

图254 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-541-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:36:44

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:27

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.389	813337	100.000	111730	8426	1.001	--
总计		813337	100.000	111730			

图255 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-542-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:42:10

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:30

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	828746	100.000	113474	8425	1.001	--
总计		828746	100.000	113474			

图256 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-543-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:47:36

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:33

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	820450	100.000	112173	8417	1.001	--
总计		820450	100.000	112173			

图257 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-544-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:53:01

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:36

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	826547	100.000	113347	8454	1.001	--
总计		826547	100.000	113347			

图258 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-545-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 19:58:27

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:39

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.390	845381	100.000	116222	8449	1.002	--
总计		845381	100.000	116222			

图259 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-546-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:03:53

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:41

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	804796	100.000	110459	8442	1.001	--
总计		804796	100.000	110459			

图260 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-547-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:09:20

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:44

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	812082	100.000	111266	8434	1.002	--
总计		812082	100.000	111266			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-548-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:14:45

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:46

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.392	825948	100.000	113119	8445	1.002	--
总计		825948	100.000	113119			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-549-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:20:12

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:49

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	815130	100.000	111674	8444	1.002	--
总计		815130	100.000	111674			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-550-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:25:39

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:52

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	824904	100.000	113140	8440	1.002	--
总计		824904	100.000	113140			

图264 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-551-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:31:05

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:54

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	840638	100.000	115434	8481	1.002	--
总计		840638	100.000	115434			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-552-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:36:31

处理时间(V2): 2025/01/20 09:06:57

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	801948	100.000	109911	8444	1.002	--
总计		801948	100.000	109911			

图266 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-553-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:41:58

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:00

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	808073	100.000	111101	8459	1.002	--
总计		808073	100.000	111101			

图267 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-554-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:47:24

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.396	822634	100.000	113138	8468	1.003	--
总计		822634	100.000	113138			

图268 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-555-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:52:51

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	813918	100.000	111596	8462	1.002	--
总计		813918	100.000	111596			

图269 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-556-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 20:58:18

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:08

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.397	821178	100.000	112915	8467	1.002	--
总计		821178	100.000	112915			

图270 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-557-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/18 21:03:44
处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.396	839600	100.000	115455	8462	1.002	--
总计		839600	100.000	115455			

图271 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-558-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:09:11

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:13

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	798311	100.000	109807	8479	1.003	--
总计		798311	100.000	109807			

图272 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-559-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:14:37

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:16

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.393	803708	100.000	110191	8461	1.003	--
总计		803708	100.000	110191			

图273 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-560-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:20:03

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:18

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	819290	100.000	112616	8467	1.002	--
总计		819290	100.000	112616			

图274 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-561-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:25:31

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:21

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	808965	100.000	111332	8489	1.002	--
总计		808965	100.000	111332			

图275 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-562-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/18 21:30:57
处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.396	817321	100.000	112527	8487	1.003	--
总计		817321	100.000	112527			

图276 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40℃

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-563-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/01/18 21:36:24

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:27

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.394	837187	100.000	115011	8459	1.003	--
总计		837187	100.000	115011			

图277 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-564-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:41:50

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:29

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.395	796605	100.000	109562	8467	1.003	--
总计		796605	100.000	109562			

图278 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-565-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:47:16

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:32

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.364	841470	100.000	105804	6994	1.047	--
总计		841470	100.000	105804			

图279 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-566-2 - cbzj-X3462p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 21:52:42

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:35

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.364	839164	100.000	105778	7031	1.047	--
总计		839164	100.000	105778			

图280 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-567-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/18 21:58:07
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 237nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-568-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:03:33

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.367	839841	100.000	105416	7014	1.048	--
总计		839841	100.000	105416			

图282 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-569-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:08:57

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.367	838922	100.000	105481	7027	1.048	--
总计		838922	100.000	105481			

图283 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-570-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:14:23

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:45

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.366	838120	100.000	105485	7034	1.048	--
总计		838120	100.000	105485			

图284 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-571-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:19:48

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:48

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.367	838885	100.000	105319	7025	1.048	--
总计		838885	100.000	105319			

图285 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-572-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:25:13

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:51

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.369	838686	100.000	105366	7023	1.048	--
总计		838686	100.000	105366			

图286 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-573-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:30:37

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:54

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	805263	100.000	110726	8488	1.003	--
总计		805263	100.000	110726			

图287 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-574-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:36:01

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.398	829905	100.000	114280	8508	1.003	--
总计		829905	100.000	114280			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-575-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:41:25

处理时间(V2): 2025/01/20 09:07:59

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.396	843982	100.000	116116	8472	1.003	--
总计		843982	100.000	116116			

图289 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-576-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:46:50

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	832816	100.000	114683	8517	1.004	--
总计		832816	100.000	114683			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-577-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:52:14

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	814345	100.000	111955	8488	1.004	--
总计		814345	100.000	111955			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-578-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 22:57:38

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:08

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.397	814138	100.000	112171	8500	1.004	--
总计		814138	100.000	112171			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-579-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:03:02

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:10

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.398	842255	100.000	115856	8488	1.004	--
总计		842255	100.000	115856			

图293 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-580-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:08:26

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:13

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.398	833633	100.000	114918	8514	1.004	--
总计		833633	100.000	114918			

图294 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-581-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:13:50

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:16

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.397	847027	100.000	116687	8497	1.004	--
总计		847027	100.000	116687			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-582-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:19:14

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:18

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	830441	100.000	114208	8491	1.003	--
总计		830441	100.000	114208			

图296 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-583-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:24:38

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:21

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.398	815739	100.000	112256	8491	1.004	--
总计		815739	100.000	112256			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-584-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:30:02

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:24

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	815828	100.000	112417	8534	1.004	--
总计		815828	100.000	112417			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-585-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:35:26

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	841226	100.000	115901	8526	1.004	--
总计		841226	100.000	115901			

图299 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-586-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:40:51

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:29

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.400	832514	100.000	114298	8494	1.003	--
总计		832514	100.000	114298			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-587-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/18 23:46:15
处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.401	845265	100.000	116013	8505	1.003	--
总计		845265	100.000	116013			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-588-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/18 23:51:39

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:35

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	827375	100.000	113773	8494	1.004	--
总计		827375	100.000	113773			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-589-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/18 23:57:04
处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.398	813132	100.000	111974	8495	1.004	--
总计		813132	100.000	111974			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-590-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:02:28

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.396	813176	100.000	111934	8483	1.004	--
总计		813176	100.000	111934			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-591-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:07:52

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.401	841733	100.000	115450	8500	1.004	--
总计		841733	100.000	115450			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-592-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:13:17

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:46

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.398	828193	100.000	114054	8510	1.004	--
总计		828193	100.000	114054			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-593-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:18:41

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:49

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.400	841241	100.000	115538	8507	1.005	--
总计		841241	100.000	115538			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-594-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:24:05

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:51

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	824160	100.000	113291	8506	1.004	--
总计		824160	100.000	113291			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-595-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:29:29

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:54

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.400	808419	100.000	111092	8511	1.005	--
总计		808419	100.000	111092			




SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40℃
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-596-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/19 00:34:53
处理时间 (V2): 2025/01/20 09:08:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 237nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.401	811299	100.000	111359	8507	1.004	--
总计		811299	100.000	111359			

图310 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-597-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:40:17

处理时间(V2): 2025/01/20 09:08:59

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	842395	100.000	115782	8510	1.004	--
总计		842395	100.000	115782			

图311 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-598-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:45:40

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.401	824311	100.000	113209	8519	1.004	--
总计		824311	100.000	113209			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-599-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:51:05

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.401	837007	100.000	115065	8533	1.005	--
总计		837007	100.000	115065			

图313 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-600-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 00:56:29

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:07

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.403	820789	100.000	113001	8522	1.005	--
总计		820789	100.000	113001			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-601-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:01:53

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:10

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	805924	100.000	110883	8492	1.004	--
总计		805924	100.000	110883			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-602-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:07:17

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:13

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.401	807078	100.000	110771	8505	1.004	--
总计		807078	100.000	110771			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-603-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:12:41

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:16

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.399	837759	100.000	115701	8560	1.005	--
总计		837759	100.000	115701			

图317 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-604-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:18:04

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:18

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.400	822829	100.000	113115	8509	1.004	--
总计		822829	100.000	113115			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-605-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:23:28

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:21

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.403	834764	100.000	114888	8521	1.004	--
总计		834764	100.000	114888			

图319 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-606-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:28:52

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:24

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.403	815824	100.000	112469	8547	1.004	--
总计		815824	100.000	112469			

图320 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-607-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:34:16

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	803824	100.000	110521	8514	1.004	--
总计		803824	100.000	110521			

图321 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-608-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:39:40

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:29

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	803975	100.000	110581	8515	1.004	--
总计		803975	100.000	110581			

图322 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-609-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:45:04

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:32

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.403	839845	100.000	115760	8541	1.004	--
总计		839845	100.000	115760			

图323 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-610-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:50:28

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.404	817153	100.000	112696	8552	1.004	--
总计		817153	100.000	112696			

图324 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-611-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 01:55:52

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:37

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.404	831757	100.000	114598	8525	1.004	--
总计		831757	100.000	114598			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-612-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:01:59

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.401	814206	100.000	111776	8507	1.005	--
总计		814206	100.000	111776			

图326 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-613-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:07:20

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:42

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.403	800024	100.000	110230	8540	1.004	--
总计		800024	100.000	110230			



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-614-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:12:43

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:45

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.403	801626	100.000	110426	8533	1.005	--
总计		801626	100.000	110426			

图328 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-615-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:18:08

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:48

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.404	841026	100.000	115810	8518	1.005	--
总计		841026	100.000	115810			

图329 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-616-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:23:33

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	813882	100.000	112088	8536	1.004	--
总计		813882	100.000	112088			

图330 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-617-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:28:58

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:53

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.404	827529	100.000	113932	8514	1.005	--
总计		827529	100.000	113932			

图331 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-618-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:34:23

处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	809291	100.000	111310	8514	1.004	--
总计		809291	100.000	111310			

图332 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-619-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/19 02:39:48
处理时间(V2): 2025/01/20 09:09:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.402	799221	100.000	109892	8512	1.005	--
总计		799221	100.000	109892			

图333 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-620-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:45:12

处理时间(V2): 2025/01/20 09:10:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.401	795749	100.000	109411	8538	1.005	--
总计		795749	100.000	109411			

图334 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-621-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:50:36

处理时间(V2): 2025/01/20 09:10:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.373	846950	100.000	106670	7046	1.049	--
总计		846950	100.000	106670			

图335 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)柱温:40 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-216 - 0-74/25-622-2 - cbzj-X3462p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-216 - SMF-216-20250118-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2025/01/19 02:56:00

处理时间(V2): 2025/01/20 09:10:07

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.369	846511	100.000	106477	7035	1.049	--
总计		846511	100.000	106477			

图336 盐酸贝那普利片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3462批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2