




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-116-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:31:33
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-117-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:34:56
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99111	100.000	15819	2639	1.141	--
总计		99111	100.000	15819			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-118-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:38:20
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99126	100.000	15805	2632	1.139	--
总计		99126	100.000	15805			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-119-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:41:44
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99340	100.000	15820	2635	1.141	--
总计		99340	100.000	15820			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-120-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:45:08
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99226	100.000	15806	2635	1.144	--
总计		99226	100.000	15806			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-121-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:48:31
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99250	100.000	15798	2636	1.144	--
总计		99250	100.000	15798			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-122-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:51:55
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	30362	100.000	4960	2809	1.128	--
总计		30362	100.000	4960			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-123-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:55:16
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	30846	100.000	5049	2807	1.133	--
总计		30846	100.000	5049			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-124-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 11:58:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	32769	100.000	5369	2824	1.140	--
总计		32769	100.000	5369			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-125-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:02:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:12:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	24535	100.000	3979	2800	1.137	--
总计		24535	100.000	3979			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-126-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:05:24
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	29160	100.000	4806	2822	1.130	--
总计		29160	100.000	4806			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-127-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:08:47
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	29373	100.000	4809	2819	1.129	--
总计		29373	100.000	4809			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-128-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:12:09
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	62923	100.000	10265	2815	1.144	--
总计		62923	100.000	10265			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-129-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:15:32
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	64102	100.000	10461	2819	1.141	--
总计		64102	100.000	10461			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-130-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:18:53
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	67980	100.000	11114	2815	1.145	--
总计		67980	100.000	11114			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-131-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:22:16
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	55417	100.000	9083	2827	1.139	--
总计		55417	100.000	9083			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-132-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:25:39
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	66993	100.000	10971	2825	1.143	--
总计		66993	100.000	10971			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-133-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:29:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	68106	100.000	11150	2827	1.139	--
总计		68106	100.000	11150			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-134-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:32:24
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	79903	100.000	13029	2812	1.146	--
总计		79903	100.000	13029			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-135-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:35:46
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	80421	100.000	13124	2822	1.145	--
总计		80421	100.000	13124			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-136-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:39:09
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	80688	100.000	13191	2819	1.144	--
总计		80688	100.000	13191			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-137-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:42:32
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	74915	100.000	12279	2822	1.152	--
总计		74915	100.000	12279			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-138-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:45:55
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	80208	100.000	13106	2817	1.150	--
总计		80208	100.000	13106			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-139-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:49:17
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	84176	100.000	13726	2811	1.144	--
总计		84176	100.000	13726			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-140-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:52:40
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	85987	100.000	14044	2814	1.144	--
总计		85987	100.000	14044			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-141-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:56:03
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	85642	100.000	13978	2806	1.143	--
总计		85642	100.000	13978			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-142-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 12:59:26
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	88992	100.000	14514	2812	1.146	--
总计		88992	100.000	14514			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-143-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:02:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	84991	100.000	13879	2816	1.142	--
总计		84991	100.000	13879			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-144-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:06:12
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	90030	100.000	14728	2823	1.146	--
总计		90030	100.000	14728			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-145-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:09:34
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	89145	100.000	14502	2801	1.149	--
总计		89145	100.000	14502			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-146-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:12:56
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:13:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	87106	100.000	14185	2808	1.149	--
总计		87106	100.000	14185			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-147-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:16:19
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	89126	100.000	14526	2805	1.144	--
总计		89126	100.000	14526			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-148-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:19:42
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	92221	100.000	15023	2806	1.148	--
总计		92221	100.000	15023			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-149-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:23:05
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	93032	100.000	15163	2802	1.151	--
总计		93032	100.000	15163			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-150-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:26:28
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	91965	100.000	14996	2814	1.152	--
总计		91965	100.000	14996			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-151-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:29:50
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	93016	100.000	15136	2805	1.149	--
总计		93016	100.000	15136			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-152-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:33:13
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	90299	100.000	14680	2795	1.148	--
总计		90299	100.000	14680			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-153-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:36:36
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	93053	100.000	15167	2810	1.154	--
总计		93053	100.000	15167			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-154-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:39:59
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	95080	100.000	15551	2802	1.147	--
总计		95080	100.000	15551			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-155-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:43:22
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	96235	100.000	15720	2807	1.150	--
总计		96235	100.000	15720			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-156-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:46:43
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	94518	100.000	15432	2806	1.151	--
总计		94518	100.000	15432			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-157-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:50:05
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	95927	100.000	15686	2817	1.151	--
总计		95927	100.000	15686			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-158-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:53:28
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	89444	100.000	14570	2811	1.149	--
总计		89444	100.000	14570			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-159-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 13:56:51
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	89849	100.000	14640	2806	1.151	--
总计		89849	100.000	14640			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-160-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:00:13
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	93780	100.000	15273	2807	1.149	--
总计		93780	100.000	15273			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-161-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:03:36
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	95250	100.000	15545	2804	1.150	--
总计		95250	100.000	15545			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-162-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:06:59
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	93305	100.000	15182	2801	1.156	--
总计		93305	100.000	15182			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-163-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:10:22
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	93799	100.000	15264	2805	1.152	--
总计		93799	100.000	15264			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-164-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:13:44
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	90865	100.000	14818	2810	1.153	--
总计		90865	100.000	14818			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-165-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:17:08
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	89145	100.000	14503	2808	1.155	--
总计		89145	100.000	14503			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-166-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:20:32
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	92190	100.000	15023	2804	1.155	--
总计		92190	100.000	15023			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-167-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:23:55
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	93541	100.000	15278	2819	1.152	--
总计		93541	100.000	15278			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-168-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:27:19
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:14:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	90822	100.000	14844	2817	1.156	--
总计		90822	100.000	14844			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-169-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:30:42
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	93733	100.000	15331	2812	1.151	--
总计		93733	100.000	15331			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-170-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:34:06
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	87664	100.000	14247	2804	1.157	--
总计		87664	100.000	14247			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-171-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:37:30
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	89337	100.000	14593	2809	1.148	--
总计		89337	100.000	14593			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-172-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:40:53
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	92447	100.000	15067	2808	1.157	--
总计		92447	100.000	15067			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-173-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:44:16
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	93032	100.000	15192	2821	1.155	--
总计		93032	100.000	15192			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-174-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:47:40
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	90541	100.000	14753	2808	1.152	--
总计		90541	100.000	14753			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-175-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:51:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	92924	100.000	15197	2817	1.153	--
总计		92924	100.000	15197			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-176-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:54:26
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	86195	100.000	13989	2793	1.158	--
总计		86195	100.000	13989			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-177-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 14:57:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	89668	100.000	14581	2807	1.154	--
总计		89668	100.000	14581			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-178-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:01:12
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	92648	100.000	15157	2817	1.153	--
总计		92648	100.000	15157			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-179-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:04:36
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	93768	100.000	15270	2808	1.152	--
总计		93768	100.000	15270			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-180-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:07:58
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	90328	100.000	14691	2807	1.155	--
总计		90328	100.000	14691			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-181-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:11:22
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	91476	100.000	14849	2802	1.155	--
总计		91476	100.000	14849			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-182-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:14:45
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	99376	100.000	15699	2608	1.159	--
总计		99376	100.000	15699			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-183-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:18:09
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99339	100.000	15732	2618	1.158	--
总计		99339	100.000	15732			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-184-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:21:34
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-185-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:24:59
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	99663	100.000	15756	2607	1.158	--
总计		99663	100.000	15756			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-186-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:28:24
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	99223	100.000	15703	2607	1.155	--
总计		99223	100.000	15703			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-187-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:31:48
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99874	100.000	15744	2602	1.155	--
总计		99874	100.000	15744			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-188-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:35:12
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99298	100.000	15720	2615	1.157	--
总计		99298	100.000	15720			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-189-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:38:37
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:15:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	99208	100.000	15695	2610	1.159	--
总计		99208	100.000	15695			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-190-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:42:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	30141	100.000	4889	2788	1.148	--
总计		30141	100.000	4889			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-191-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:45:25
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	27337	100.000	4462	2805	1.137	--
总计		27337	100.000	4462			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-192-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:48:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	31038	100.000	5073	2792	1.138	--
总计		31038	100.000	5073			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-193-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:52:12
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	31633	100.000	5165	2792	1.138	--
总计		31633	100.000	5165			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-194-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:55:36
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	29730	100.000	4837	2795	1.136	--
总计		29730	100.000	4837			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-195-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 15:59:00
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	29548	100.000	4781	2795	1.159	--
总计		29548	100.000	4781			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-196-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:02:25
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	64108	100.000	10445	2810	1.151	--
总计		64108	100.000	10445			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-197-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:05:48
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	63238	100.000	10323	2805	1.154	--
总计		63238	100.000	10323			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-198-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:09:12
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	64586	100.000	10467	2800	1.156	--
总计		64586	100.000	10467			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-199-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:12:36
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	65894	100.000	10692	2805	1.158	--
总计		65894	100.000	10692			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-200-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:16:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	66624	100.000	10873	2821	1.151	--
总计		66624	100.000	10873			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-201-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:19:25
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	59472	100.000	9627	2784	1.158	--
总计		59472	100.000	9627			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-202-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:22:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	78536	100.000	12751	2797	1.158	--
总计		78536	100.000	12751			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-203-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:26:14
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	79992	100.000	13021	2800	1.158	--
总计		79992	100.000	13021			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-204-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:29:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	77587	100.000	12587	2786	1.159	--
总计		77587	100.000	12587			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-205-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:33:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	80440	100.000	13116	2804	1.162	--
总计		80440	100.000	13116			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-206-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:36:25
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	81350	100.000	13243	2800	1.161	--
总计		81350	100.000	13243			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-207-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:39:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	79066	100.000	12835	2803	1.161	--
总计		79066	100.000	12835			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-208-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:43:13
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	84020	100.000	13685	2812	1.158	--
总计		84020	100.000	13685			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-209-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:46:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	86566	100.000	14104	2813	1.155	--
总计		86566	100.000	14104			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-210-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:50:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:16:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	84970	100.000	13811	2798	1.159	--
总计		84970	100.000	13811			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-211-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:53:25
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	87219	100.000	14157	2800	1.159	--
总计		87219	100.000	14157			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-212-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 16:56:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	88631	100.000	14411	2804	1.158	--
总计		88631	100.000	14411			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-213-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:00:13
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	83745	100.000	13627	2805	1.159	--
总计		83745	100.000	13627			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-214-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:03:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	90838	100.000	14824	2811	1.155	--
总计		90838	100.000	14824			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-215-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:07:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	92200	100.000	15019	2802	1.155	--
总计		92200	100.000	15019			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-216-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:10:26
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	86326	100.000	14064	2806	1.159	--
总计		86326	100.000	14064			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-217-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:13:50
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	92519	100.000	15066	2808	1.155	--
总计		92519	100.000	15066			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-218-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:17:14
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	95229	100.000	15526	2809	1.158	--
总计		95229	100.000	15526			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-219-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:20:37
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	91275	100.000	14860	2802	1.160	--
总计		91275	100.000	14860			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-220-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:24:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	91358	100.000	14877	2799	1.159	--
总计		91358	100.000	14877			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-221-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:27:25
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	94261	100.000	15417	2818	1.161	--
总计		94261	100.000	15417			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-222-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:30:50
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	92975	100.000	15143	2808	1.161	--
总计		92975	100.000	15143			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-223-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:34:14
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	94423	100.000	15406	2808	1.163	--
总计		94423	100.000	15406			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-224-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:37:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	95337	100.000	15536	2809	1.162	--
总计		95337	100.000	15536			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-225-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:41:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	92961	100.000	15197	2813	1.162	--
总计		92961	100.000	15197			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-226-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:44:26
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	87110	100.000	14204	2833	1.158	--
总计		87110	100.000	14204			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-227-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:47:50
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	90143	100.000	14690	2826	1.163	--
总计		90143	100.000	14690			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-228-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:51:14
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	89973	100.000	14705	2826	1.167	--
总计		89973	100.000	14705			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-229-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:54:39
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	90329	100.000	14775	2818	1.158	--
总计		90329	100.000	14775			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-230-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 17:58:04
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	90747	100.000	14858	2832	1.162	--
总计		90747	100.000	14858			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-231-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:01:27
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	91577	100.000	14972	2829	1.162	--
总计		91577	100.000	14972			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-232-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:04:52
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:17:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	88963	100.000	14462	2800	1.160	--
总计		88963	100.000	14462			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-233-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:08:16
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	91688	100.000	14912	2792	1.163	--
总计		91688	100.000	14912			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-234-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:11:41
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	89570	100.000	14506	2791	1.162	--
总计		89570	100.000	14506			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-235-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:15:06
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	92014	100.000	14945	2809	1.163	--
总计		92014	100.000	14945			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-236-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:18:30
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	92337	100.000	15052	2817	1.164	--
总计		92337	100.000	15052			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-237-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:21:55
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	90151	100.000	14651	2807	1.164	--
总计		90151	100.000	14651			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-238-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:25:17
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	85332	100.000	13865	2792	1.164	--
总计		85332	100.000	13865			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-239-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:28:40
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	90340	100.000	14705	2814	1.162	--
总计		90340	100.000	14705			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-240-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:32:03
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	88947	100.000	14444	2804	1.170	--
总计		88947	100.000	14444			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-241-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:35:26
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	89595	100.000	14589	2802	1.162	--
总计		89595	100.000	14589			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-242-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:38:48
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	92554	100.000	15081	2806	1.163	--
总计		92554	100.000	15081			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-243-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:42:12
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	89262	100.000	14513	2804	1.166	--
总计		89262	100.000	14513			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-244-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:45:36
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	85670	100.000	13865	2794	1.164	--
总计		85670	100.000	13865			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-245-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:49:00
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	90104	100.000	14653	2808	1.163	--
总计		90104	100.000	14653			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-246-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:52:23
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	89306	100.000	14556	2802	1.163	--
总计		89306	100.000	14556			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-247-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:55:46
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	90402	100.000	14741	2810	1.165	--
总计		90402	100.000	14741			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-248-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 18:59:10
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	90546	100.000	14776	2816	1.166	--
总计		90546	100.000	14776			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-249-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:02:33
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	91388	100.000	14885	2807	1.165	--
总计		91388	100.000	14885			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-250-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:05:57
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99690	100.000	15782	2614	1.171	--
总计		99690	100.000	15782			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-251-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:09:21
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99649	100.000	15762	2619	1.167	--
总计		99649	100.000	15762			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-252-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:12:43
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-253-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:16:05
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:18:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	99105	100.000	15680	2622	1.163	--
总计		99105	100.000	15680			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-254-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:19:29
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	99245	100.000	15605	2624	1.172	--
总计		99245	100.000	15605			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-255-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:22:51
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	99254	100.000	15681	2615	1.169	--
总计		99254	100.000	15681			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-256-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:26:14
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	99262	100.000	15624	2599	1.164	--
总计		99262	100.000	15624			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-257-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:29:37
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	99261	100.000	15671	2610	1.165	--
总计		99261	100.000	15671			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-258-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:32:59
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	24976	100.000	4066	2793	1.138	--
总计		24976	100.000	4066			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-259-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:36:22
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	27256	100.000	4387	2795	1.167	--
总计		27256	100.000	4387			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-260-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:39:43
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	27070	100.000	4407	2822	1.132	--
总计		27070	100.000	4407			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-261-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:43:06
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	24130	100.000	3949	2797	1.143	--
总计		24130	100.000	3949			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-262-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:46:29
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	31044	100.000	5042	2788	1.143	--
总计		31044	100.000	5042			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-263-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:49:50
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	28572	100.000	4655	2818	1.155	--
总计		28572	100.000	4655			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-264-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:53:13
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	59440	100.000	9666	2795	1.166	--
总计		59440	100.000	9666			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-265-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:56:35
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	62121	100.000	10078	2798	1.166	--
总计		62121	100.000	10078			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-266-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 19:59:57
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	61386	100.000	9972	2798	1.168	--
总计		61386	100.000	9972			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-267-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:03:20
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	58409	100.000	9528	2807	1.159	--
总计		58409	100.000	9528			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-268-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:06:43
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	66765	100.000	10831	2810	1.165	--
总计		66765	100.000	10831			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-269-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:10:04
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	60979	100.000	9906	2793	1.165	--
总计		60979	100.000	9906			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-270-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:13:27
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	75706	100.000	12347	2817	1.162	--
总计		75706	100.000	12347			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-271-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:16:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	78407	100.000	12779	2809	1.165	--
总计		78407	100.000	12779			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-272-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:20:11
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	79468	100.000	12955	2829	1.164	--
总计		79468	100.000	12955			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-273-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:23:32
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	78312	100.000	12735	2800	1.167	--
总计		78312	100.000	12735			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-274-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:26:54
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:19:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	80847	100.000	13118	2795	1.163	--
总计		80847	100.000	13118			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-275-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:30:16
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	78875	100.000	12813	2809	1.167	--
总计		78875	100.000	12813			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-276-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:33:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	87288	100.000	14205	2802	1.166	--
总计		87288	100.000	14205			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-277-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:37:00
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	84493	100.000	13804	2815	1.165	--
总计		84493	100.000	13804			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-278-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:40:22
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	86872	100.000	14124	2803	1.168	--
总计		86872	100.000	14124			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-279-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:43:43
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	85632	100.000	13939	2809	1.166	--
总计		85632	100.000	13939			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-280-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:47:06
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	85475	100.000	13919	2800	1.160	--
总计		85475	100.000	13919			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-281-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:50:27
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	85564	100.000	13913	2790	1.163	--
总计		85564	100.000	13913			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-282-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:53:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	90313	100.000	14655	2795	1.168	--
总计		90313	100.000	14655			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-283-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 20:57:11
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	88679	100.000	14453	2804	1.166	--
总计		88679	100.000	14453			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-284-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:00:34
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	89141	100.000	14465	2792	1.164	--
总计		89141	100.000	14465			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-285-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:03:56
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	89687	100.000	14600	2802	1.166	--
总计		89687	100.000	14600			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-286-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:07:18
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	93391	100.000	15137	2791	1.170	--
总计		93391	100.000	15137			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-287-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:10:39
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	94276	100.000	15351	2809	1.166	--
总计		94276	100.000	15351			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-288-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:14:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	92785	100.000	15151	2819	1.167	--
总计		92785	100.000	15151			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-289-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:17:23
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	91211	100.000	14851	2819	1.165	--
总计		91211	100.000	14851			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-290-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:20:45
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	92176	100.000	15020	2814	1.166	--
总计		92176	100.000	15020			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-291-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:24:07
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	91597	100.000	14952	2804	1.163	--
总计		91597	100.000	14952			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-292-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:27:28
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	96266	100.000	15701	2814	1.169	--
总计		96266	100.000	15701			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-293-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:30:50
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	94688	100.000	15421	2809	1.167	--
总计		94688	100.000	15421			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-294-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:34:12
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	88865	100.000	14440	2805	1.166	--
总计		88865	100.000	14440			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-295-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:37:33
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:20:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	87097	100.000	14137	2799	1.163	--
总计		87097	100.000	14137			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-296-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:40:56
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	81420	100.000	13216	2788	1.167	--
总计		81420	100.000	13216			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-297-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:44:18
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	91449	100.000	14870	2803	1.171	--
总计		91449	100.000	14870			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-298-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:47:40
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	95375	100.000	15550	2818	1.170	--
总计		95375	100.000	15550			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-299-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:51:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	92868	100.000	15123	2816	1.169	--
总计		92868	100.000	15123			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-300-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:54:25
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	93496	100.000	15227	2815	1.170	--
总计		93496	100.000	15227			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-301-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 21:57:48
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	90301	100.000	14724	2812	1.168	--
总计		90301	100.000	14724			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-302-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:01:11
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	92374	100.000	15078	2829	1.169	--
总计		92374	100.000	15078			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-303-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:04:33
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	90598	100.000	14735	2811	1.167	--
总计		90598	100.000	14735			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-304-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:07:56
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	95366	100.000	15477	2815	1.167	--
总计		95366	100.000	15477			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-305-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:11:19
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	95081	100.000	15524	2840	1.165	--
总计		95081	100.000	15524			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-306-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:14:43
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	88413	100.000	14389	2809	1.168	--
总计		88413	100.000	14389			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-307-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:18:06
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	88104	100.000	14344	2818	1.169	--
总计		88104	100.000	14344			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-308-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:21:30
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	89324	100.000	14518	2814	1.173	--
总计		89324	100.000	14518			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-309-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:24:54
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	91604	100.000	14898	2807	1.167	--
总计		91604	100.000	14898			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-310-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:28:17
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	93228	100.000	15123	2801	1.175	--
总计		93228	100.000	15123			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-311-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:31:41
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	92438	100.000	15108	2820	1.167	--
总计		92438	100.000	15108			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-312-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:35:05
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	90750	100.000	14719	2801	1.168	--
总计		90750	100.000	14719			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-313-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:38:29
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	91451	100.000	14917	2824	1.173	--
总计		91451	100.000	14917			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-314-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:41:52
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	89732	100.000	14583	2818	1.168	--
总计		89732	100.000	14583			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-315-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:45:15
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	90369	100.000	14720	2826	1.173	--
总计		90369	100.000	14720			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-316-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:48:39
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:21:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	92973	100.000	15154	2813	1.173	--
总计		92973	100.000	15154			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-317-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:52:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:22:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	93107	100.000	15124	2801	1.169	--
总计		93107	100.000	15124			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-318-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:55:24
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:22:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	99566	100.000	15732	2611	1.169	--
总计		99566	100.000	15732			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-319-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 22:58:46
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:22:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	99686	100.000	15725	2614	1.171	--
总计		99686	100.000	15725			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-320-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:02:10
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:22:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-321-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:05:33
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:22:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	100075	100.000	15725	2613	1.175	--
总计		100075	100.000	15725			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-7/24-322-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:08:57
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:22:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	99822	100.000	15678	2613	1.170	--
总计		99822	100.000	15678			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-323-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:12:21
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:52:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	99684	100.000	15717	2603	1.166	--
总计		99684	100.000	15717			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-324-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:15:45
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:52:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	99913	100.000	15702	2611	1.172	--
总计		99913	100.000	15702			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-325-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:19:09
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:52:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	100068	100.000	15665	2603	1.175	--
总计		100068	100.000	15665			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-326-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:22:32
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	29547	100.000	4793	2808	1.153	--
总计		29547	100.000	4793			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-327-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:25:54
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	26456	100.000	4306	2791	1.148	--
总计		26456	100.000	4306			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-328-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:29:16
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:53:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	28063	100.000	4566	2794	1.173	--
总计		28063	100.000	4566			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-329-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:32:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	26121	100.000	4272	2824	1.157	--
总计		26121	100.000	4272			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-330-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:36:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	28768	100.000	4670	2787	1.163	--
总计		28768	100.000	4670			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-331-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:39:23
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	23321	100.000	3800	2798	1.151	--
总计		23321	100.000	3800			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-332-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:42:46
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	61239	100.000	9935	2799	1.164	--
总计		61239	100.000	9935			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-333-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:46:09
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	58389	100.000	9463	2796	1.174	--
总计		58389	100.000	9463			

图218 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-334-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:49:31
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	62670	100.000	10204	2809	1.166	--
总计		62670	100.000	10204			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-335-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:52:53
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	58513	100.000	9560	2821	1.167	--
总计		58513	100.000	9560			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-336-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:56:16
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	62665	100.000	10213	2817	1.172	--
总计		62665	100.000	10213			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-337-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/07 23:59:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	54304	100.000	8831	2799	1.168	--
总计		54304	100.000	8831			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-338-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:03:00
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	77131	100.000	12589	2817	1.171	--
总计		77131	100.000	12589			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-339-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:06:23
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	77386	100.000	12611	2808	1.170	--
总计		77386	100.000	12611			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-340-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:09:45
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	80156	100.000	13029	2801	1.173	--
总计		80156	100.000	13029			

图225 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-341-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:13:07
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	77451	100.000	12608	2802	1.171	--
总计		77451	100.000	12608			

图226 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-342-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:16:29
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	80597	100.000	13076	2799	1.171	--
总计		80597	100.000	13076			

图227 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-343-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:19:51
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	75154	100.000	12259	2807	1.171	--
总计		75154	100.000	12259			

图228 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-344-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:23:14
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	83136	100.000	13526	2801	1.170	--
总计		83136	100.000	13526			

图229 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-345-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:26:37
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	85106	100.000	13815	2806	1.173	--
总计		85106	100.000	13815			

图230 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-346-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:29:59
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:53:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	86399	100.000	14026	2819	1.172	--
总计		86399	100.000	14026			

图231 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-347-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:33:22
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	85541	100.000	13906	2802	1.173	--
总计		85541	100.000	13906			

图232 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-348-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:36:44
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	87722	100.000	14310	2822	1.172	--
总计		87722	100.000	14310			

图233 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-349-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:40:07
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	84801	100.000	13812	2821	1.177	--
总计		84801	100.000	13812			

图234 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-350-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:43:30
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	86158	100.000	13970	2791	1.168	--
总计		86158	100.000	13970			

图235 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-351-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:46:53
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	91572	100.000	14889	2808	1.173	--
总计		91572	100.000	14889			

图236 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-352-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:50:15
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	91312	100.000	14845	2812	1.169	--
总计		91312	100.000	14845			

图237 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-353-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:53:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	90188	100.000	14669	2815	1.168	--
总计		90188	100.000	14669			

图238 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-354-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 00:57:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	90402	100.000	14707	2810	1.172	--
总计		90402	100.000	14707			

图239 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-355-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:00:23
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	88121	100.000	14359	2817	1.174	--
总计		88121	100.000	14359			

图240 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-356-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:03:46
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	88336	100.000	14427	2814	1.164	--
总计		88336	100.000	14427			

图241 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-357-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:07:09
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	93297	100.000	15130	2808	1.171	--
总计		93297	100.000	15130			

图242 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-358-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:10:31
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	93636	100.000	15225	2810	1.172	--
总计		93636	100.000	15225			

图243 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-359-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:13:53
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	94471	100.000	15348	2804	1.169	--
总计		94471	100.000	15348			

图244 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-360-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:17:16
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	93421	100.000	15186	2814	1.178	--
总计		93421	100.000	15186			

图245 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-361-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:20:39
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	92018	100.000	14928	2808	1.174	--
总计		92018	100.000	14928			

图246 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-362-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:24:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	86046	100.000	14003	2808	1.170	--
总计		86046	100.000	14003			

图247 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-363-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:27:24
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	89742	100.000	14585	2800	1.173	--
总计		89742	100.000	14585			

图248 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-364-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:30:47
处理时间 (V2) : 2025/01/08 10:54:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	92441	100.000	14999	2803	1.175	--
总计		92441	100.000	14999			

图249 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-365-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:34:10
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	91197	100.000	14807	2815	1.172	--
总计		91197	100.000	14807			

图250 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-366-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:37:32
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	91993	100.000	14979	2819	1.170	--
总计		91993	100.000	14979			

图251 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-367-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:40:54
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:54:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	90190	100.000	14681	2805	1.172	--
总计		90190	100.000	14681			

图252 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-368-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:44:18
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	89275	100.000	14491	2820	1.178	--
总计		89275	100.000	14491			

图253 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-369-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:47:41
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	92318	100.000	15035	2806	1.175	--
总计		92318	100.000	15035			

图254 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-370-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:51:05
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	92712	100.000	15053	2810	1.171	--
总计		92712	100.000	15053			

图255 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-371-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:54:28
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	93574	100.000	15186	2797	1.168	--
总计		93574	100.000	15186			

图256 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-372-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 01:57:51
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	91227	100.000	14838	2815	1.171	--
总计		91227	100.000	14838			

图257 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-373-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:01:14
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	91478	100.000	14884	2805	1.171	--
总计		91478	100.000	14884			

图258 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-374-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:04:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	85849	100.000	13960	2802	1.172	--
总计		85849	100.000	13960			

图259 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-375-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:08:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	89126	100.000	14511	2809	1.169	--
总计		89126	100.000	14511			

图260 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-376-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:11:26
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	91149	100.000	14843	2810	1.170	--
总计		91149	100.000	14843			

图261 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-377-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:14:50
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	93207	100.000	15141	2808	1.173	--
总计		93207	100.000	15141			

图262 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-378-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:18:14
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	90932	100.000	14803	2793	1.176	--
总计		90932	100.000	14803			

图263 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-379-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:21:38
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	90112	100.000	14648	2797	1.174	--
总计		90112	100.000	14648			

图264 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-380-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:25:02
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	88022	100.000	14314	2800	1.171	--
总计		88022	100.000	14314			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-381-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:28:26
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	88748	100.000	14430	2806	1.173	--
总计		88748	100.000	14430			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-382-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:31:49
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	91267	100.000	14859	2801	1.176	--
总计		91267	100.000	14859			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-383-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:35:13
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	94965	100.000	15429	2805	1.175	--
总计		94965	100.000	15429			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-384-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:38:37
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	91052	100.000	14766	2803	1.176	--
总计		91052	100.000	14766			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-385-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:42:01
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	89820	100.000	14605	2804	1.176	--
总计		89820	100.000	14605			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-386-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:45:24
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	99353	100.000	15643	2607	1.177	--
总计		99353	100.000	15643			

图271 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-8/24-387-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8+0.07CTABjz-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250107-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/08 02:48:48
处理时间 (V2): 2025/01/08 10:55:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	99670	100.000	15648	2600	1.176	--
总计		99670	100.000	15648			

图272 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8(内含0.07%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2